

INDEX FUNGUS 1 - 20

door

R. A. MAAS GEESTERANUS

INHOUD

	Pagina
I. Voorwoord	3
II. Literatuurlijst	5
III. Adreslijst	10
IV. Artikelen en Mededelingen	11
V. Auteurs	30
VI. Bestuursmededelingen	49
VII. Boekbesprekingen	53
VIII. Determinatietabellen	55
IX. Excursies, Tentoonstellingen, Voordrachten	56
X. Figuren en foto' s	60
XI. In Memoriam	61
XII. Redactioneel	62
XIII. Vondsten in de pers	63
XIV. Waarnemingen	66
XV. Soortenlijst	68

I. VOORWOORD

Ons land kan niet bogen op een rijke literatuur over de hogere fungi. Toch is er reeds zoveel geschreven, dat het niemand meer mogelijk is, te overzien wat er over een hem op dat ogenblik interesserende soort uit ons land bekend is. Enerzijds moet de erkenning van dit feit een ieder, die zich degelijk wil inwerken, wel een bijzonder onzeker gevoel geven. Aan de andere kant, zou men aan die onzekerheid een eind willen maken, dan is het al een zeer ontmoedigende gedachte te bedenken, dat men alle tijdschriften, waarin mycologische artikelen verwacht kunnen worden, moet doorwerken, wil men zijn waarnemingen toetsen, of niet in herhalingen vallen, of zelfs fouten maken. De enige oplossing is het maken van een kaartsysteem. Maar welk een tijdrovend en veelal dubbel werk zou het zijn, indien ieder dat voor zich zelf zou doen. Daar ik een dergelijk kaartsysteem voor mijn werk toch nodig had, leek het mij niet anders dan natuurlijk ook anderen hiervan te laten profiteren. Roept echter niet uit: "hoera, nu zijn wij er", want voor u ligt slechts een index op twintig jaargangen van Fungus. Er zijn immers nog verschillende andere Nederlandse tijdschriften, die gegevens over fungi bevatten en hoewel mijn indices daarop ten dele in voorbereiding, ten dele gereed zijn, kunnen deze niet tezamen met die van Fungus gepubliceerd worden.

Een van onze beste mycologen schreef mij eens "De waarde van Uw index staat of valt met de waarde, die men aan de soortnamen in Fungus wil toekennen. Dit is ontegenzeggelijk en helaas waar. Daarom zal iedere gebruiker van deze index zeer kritisch te werk moeten gaan en voor zichzelf en telkens weer moeten uitmaken of een bepaalde determinatie als juist aanvaard kan worden. Pas als hij dat doet, meen ik, dat deze index aan zijn doel zal hebben beantwoord, namelijk een bijdrage te leveren om uiteindelijk de stand van de mycologie in ons land op een ander plan te brengen.

Hoe teleurstellend het ook moge klinken, de soortenlijst is niet volledig en kan het ook niet zijn. Nederlandse namen bijvoorbeeld zijn over het algemeen niet opgenomen. Voor de argumentatie verwijs ik naar Van Eynhoven's opmerkingen in 14, p. 40.

Fungi van tentoonstellingen zijn, met uitzondering van voor ons land nieuwe of zeer bijzondere soorten, niet in de soortenlijst vermeld, omdat de juiste vindplaats niet meer is na te gaan. Hen die desondanks prijs

stellen op de volledigheid van het overzicht, verwijs ik naar de rubriek Excursies, Tentoonstellingen, Voordrachten, pag. 55-57. Buitenlandse vondsten zijn evenmin opgenomen.

In een aantal gevallen is het mij door correspondentie gelukt om nauwkeurige(r) vindplaatsen te vermelden dan in Fungus opgegeven staan. Deze zijn dan in de soortenlijst aangeduid met de toevoeging (nadere informatie).

Hoewel ik er naar gestreefd heb om bij de nomenclatuur van de fungi de moderne zienswijzen te volgen, is mij dit noch altijd gelukt, noch soms wenselijk geleden. Het is uitermate moeilijk om te zeggen "dat is de juiste naam" en tenslotte heb ik mij steeds voor ogen gehouden, dat niemand gedwongen kan worden de zienswijze van anderen te aanvaarden. Ik heb voortdurend moeten overwegen aan welke naam de voorkeur te geven en heb mij daarbij de meer bezadigde houding van mycologen als Konrad en Maublanc - met wie ik het overigens niet in alles eens ben! - ten voorbeeld gesteld. Anders had U kennis moeten maken met namen als *Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff. ex Fr.) Singer & Smith (= *Pholiota mutabilis*) en *Leucocoprinus naucinus* (Fr.) Locq. (= *Lepiota naucina*). Namen, die met zovele andere misschien wel juist zijn, maar waarvan het niet aan mij ligt te beoordelen of zij juister zijn dan even recente andere namen. In de soortenlijst worden verder enkele soorten opgenomen, waarover ik in de mij ten dienste staande moderne literatuur niets heb kunnen vinden. Ik heb deze laten staan zoals zij waren, hoewel zij wellicht door specialisten veranderd of als dubieus geschrapt zouden zijn. Soms ook is het duidelijk, dat een bepaalde soort tot een ander geslacht gerekend moet worden. Het ligt echter niet op mijn weg en evenmin is deze soortenlijst de juiste plaats om in een dergelijk geval de nieuwe combinatie te maken. Ik heb dan volstaan met een korte opmerking.

Wat betreft het citeren van de auteursnamen kan ik vermelden, dat ik over deze kwestie met enkele mycologen van wereldnaam heb gecorrespondeerd en als resultaat daarvan tot de huidige oplossing ben gekomen. Deze is derhalve niet onoverwogen: maar evenmin overdreven. Of zij goed is, zal de tijd leren, slechts zij opgemerkt, dat de methode der Franse school die ook in ons land aanhangers heeft, beslist onjuist is.

Tenslotte rest mij nog een woord van bijzondere dank aan het Bestuur onzer Vereniging voor de geboden gelegenheid deze index te publiceren.

II. LITERATUURLIJST

(gebruikt bij het opstellen van de soortenlijst)

- Ainsworth, G. C. and Bisby, G.R., A Dictionary of the Fungi - Kew, 1950.
- Berkeley, M.J., Outlines of the British Fungology - London, 1860.
- Boudier, E., Histoire et Classification des Discomycètes d'Europe. Paris, 1907.
- , Icones Mycologicae, vol, 1-4 - Paris, 1905 - 1910.
- Bourdot, H, et Galzin, A., Hymenomycètes de France, vol. 1 Sceaux, 1927.
- Bresadola, J., Iconographia Mycologica, vol. 1-26 - Mediolani, 1927-1933.
- Buchwald, N. F., Studies in the Sclerotiniaceae I Taxonomy of the Sclerotiniaceae - Contr. Dept. Plant Pathol. Copenhagen, no 32, 1949.
- Cejp, K., Omphalia(Fr.)Quél, - Kavina & Pilát, Atlas des Champignons de l'Europe, vol. 4. Praha 1936.
- Coker, W.Ch. and Couch, J.N., The Gasteromycetes of the Eastern United States and Canada - Chapel Hill, 1928.
- Cooke, M.C., Handbook of British Fungi, vol. 1-2 - London, 1871.
- , idem, 2nd and revised edition - London, 1883.
- , Mycographia, seu Icones Fungorum vol. 1, Discomycetes, part 1 - London, 1879.
- , Illustrations of British Fungi(Hymenomycetes), vol. 1-8 - London, 1881-1891.
- Corner, E.J.H., A Monograph of Clavaria and allied Genera - Ann. Bot. Mem., no 1, 1950.
- Cunningham, G.L. van, The Gasteromycetes of Australia and New Zealand Dunedin, 1942.
- Donk, W.A., Revisie van de Nederlandse Heterobasidiomycetae (uitgez. Uredinales en Ustilaginales) en Homobasidiomycetae-Aphylophoraceae, Deel 1 - Med. Nederl. Mycol. Ver. vol. 18- 20, 1931, p. 67 - 200.
- , Revision der niederländischen Homobasidiomycetae-Aphylophoraceae II - Med. Nederl. Mycol. Ver. vol. 22, 1933.
- Eyndhoven, G.L. van, Das Genus Tulostoma in den Niederlanden - Med. Nederl. Mycol. Ver., vol. 24, 1937 p, 7-11.

- , Uebersicht über die Verbreitung der Genera Geastrum, Myriostoma und Astraeus in den Niederlanden - Med. Nederl. Mycol. Ver., vol. 24., 1937, p, 20-48.
- Favre, J., Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et de quelques régions voisines - Matériaux pour la Fl. Cryptogam. Suisse, vol. 10, fasc, 3 - Berne, 1948.
- Fries, E., Observationes Mycologicae - Havniae, 1815.
- , Systema Mycologicum I - III - Gryphiswaldiae, 1821-1832.
- , Epicrisis systematis Mycologici - Upsaliae, 1836-1838.
- , Summa vegetabilium Scandinaviae, sectio posterior - Holmiae et Lipsiae, 1849.
- , Hymenomycetes Europaei - Upsaliae, 1874.
- Fuekel, L., Symbolae Mycologicae, Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Pilze - Wiesbaden, 1869.
- , idem, Nachträge I - III - Wiesbaden, 1871-1875.
- Gal, Mme M. le, Flore mycologique des Bois de la Grange et de l'Etoile, Discomycètes - Rev.de Mycol., N.S., vol. 2, 1937, p. 150-162, 197-222.
- , Quelques Galactinia de la Flore Française - Rev. de Mycol., N.S., vol. 4, 1939, p. 169-186; vol. 5, 1940, p. 102-112; vol. 10, 1945, p.90-95.
- , Les Aleuria et les Galactinia - Rev. de Mycol., N.S., vol. 6, 1941, Suppl., p.56-82.
- Gilbert, E.J., Le genre Amanita Persoon Thèse Paris, 1918.
- , Amanitaceae in Bresadola, Iconographia Mycologica, vol. 27, suppl. 1, fasc 1-3, 1940.
- Grelet, L.J., Les Discomycètes de France d' après la classification de Boudier - Bull. Soc. Bot Centre-Ouest, Sect. rég, Bot., 1932-1939 en Rev. de Mycol.N.S., vol. 7-14, 1942-1949.
- Hollós, L., Die Gasteromyceten Ungarns - Leipzig, 1904.
- Huijsman, H. S. C., Observations sur le "genre" Lepiota - Med. Nederl. Mycol. Ver., vol. 28, 1943, p. 3-60.
- , Lepiota pseudo-lilacea nov. spec. - Bull. Soc. Linn. Lyon, vol, 16, 1947, p.-180-182.
- Kallenbach, Fr., Die Röhrlinge (Boletaceae) in Die Pilze Mitteleuropas, vol. 1 - Leipzig, 1926-1928.
- Kern, Hs., Die Röhrlinge, Boletaceae - Olten, 1945.

- Knauth, B. und Neuhoff, W., Die Milchlinge (Lactarii) in Die Pilze Mittel-Europas, vol, 2B, pars 5 - Leipzig ,1937-1943.
- Konrad, P. et Maublanc, A., Icones selectae Fungorum, vol. 1-6 - Paris, 1924-1937.
- , Les Agaricales, Agaricaceae in: Encyclopédie Mycologique, No.14 - Paris, 1948.
- Kühner, R., Notes sur le genre *Inocybe* - Bull, Soc. Mycol. France, vol. 49, 1933, p 81-121.
- , Recherches sur le genre *Lepiota* - Bull. Soc. Mycol. France, vol. 52, 1936, p. 177-238.
- Kühner, R. et Boursier, J., Notes sur le genre *Inocybe* - Bull. Soc. Mycol. France, vol. 48, 1932, p. 118-161.
- Lange, J.E., Flora Agaricina Danica, vol. 1-5 - Copenhagen, 1935-1940.
- Lange, M., Species concept in the Genus *Coprinus*. A study on the significance of intersterility - Dansk Bot. Ark. , vol, 14, 1952, no. 6.
- Locquin, M., Notes sur les *Lépiotes* II - Bull. Soc. Linn. Lyon, vol, 14, 1945, p. 44-63, 82-100.
- , Notes sur les *Lépiotes* III. Synonymie des espèces figures dans la Flora Agaricina Danica de Lange - Bull. Soc. Linn. Lyon, vol. 15, 1946, p. 17-18.
- Malençon, G. ,Les Truffes Européennes - Rev. de Mycol., vol. 3, Mém.1, 1938.
- Massee, G., British Fungus-Flora, vol. 1-4 - London, 1892-1895.
- Müller, E., Die schweizerischen Arten der Gattung *Leptosphaeria* und Ihrer Verwandten - Sydowia, vol. 4, 1950, p. 185-319.
- Nannfeldt, J.A., Studien über die Morphologie und Systematik der nicht-lichenisierten inoperculaten Discomyceten - Nov. Act. Reg. Soc. Sci. Upsal. , ser. 4, vol. 8, 1932, no 2.
- , The Geoglossaceae of Sweden - Ark. f. Bot., vol, 30 A, 1942, no. 4.
- Neuhoff, W., Die Gallertpilze (Tremellineae) in: Die Pilze Mitteleuropas, vol. 2 A - Leipzig, 1935-1936.
- , Die Gallertpilze Schwedens (Tremellaceae, Dacrymycetaceae, Tulasnellaceae, Auriculariaceae) - Ark. f. Bot., vol. 28 A, 1936, no 1.

- Nüesch, E., Die Trichterlinge. Monographie der Agariceen-Gattung Clitocybe mit Bestimmungsschlüssel - St. Gallen, 1926.
- Oort, A.J.P., De Nederlandsche Mycena's - Med. Nederl. Mycol. Ver. , vol. 16-17, 1928, P. 184-255.
- Pearson, A.A., Notes on the Boleti - Naturalist, 1946, p. 85-99.
- , The genus Russula - Naturalist, 1948, p. 85-108.
- , The genus Russula. Second and revised edition - Naturalist 1950. p. 1-24.
- , British Boleti - Naturalist, 1950, p. 1-19.
- , The genus Lactarius - Naturalist, 1950; p. 81-99.
- Perdeck, A. C., Revision of the Lycoperdaceae of the Netherlands - Blumea, vol. 6, 1950, p. 480-516.
- Persoon, C. H., Synopsis methodica Fungorum - Gottingae, 1801.
- , Mycologia Europaea, vol, 1-3 - -Erlangae, 1822- 1828.
- Phillips, W., A Manual of the British Discomycetes, etc, - London, 1887.
- Pilat, A., Pleurotus Fries in Kavina & Pilát, Atlas des Champignons de l'Europe, vol. 2 - Praha, 1935.
- Pilát, A., Polyporaceae in Kavina & Pilát, Atlas des Champignons de l' Europe, vol.3 - Praha, 1936-1942.
- , Revision der Gattung Lentinus Fr. aus dem Herbar des Naturhistoriska Riksmuseet in Stockholm - Ann.Mycol., vol.39, 1941, p. 71-103.
- , The Bohemian species of the Genus Agaricus - Act. Mus. Nation. Pragae vol, 7 B, 1951, no 1.
- Quélet, L., Les Champignons du Jura et des Vosges, vol. 1-2 - Paris, 1870-1873.
- , Enchiridion Pungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium - Lutetiae. 1886.
- , Flore Mycologique de la France et des pays limitrophes - Paris, 1888.
- Rea, C., British Basidiomycetes. A Handbook to the larger British Fungi - Cambridge, 1922.
- Rehm, H., Ascomyceten in Rabenhorst, Kryptog.-Fl. Deutschl., ed. 2, vol, 1. pars 3 - Leipzig, 1896.
- Rieken, A., Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Länder, besonders Oesterreichs und der Schweiz - Leipzig, 1915.

- Romagnesi, H., Classification du genre *Drosophila* Quélet - Bull. Soc. Linn. Lyon vol. 13, 1944, p. 51-54.
- , Synonymie de quelques-unes des espèces figurées dans la Flora Agaricina Danica de J.E. Lange - Bull. Soc. Mycol. France, vol. 60, 1944, p 82-87.
- Saccardo, P.A. ,Sylloge Fungorum, vol. 1-25 - 1882-1931.
- Schaeffer, J., *Russula* Monographie - Ann. Mycol. vol. 31, 1933, p. 305-516: vol, 32, 1934, p. 141-243.
- Seaver, F.J., *The North American Cup-Fungi (Operculates)* - New York, 1928.
- , Idem, supplement - New York, 1942.
- , *The North American Cup-Fungi (Inoperculates)* - New York, 1951.
- Singer, R., *Monographie der Gattung Russula* - Hedwigia, vol. 66, 1926, p. 163-260.
- , *Neue Mitteilungen über die Gattung Russula* - Hedwigia, vol. 68, 1928, p. 191-202; vol, 69, 1929, p. 253-261.
- , *Monographie der Gattung Russula*. Beih. Bot. Centralbl., vol. 49, Abt. 2, 1932, p. 205-380.
- , *The "Agaricales" (Mushrooms) in modern taxonomy* - Lilloa, vol, 22, 1949.
- Singer, R. and Smith, A.H. , *A Monograph on the Genus Leucopaxillus Boursier* - Pap. Michigan Acad. Sci. Arts Lett., vol. 28, (1942)1943, part 1, p 85-132.
- Smith, A.H., *Studies in the Genus Agaricus* - Pap. Michigan Acad. Sci. Arts, Lett., vol. 25, (1939)1940, part 1, p, 107-138.
- , *The North American species of Mycena* - Ann Arbor, 1947.
- Smith, A.H. and Singer, R., *A Monograph on the Genus Cystoderma* - Pap. Michigan Acad. Sci. Arts. Lett., vol. 30 (1944)1945, part 1, p. 71-124.
- Smith, H.V., *The Genus Limacella in North America* - Pap. Michigan Acad. Sci. Arts. Lett., vol 30, (1944)1945, part 1, p, 125-147.
- Sydow, P. et H., *Monographia Uredinearum*, vol. I-IV - Lipsiae 1904-1924.
- Velenovsky, J., *Monographia Discomycetum Bohemiae* - Pragae, 1934.
- Vesely, R., *Amanita in Kavina & Pilát, Atlas des Champignons de l'Europe*, vol. 1 - Praha, 1934.
- Viennot-Bourgin, G., *Les Champignons Parasites des plantes cultivées*,

vol. I-II - Paris, 1949.

III. ADRESLIJST

Adressen - 8, p. 2-7; 12, p. 33-38; 16, p. 51-59.

ADDENDA

- Heim, R., Le genre *Inocybe* in Encyclopédie Mycologique I - Paris, 1931.
- Kühner, R., Le genre *Galera* (Fries) Quélet in Encyclopédie Mycologique VII - Paris, 1935.
- , Le genre *Mycena* (Fries) in: Encyclopédie Mycologique X - Paris, 1938.

IV. ARTIKELLEN en MEDEDELINGEN (gerangschikt naar de belangrijkste slagwoorden)

- Aanvulling, Een kleine (de Veye) - 10, p. 25-26.
- Aardappelbovist, Het drama van de (de Veye) - 6, p. 10-11.
- Aardster-flora van Amsterdam, De (van Eyndhoven) - 12, p. 78-79.
- Aardsterren en boomen?, Bestaat er verband tusschen (van Eyndhoven) -
6. p. 85-86.
- Aardsterren, Het bewaren van gedroogde (van Eyndhoven) - 5, p. 56.
- Aardtong en truffelknotszwam (de Veye) - 6, p. 84-85.
- Afbeeldingen van Nederlandse paddestoelen, Navraag omtrent (Boetje-
van Ruyven) - 8, p. 43.
- Afwijking bij *Geaster striatus* D. C., Een merkwaardige (van Eyndhoven) -
6, p. 69.
- Afwijkingen bij paddestoelen, Enkele zeldzame (Wildervanck) - 19, p. 13-
17.
- Albinisme bij paddestoelen (van der Lek) - 10, p. 24-25.
- Albino's onder de paddestoelen (van der Lek) - 10, p. 12.
- Allerhande (Mycol. persberichten: Verzoek om medewerking;
promotiebericht; *Flora Agaricina Danica*; van den redacteur) (de
Veye) - 6, p. 57-58.
- Amanitopsis strangulata* Fr. en nog iets (G. A. de Vries) - 13, p. 10-12.
- Ambrosia (van den Bergh) - 18, p. 31-33, 49-51.
- Ambrosia-gallen (Docters van Leeuwen) - 18, p. 47-49.
- Amoebe met een staartje, Een (Middelhoek) - 11, p. 59-61.
- Amsterdam als paddestoelendorado (Kleijn) - 8, p. 38-39.
- Amsterdam, De paddenstoelen-inventaris van (Akke de Vries) - 5, p.
69-70.
- Amsterdam, De Zuidelijke wandelweg bij (Smit) - 8, p. 67.
- Amsterdam en de mycologie (Akke de Vries) - 5, p. 51-54.
- Amsterdam, Fungi in (Kleijn) - 11, p. 24.
- Amsterdam's aardster-flora (van Eyndhoven) - 12, p. 78-79.
- Apeldoorn 21-22 Sept. 1940, Met de N.M.V. op excursie in de omstreken
van (de Veye) - 12, p. 2-5.
- Arachnopeziza aurelia* (Fr. ex Pers.) Fuck., een nieuwe *Discomyceet* voor
ons land? (Gremmen) - 18, p. 4-6.
- Ardennen, Interessante vondsten in de (Oort) - 9, p. 26-27.

- Armillaria mellea* (Vahl) Quél. , Onderzoekingen over (van Vloten) - 8, p. 20-23.
- Ascomyceten, Een bijdrage tot de kennis der Nederlandse (Gremmen) - 17, p. 32-34.
- Ascomyceten in de omgeving van Eindhoven, Eenige opmerkingen over het voorkomen van sommige minder algemeene (Daams) - 15, p. 31-32. Asco's, Een paar nieuwe (Schweers) - 8, p. 66-67.
- Badhamia utricularis* (Berk.), Nieuwe voedsterzwam voor (Schweers) - 7, p. 77.
- Bekeerd (Huysman) - 1, p. 5-7.
- Bekerzwam, De blaasvormige (de V.) - 8, p. 45.
- Bekerzwam, De grote bruine (de V.) - 6, p. 21.
- Bekerzwammen, Oranje (Bakker) - 10, p. 38-39.
- Bekerzwammetjes in den winter (Kleijn) - 8, p. 55-56.
- Belangrijk bericht (de Veye) - 5, p. 13-14, 27-28.
- Belonioscypha* sensu Rehm en de identiteit van *B. ciliatospora* (Fuck.) Rehm en *Helotium scutula* (Pers. ex Fr.) Karst. (Gremmen) - 20, p. 7-17.
- Berkenboleet en zijn verwanten, Over de (Maas Geesteranus) 16, p. 13-16, 27-30.
- Berkenboleet, Nogmaals de "groene" (Schweers) - 6, p. 70-71.
- Betuwe, Enkele merkwaardige vondsten uit de (Verschueren) - 6, p. 8-9.
- Biefstukzwam op het hout van eiken, De invloed van de (Schoevers) - 10, p. 19-21.
- Blauwzuur in paddestoelen (Schraevesande) - 18, p. 6.
- Bloedstelpende werking van *Rhacodium Cellare* (Pers.) (Ligtenberg) - 10, p. 65-66.
- Boekbesprekingen - zie aparte rubriek.
- Boleet ?, Een nieuwe (Bouwman) - 1, p. 53-54.
- Boleet, Een purperroode (F.) - 1, p. 25-26.
- Boleten, De Nederlandsche (Joman) - 6, P. 46-48, 62-63, 82-84.
- Boleten, Over (Huysman) - 18, p. 17-23, 37.
- Boletus aurantiacus* Roques ex Bulliard (van Eyndhoven) - 16, p. 16-17.
- Boletus auriporus* Peck 1872 (van Eyndhoven) - 11, p. 22-23.
- Boletus auriporus* Peck 1872, Een nieuwe boleet voor ons land (van Eyndhoven) - 7, p. 27-30.
- Boletus parasiticus* op *Scleroderma vulgare* (Edie) - onderschrift (R.) 3,

- p. 39-40.
- Boletus pseudo-sulphureus* Kallenbach, De nieuwe boleet (Bouwman) 1, p. 62.
- Boletus Rhodoxanthus* (Krombh.) Kbh. (van Eyndhoven) - 5, p. 33-34.
- Boletus rufescens* (Secr.) Konrad (Middelhoek) 15, p. 10-11.
- Boletus scaber* en *rufus*, Kleurvariaties bij (Akke de Vries) - 6, p. 55.
- Boting-fonds. Attentie voor het (de Veye) 11, p. 48.
- Boting_fonds, Nogmaals het Hendricus (de V.) - 9, p. 14.
- Brabant, Nieuws uit (Daams) 17, p. 63-65.
- Brand, Na de (Boetje van Ruyven) - 19, p. 23-24.
- Brandnetelklokje (de Veye) - 9, p. 54-56.
- Brandplek-ervaringen, Enkele (de Veye) - 10, p. 39.
- British Mycological Society, De Jubilee Meeting van de (Oort) 17, p. 51-52.
- Buitenlandse litteratuur, Uit de, zie onder rubriek Boekbesprekingen.
- Cantharellus olidus* Geurende cantharel (Oort) 6, p. 25-27.
- Ceratostomella ulmi*, de geslachtelijke vorm van *Graphium ulmi* Schwarz (M.) 3, p. 77-78.
- Ceratostomella ulmi* in de poppenwiegen van de iepenspintkever ?, Door welke oorzaak ontstaan de coremia van (Fransen) - 7, p. 39-41.
- Chaan, Paddenstoelenvondsten in de omgeving van (Walrecht) - 8, p. 34-35.
- Champignon kweekkerij van de Herofabrieken, Een bezoek aan de (Clerx) - 3, p. 3-5.
- Champignon, Mijn grootste (Scheevers) 11, p. 9-11.
- Champignons, predateurs Les (verslag van lezing en film) (van den Bergh) 17, p. 57-61.
- Claudopus byssisedus* (Fr. ex Pers.) Gillet, Over een mycophagische eigenschap van (Schweers) - 14, p. 10-11.
- Clitocybe olearia* (De Candolle) R. Maire, een nieuwe aanwinst voor onze fungiflora (de Veye) - 11, p. 53-58.
- Clitocybe vibecina*, Heksenkringen van (Clerx) - 3, p. 64-65.
- Coccomyces coronatus* (Schum.) De Not. (Gremmen) - 17, p. 4-5.
- Conserveeren van paddenstoelen (Meulenhoff) - 2, p. 81-82.
- Conserveermiddel voor paddenstoelen (Uffellie) 9, p. 45.
- Coprinus atramentarius* en alcohol (Wildervanck) 20, p. 4-6.
- Coprinus comatus* (Boting) 5, p. 56-57.

Coprinus comatus, Andermaal (Bakker) 5, p. 94.
Coprinus dilectus Fr. (van der Laan) - 14, p. 75.
Coprinus geb. *atramentarius*, De kinderkamer van de familie (de Veye) - 6, p. 72-73.
Cordyceps capitata en *C. ophioglossoides* (Wildervanck) - 16, p 46.
Cordyceps soorten, Indische (de Lint) 7, p. 30.
Cortinari-soorten, Enkele voor ons land nieuwe (de Veye)- 6, p. 48-52.
Craterellus sinuosus e.a. (Klein) - 10, p. 36.
Daedalea en *Trametes* (Bakker) - 8, p. 41.
Daldinia concentric (Bolt. ex Fr.) Ces. et De Not. (van Kregten) - 16, p. 4-6.
 Dankbetuiging (de V.) - 5, p. 26-27.
 Dank, Een woord van (de Lint) - 18, p. 76.
 Delden !, Komt naar (Schweers) - 1, p. 17-18.
 Delden, Onze excursie in de omstreken van - 1, p. 29-30.
 Denekamp, Herinneringen aan enkele vacantedagen te (Huysman) - 13, p. 46-48.
 Dennenmoorder en zwavelkopje als concurrenten (Oort) - 20, p. 2-4.
 Dennenschelpje, Het (de Veye) - 5, p. 73-74.
Desmazierella acicola Lib. (Schweers) - 12, p. 73-75.
Desmazierella acicola Lib., De imperfecte vorm van (Gremmen) - 19, p.32-35.
 Determineeren, Foutief (Bakker) - 14, p. 59-60.
 Determineeren van de hogere fungi, Het (Meulemeester) - 2e aankondig. no, p. 2-5.
 Determineertabel voor de geslachten der witsporige plaatjeszwammen (van Eyndhoven) - 14, p. 15-17.
 Determineertabellen voor de geslachten der gekleurdsporige plaatjeszwammen (van Eyndhoven) - 15, p. 19-22.
 Diagnose, Om een (Middelhoek) - 12, p. 27-30.
Dichomyces princeps Thaxter (Middelhoek) 12, p. 76-77.
Dictyophora, De sluier van (Reijnders) - 11, p. 49-53.
Dictyophora duplicata (Bosc)Ed. Fischer in Nederland ? (Zaneveld) - 10, p. 48-49.
Dictyophora dupiicata (de gesluierde dame) waarschijnlijk reeds in 1917 in ons land gevonden en andere belangrijke Phalloideeën-vondsten hier te lande (Reijnders) - 11, p. 29-35.

Disciseda cervina (Berk.)Cunningham, een nieuwe aanwinst voor ons land (van Eyndhoven). - 10, p. 55-57.
 Discomyceet, parasiteerende op het steenlevermos, Een nieuwe exotische (Schweers) - 17, p. 36-37.
 Disco's der Nederlandsche flora, Kleine bleeke (Schweers) – 12, p. 43.
 Disco's der Nederlandsche flora, Kleine bruine of zwarte (Schweers) - 12, p.42-43.
 Disco's der Nederlandsche flora, Kleine gele en roode (Schweers) - 12, p.24-25, 42.
 Diversen - 5, p. 75-77; 6, p. 19, 40, 57-58, 73-74, 90; 7, p. 18, 35-36, 51-52, 64, 80.
Dothidella ulmi (puv.)Winter en zijn levenswijze (Gremmen) 19, p. 8-10.
 Drente, Enige aardige vondsten in (Reijnders) 12, p. 7-11, 57-62.
 Droogte en toch ... of wel: ende desespereert niet! (van den Bergh) - 18, p. 7-8.
 Droogtevormén van *Collybia maculata*. Twee merkwaardige (Akke de Vries) - 6 , p. 33.
 "Education mycologique" (Wilhadus) - 5, p. 34-35.
 Eerelid, Ons tweede (de V.) - 5, p. 26-27.
 Eerstelingen (Klein) - 10, p. 66.
 Eetbaarheid van zwammen, Over (Valckenier Suringar) - 4, p. 11-12.
 Eikhaas die een beukhaas bleek te zijn, Van een (de Veye) - 11, p. 27.
 Eikhaas en reuzenzwam (de Veye) - 5, p. 70-71.
 Eindhoven in 1949, Paddenstoelvondsten in de omgeving van (Daams & Westmijze) - 19, p. 61-64.
 Enschede, Met de Mycologische op excursie in de omstreken van (de Veye) - 9, p. 17-19.
Entoloma sphagneti R Naveau n.s. 1923 (Schweers) - 19, p. 10.
 Eten van paddestoelen door eekhoorns (van Eyndhoven) - 12, p.64-65.
 Excursies op kleinere schaal, Plan voor districtsgewijze (Smit) - 14, p.36.
 Excursie-verslagen - zie aparte rubriek;
 Fabius als Fungus-redacteur (Reijnders) - 3, p. 73-74.
 Fabius, Generaal (Wilhadus) - 3, p. 72-73.
Fistulina hepatica, Het vruchtlichaam van de biefstukzwam (Reijnders), 8, p. 53-63.
Flammula henningsii Bres. (Westmijze) - 19, p. 30-32.
 Fluweelpootje tussen gras (Clerx) - 3, p. 64-65.

Fomes annosus Fr., Waarnemingen over (van Vloten) - 7, p. 25-27.
 Fotografeeren van paddestoelen (Bouwman) - 1e aankondig. no; p. 4-7.
 Fransche alpen, Mycologische vondsten in de (Swanenburg de Veye) - 4,
 p. 3-6, 19-23.
 Franse mycologen, Het congres van de (Westmijze) - 18, p. 73-75.
 Fransche mycologen op stap, Met de (Huysman) - 9, p. 23-24.
 Fransche mycologen op stap, Met de (Schweers) - 6, p. 86-88.
 Fuligo septica, Enorme ontwikkeling van (v.d.Lek) - 5, p. 91.
 Fungilore - 1e aankondig.no. p. 11-12.
 Fungilore (F.)- 1, p. 10.
 Fungilore. Een en ander omtrent het woord paddenstoel en verwanten
 (Brakman) - 1, p. 21-23.
 Fungilore, Judasziel, Middel tegen koorts (Andriessse) - 2, p. 81.
 Fungilore, Volksgeloof en Vogelnestzwammetjes (Fabius) - 2, p. 80-81.
 Fungilore, Vragenlijst over - 12, p. 50-51.
 Fungi van de Kaloot, Een paar (Maas Geesteranus) - 20, p. 69-71.
 "Fungus" fundatus ! - 2, p. 1.
 Fungus 10 jaar ! (Reijnders) - 10, p. 44-45.
 Fungus 15 jaar ! (Reijnders) - 15, p. 15-16.
 Gallen op paddenstoelen (van Eyndhoven) - 14, p.67-69.
 Gallen op paddenstoelen, 4e mededeeling (van Eyndhoven) - 15,p. 30-31.
 Ganoderma voor ons land? Een nieuwe (Oets) - 16, p. 32.
 Geaster nanus P. met triplex-kraag (van Eyndhoven) - 7, p. 57.
 Geaster rufescens P., Een merkwaardige afwijking bij (van Eyndhoven) -
 7, p. 57-68.
 Geaster striatus D.C., Een merkwaardige afwijking bij (van Eyndhoven) -
 6, p. 69.
 Geaster triplex Jungh. (van Eyndhoven) - 6, p. 12.
 Geastrum nanum Pers. met twee peristomen (Van Ooststroom) - 14, p. 49.
 Geastrum schaefferi Vitt., Een nieuwe aardster voor Nederland (van
 Eynd hoven) - 12, p. 11-12.
 Gekraagde aardster (Geastrum triplex Jungh.) Een merkwaardige groep
 van de (van Eyndhoven) - 11, p. 26.
 Gekraagde aardster met dubbel peristoom (van Eyndhoven) - 7, p. 7-8.
 Geopyxis ammophiia (Dur. et Lév.) Sacc. (= Peziza sabulicola Dunal)
 (Schweers) - 5, p. 64-65.
 Gepeperde melkzwam, Een en ander over de (de Veye) - 5, p. 17.

Gesluerde dame, De (Klein) - 11, p. 8-9.
 Gesluerde dames in één tuin, Negen (Boetje-van Ruyven) - 11, p. 46-47.
 Giftige paddenstoelen (M.) - 1, p. 73-74.
 Giftpilze und Pilzvergiftungen, Ueber (Welsmann) - 6, p. 77-78.
 Glinsteringen (Klein) - 11, p. 25.
 Glinsteringen der jaren 1940 en 1941 (Schweers) - 13, p. 34.
 Glinsteringen der jaren 1946 en 1947 (Schweers) - 18, p. 34.
 Glinsteringen des jaars (Schweers) - 2, p. 64; 3, p. 75-76; 8, p. 37-38.
 Glinsteringen des jaars 1935 (Schweers) - 7, p. 55-56.
 Glinsteringen des jaars 1937 (Schweers) - 9, p. 39-40.
 Glinsteringen des jaars 1938 (Schweers) -10, p. 37.
 Glinsteringen des jaars 1939 (Schweers) -11, p. 43.
 Glinsteringen des jaars 1942 (Schweers) -14, p. 66.
 Glinsteringen des jaars 1943 (Schweers) -15, p. 11.
 Glinsteringen des jaars 1944 (Schweers) -16, p. 31.
 Glinsteringen des jaars 1945 (Schweers) -17, p. 6.
 Glinsteringen van een fungi-arm jaar (Meijer) - 18, p. 52-53.
 Gloeoglossum affine Durand een nieuwe aardtong voor Europa
 (Schweers) - 20, p. 68-69.
 Gorssel als mycologische delicatessen opgediend krijgt! Wat ge te
 (de Veye) - 7, p. 8-10.
 Gorssel op 12 en 13 Oct. 1940, Algemeene ledenexcursie der N.M.V.
 te (Smits) - 12, p. 19-21.
 Gorsselsche excursie (4-5 Oct. 1935), Na de (Smits) - 7, p. 77.
 Groene knolzwam, Signalement van de - 3, p. 46-47.
 Groene schimmels (Lütjeharms) - 2, p. 30.
 Groene schimmels (M.) - 1, p. 9, 28, 46.
 Groningen Mycologische vondsten op een fabrieksterrein, Paddenstoelen-
 nieuws uit (Swanenburg de Veye) - 2, p.33-37, 50-53.
 Grijs klokjes (Klein) - 7, p. 12-13.
 Gyromitra (Helvella) gigas Krombh. (van Eyndhoven) - 5, p. 91-92.
 Hebeloma sacchariolum, Ongewone ontwikkeling van (van der Lek) - 10,
 p. 61-63.
 Heksenkring, De geschiedenis van een (van der Lek) - 7, p.10-11.
 Heksenkringen en antibiotica (Hueck) - 17, p. 1-4.
 Heksenkringen en antibiotica, Rectificatie op (Hueck) - 17, p. 44.
 (Helvella ephippium Lév.), Een zeldzame Helvella weergevonden (Kleijn

en Agsteribbe) - 14, p. 73-74.
 Helvella queletii Bres. (Schweers) - 13, p. 24-25.
 Herfstkleuren (Schraevesande) - 16, p. 47-48.
 Hoorn van Overvloed bij Gieten, De (de Veye) - 12, p. 17.
 Hoorn van Overvloed, Een nieuwe rijk voorziene vindplaats van de (de Veye) - 9, p. 11-12.
 Huidverschijnselen veroorzaakt door eetbare paddestoelen (de Veye) - 13, p. 28.
 Hulpbetoon, Onderling (Redactie) - 18, p. 54-55.
 Hulp gevraagd (Smit) - 17, p. 28.
 Hymenotria tulasnei (Middelhoek) - 16, p. 19.
 Hydnum erinaceum, Een Nederlandschen naam voor - 3, p. 48.
 Hygrometrische aardster, Astraeus hygrometricus, in het westen des lands (van Eyndhoven) - 17, p. 30-32.
 Hygrophorusweide, een associatie (Andreas) - 20, p. 66-68.
 Hygrophorusweide, een associatie (Schweers) - 19, p. 17-18.
 Hymenogaster tener (Berk.), een nieuw geslacht en een nieuwe soort voor Nederland (G. A. de Vries) - 11, p. 20-21.
 Iepen ziekte - 1, p. 36.
 Indië, Mycologische waarnemingen in (Lütjeharms) - 9, p. 3-5.
 Inktzwammen met rode inkt (Boetje-van Ruyven) - 10, p. 25.
 Inktzwammen zonder inkt (de Veye) - 10, p. 12.
 Inleiding, Ter (Oort) - 5, p. 1.
 Inocybe fulvida Bres. (Schweers) - 15, p. 2-3.
 Inocybesoorten uit ons land, Nieuwe (Huysman) - 7, p. 5-7.
 Inocybe's, Twee (Reijnders) - 13, p. 44-46.
 Intermezzo (de V.) - 9, p. 29.
 Internationale band tusschen mycologen, Een 2e aankondig.no, p. 10.
 Isaria farinosa (Klein) - 9, p. 10.
 Isaria's in ons land ?, Hoe staat het met de (Daams) - 18, p. 44-46.
 Jaarverslag van den secretaris - zie rubriek Bestuursmededelingen.
 Jubileums-paddenstoelententoonstelling te doen slagen, Leden helpt allen mee onze (Swanenburg de Veye) - 18, p. 42-44.
 Judasoor in onze oude kruidboeken, Het (van Dijk) - 14, p. 27-30.
 Kampernoeljes of Champignons (F.) - 2e aankondig.no. p. 5-7.
 Kapjesmorielje, De (Klein) - 5, p. 90-91.
 Kegel-mycena, De (Klein) - 7, p. 50.

Kennemerland, Eenige vondsten in (Boting) - 4, p. 24-25, 61.
 Kerstgaven (Klein) - 9, p. 46.
 Keverschimmels op een gastheer, Twee (Middelhoel) - 16, p. 6-8.
 Kleine Stinkzwam, De (van de Wouw) - 3, p. 32.
 Kleinigheden (Klein) - 11, p. 64-65.
 Kleuren (Bakker) - 16, p. 8.
 Koeienboleet en rose spijkerzwam (de Veye) - 6, p. 88-89.
 Kopergroenzwam en brandnetels (Klein) - 8, p. 40.
 Kopschimmel, Een (Klein) - naschrift (de Veye) - 6, p. 69-70.
 Krulzoom zoekt het hooger op, De (van der Lek) - 13, p. 35-37.
 Kweken van paddenstoelen, Het (Andriessse) - 3, p.5-7.
 Laboulbeniaceae voor ons land, Een nieuwe (Middelhoek) - 13, p. 52-53.
 Laboulbenia flagellata Peyritsch, een merkwaardige en voor Nederland
 nieuwe fungus (Zaneveld) - 9, p. 61-65.
 Laboulbeniales voor ons land, Enige nieuwe (Middelhoek) - 14, p. 57-
 59,71-72.
 Leden onzer vereeniging, Aan het bestuur en aan alle (Huysman) - 9, p.
 47-48.
 Ledenvergadering- convocaties en verslagen - zie Bestuursmededelingen.
 Ledenvergadering in Utrecht, Komt allen 14 Juli a.s. op de algemeene
 (de Veye) - 5, p.79-80.
 Lek erelid van onze vereniging, Dr van der (Swanenburg de Veye) - 17,
 p. 41-42.
 Lentinus adhaerens Fries (1836) ex Albertini et Schweinitz, een nieuwe
 aanwinst voor onze fungiflora (G.A. de Vries) - 14, p. 46-47.
 Lepiota brebissonii Godey (Huysman) - 12, p. 67-73.
 Lepiota brebissonii Godey (van der Lek) 20, p.45-46.
 Lepiota ?, Een tropische (van der Laan) - 15, p. 4-5.
 Lepiota en nog wat, Over het geslacht (Huysman) 9, p. 65-68.
 Lepiota odorata Cool, Een nieuwe vindplaats van (Joman) - 5, p. 34.
 Lepiota procera, Eigenaardige vindplaatsen van de grote parasolzwam
 (van der Lek) - 8, p. 15-16.
 Lepiota pudica (Bull.) (Boting) - 6, p. 53.
 Lepiota's en nog wat, Over (Huysman) - 9, p. 50-52.
 Lepiota's in bloemenkassen; een nieuwe soort? (Meijer) - 14, p. 4-8.
 Leptonia parasitica Quélet (- Claudopus subdepluens Fitzpatrick)
 (Meulenhoff) - 5, p. 84-86.

Levertraanzwam *Naucoria cucumis* (Pers.) Fr., De (de Veye) - 6, p. 27-29.

Lezing (over *Coprinus*) voor de flora-commissie, Verslag van een (Uffellie) - 18, p. 35-37.

Lichtende *Mycena's* (van der Lek) - 4, p. 42-44.

Lichtend hout (*Fabius*) - 2, p. 37-39; 3, p. 40-42.

Lichtgevende larven in boomzwammen (*Schweers*) - 12, p. 32.

Lütjeharms tot hoogleraar benoemd, Dr. W.J. (de V.) - 9, p. 29-30.

Lycoperdon-onderzoek, Voorlopig verslag van het (*Maas Geesteranus* en *Perdeck*) - 19, p. 18-22.

Maan invloed op den groei van paddenstoelen ? Heeft de (*Fabius*) - 3, p. 54-58.

Marasmius (*Crinipellis*) *stipitarius* (Fr.), De substraten van (van *Eyndhoven*) - 16, p. 34-35.

Martinet en de zwammen (*Daams*) - 20, p. 34-35.

Mea culpa (van den *Bergh*) - 19, p. 23.

Mededeelingen van den conservator - 1e aankondiging no. p. 15-16; 2^e aankondig. no., p. 14-15.

Medewerking aan de 14e paddenstoelen-tentoonstelling, Oproep tot (*Bestuur en Tentoonstell. Commissie*) - 2, p. 20-22.

Medewerking bij het verzamelen van *Myxomycetes*, Dringend verzoek om - 16, p. 25.

Medewerking gevraagd voor het verzamelen van gegevens omtrent de weide-champignon, *Psalliota campestris* (*Bels*) - 16, p. 24-25.

Medewerking (*Inocybe*), Verzoek om - 1e aankondig.no. p. 13; 2^e aankondig. no. p. 12.

Medewerking, Nog een verzoek om (de *Veye*) - 10, p. 53.

Medewerking, Oproep tot (*Boetje-van Ruyven*) - 1, p. 52.

Medewerking, Oproep tot (*Kruyt*) - 11, p. 66.

Medewerking (*Russula's*), Verzoek om - 2e aankondig.no., p. 10-11.

Medewerking verzocht - 19, p. 11.

Medewerking, Verzoek om (*Oort*) - 14, p. 70.

Medewerking voor het doen van waarnemingen betreffende het voorkomen van *Stereum purpureum* en *Fomes pomaceus*, Verzoek om (*Oort*) - 10, p. 52-53.

Medewerking *Xylariaceeën*, Verzoek om - 2e aankondig.no. p. 11-12.

Melkzwammen, Twee (*G. A. de Vries*) - 15, p. 5-6.

Merkwaardige groeiplaats, Een (*Schweers*) 6, p. 72.

Merkwaardige vondst (Lütjeharms) - 1e aankondig.no., p. 15-16.
 Merulius lacrimans op steenkool (Wilhadus) - 11, p. 11-12.
 Meulemeester tot erelid der N.M.V. benoemd (de V.) - 9, p. 13-14.
 Meulenhoff als voorzitter van de Nederlandsche Mycologische
 Vereeniging, Bij het afscheid nemen van Dr. J.S. (Meulemeester) - 5,
 p. 3-5.
 Meulenhoff van 1919 tot 1933 voorzitter der Ned. Mycol. Ver. - 5, p. 2.
 Meyendelnieuws (Boetje-van Ruyven) - 5, p. 87-88.
 Milieu-verruiming (Schweers) - 4, p. 76-77.
 Misvormingen bij paddenstoelen (Klein) - 20, p. 52-53.
 Misvormingen bij plaatjeszwammen, Een paar merkwaardige (Reijnders)
 11, p. 45-46.
 Monstervormen van Collybia dryophila (Bouwman). - 6, p. 44-46.
 Monstruositeit, Een merkwaardige (Reijnders) - 6, p. 60-62.
 Monstruositeiten bij paddenstoelen (Reijnders) - 4, p. 35-41, 51-57.
 Morielje, Loflied op den (Ver Sacrum) - 16, p. 41-42.
 Morieljes (F.) - 1e aankondig.no, p. 7-9.
 Morieljesporen met het bloote oog zichtbaar (Louwaars) - 1, p. 37-38.
 Morieljes van Java, De (Boedijn) - 11, p. 6-8.
 Morieljes, Veenkoloniale (de Veye) - 9, p. 49-50.
 Morphologie en physiologie der fungi. Fragmenten uit de physiologie
 Inleiding tot de (Huysman) - 15, p. 11-13, 17-19; 16, p.2-4,
 20-22.
 Muurzwam (Plicaria muralis (Sow.) Rehm), De (W. J. L.) - 2, p. 6-9.
 Mycena osmundicola Lange (Hueck) - 13, p. 49-50.
 Mycena's gevraagd (Reijnders) - 5, P.35.
 Mycoflora van Nederland, in het bijzonder van de fungi van brandnetels,
 Een bijdrage tot de (Gremmen) - 18, p.27-31.
 Mycologie I, Enige critische opmerkingen over de moderne (Formijne) -
 19, p. 54-57.
 Mycologie en industrie (Westerdijk) - 15, p. 25-30.
 Mycologie, Hoofdstedelijke (Bol) - 7, p. 59-61.
 Mycologie in de tropen, De studie der (Boedijn) - 7, p. 67-70.
 Mycologie in het hooggebergte (Formijne) - 8, p. 24-27.
 Mycologie in Scandinavië en Finland, Iets over de (Bels-Koning) 19,
 p. 42-46.
 Mycologische aantekeningen (Maas Geesteranus) - 17, p. 27; 2-4 - 17,

- p. 37-38.
- Mycologische aantekeningen, Commentaar op (Daams) - 17, p. 46.
- Mycologische dissertatie (Schweers) - 13, p. 55.
- Mycologische film, Een nieuwe (Schweers) - 2e aankondig.no, p. 1-2.
- Mycologische herinneringen (Kam) - 13, p.35.
- Mycologische lessen (van Herwijnen) 13, p. 56.
- Mycologische lessen (van der Laan) - 13, p. 37.
- Mycologische rariteit, Een (de V.) - 5, p. 43.
- Mycologische rariteit uit de medische wereld, Een (de Veye) - 10, p. 11.
- Mycologische vondsten in de Fransche alpen (Swanenburg de Veye) - 4, p. 3-6, 19-23.
- Mycologische vondsten op champignonbedden (Broekhuizen) 8, p 48-49.
- Mycologische vondsten van de Plasmolen en Gennep in het tijdvak 1937-1949, Bijzondere (Schweers)- 20,p.46-49.
- Mycologische waarnemingen in Indië (Lütjeharms) - 9, p. 3-5.
- Mycologische waarnemingen uit de jaren 1942-47 (G.A. de Vries) - 18, p. 46-47.
- Mycologisch grapje in de zestiende eeuw (van Dijk) - 14, p. 69.
- Mycologisch werk uit het buitenland (Maas Geesteranus) - 15, p. 22-23; 17, p. 66-68.
- Myco-onderwereld, Uit de (van Wijk) - 16, p. 22-23.
- Mycophagie (Pelagicus) I-III - 14, p. 11-15; IV - 14, p. 34-35; V - 14, p. 49-51; VI - 14, p. 75-76; VII - 15, p. 13-14.
- Myxomyceten-verzamelaars, Verzoek aan onze (Schoevers) - 3, p. 13.
- Natuur ornamenteert, Als de (de Veye) - 6, p. 59.
- Natuurbescherming - le aankondig.no, p. 12-13.
- Naucoria carpophila Fr., een nieuwe zwam voor ons land (de Veye) - 5, p.57.
- Naucoria fulgens J.Favre et R Maire n.s. (subgenus Alnicola Kühner) (Schweers) - 10, p. 63.
- Nederlandsche Mycologische Vereeniging bij haar vijf en twintig jarig bestaan, De (Meulenhoff) - 4, p.64-70.
- Nederlandse Mycologische Vereniging, 40-Jarig bestaan van de (Smit) - 18, p. 26.
- Nieuw-Beerta, Paddenstoelen uit de omgeving van (Nannenga) - 6, p. 15.
- Nieuw-Beertasche paddenstoelen, Nogmaals de (Nannenga) - naschrift (de V.) - 6, p. 31-32.

Notitieboekje 1939, Uit mijn (Wilhadus) - 11, p.61-63.
 Nullenschemering en vruchtbaarheid (Schweers) - 6, p. 52-53.
 Nunspeet, Op naar - 3, p. 17-18.
 Nunspeet, Terug van - 3, p. 37-39.
 Nyctalis asterophora (Meulenhoff) - 6, p.9-10.
 Oesterzwam, Een abnormaal gevormde (de V.) - 7, p. 37.
 Oliebolzwam (Rhizina inflata Schff.), De (Weverling) - 12, p. 46-47.
 Ombrophilia clavus (Alb. en Schw.) Fr. (Schweers) - 9, p. 9-10.
 Omphalia belliae Johnst. (Kleijn) - 13, p. 25-27.
 Omphalia candida Bresadola (van Eyndhoven) 11, p. 44-45.
 Omphalia philonotis (Lasch) Quél., een nieuwe aanwinst voor onze flora
 (de Veye) - 11, p. 21-22.
 Omphalia sphagnicola (Berk.)Karst. (Schweers) - 16, p.9.
 Omphalia typhae nov. spec. (Schweers) - 6, p. 79-80.
 Omphalia viridis Lange, Omphalia umbellifera (L.)Fr. var. viridis Fr.
 (Andreas) - 20, p. 72.
 Ons terrein (Fabius en Reijnders) - 1e aankondig.no, p.34.
 Oort tot hoogleeraar benoemd, Dr. A.J.P. (de Veye) - 19, p.66.
 Oosterhout, de woonplaats van Volvaria loveiana e.a., Het bosch van
 (Schweers) - 13, p. 41-44.
 Oproep (Schweers) - 15, p. 24.
 Oudemans tot Donk, Van (Zijm) - 10, p. 15-18.
 Paddestoel als veroorzaker van huiselijk leed (Meijer) - 9, p. 25-26.
 Paddenstoel !, Een "versteende" (Spierenburg) - 5 , p. 80-84.
 Paddenstoelen (Clinge Doorenbos) - 5, p. 19.
 Paddenstoelen en antibiotica (Schraivesande) - 18, p. 53-54.
 Paddenstoelen (en een blunder van een ouden rat!) Paas- (van der Lek) -
 9, p. 56-59.
 Paddestoelen, Enkele weinig bekende of over het hoofd geziene (Boetje-
 van Ruyven) - 6, p. 68-69.
 Paddestoelen en knaagdieren ? (van Kregten) - 17, p. 9-10.
 Paddenstoelen en P.K., Paarden, (Akke de Vries) - 8, p. 39-40.
 Paddenstoelen en regenval (Reijnders) - 2, p. 9-13, 22-26.
 Paddenstoeleneters, Wenken voor (de Lint) - 11, p. 64.
 Paddenstoelenherbarium, Over het aanleggen van een gedroogde (de
 Veye) - 7, p. 58-59.
 Paddenstoelen in Augustus, De (Boting) - 6, p. 12-14.

Paddenstoelen in Britsch Indië (Stork) - 5, p. 92.
 Paddestoelen in de winter (van der Lek) - 20, p. 33-34.
 Paddenstoelen in de winter op Terschelling (Liernur) - 20, p. 18.
 Paddestoelen in een cactuskas (Smit) - 11, p. 24.
 Paddenstoelen in Engeland (Louwaars) - 2, p. 43-44.
 Paddenstoelen, Inleiding tot de kennis van (Joman) - 1, p. 3-5.
 Paddenstoelen in ultra-violet licht (Wilhadus en Fabius) - 2, p. 26-28.
 Paddenstoeleninventarisatie te Rotterdam - 14, p. 70.
 Paddenstoelenjaar 1932, Het (de Veye) - 4, p. 60.
 Paddenstoelenjaar ? Was 1928 een gunstig of een ongunstig - le
 aankondig. no., p. 12.
 Paddestoelenjager, Moeilijkheden voor den (Jurriaanse) - 7, p. 46-48.
 Paddestoelen, Korte aantekeningen over (Huysman) I - 7, p. 72-74; II -
 8, p. 11-15; III - 8, p. 50-55.
 Paddenstoelenkweekerij (de Lint) - 3, p. 76-77.
 Paddenstoelen naar plaats en tijd. Het voorkomen van (Hueck) - 17,
 p. 17-20.
 Paddenstoelennieuws uit Groningen. Mycologische vondsten op een
 fabrieksterrein (Swanenburg de Veye) I - 2, p. 33-37; II - 2, p. 50-53.
 Paddestoelen ontstonden, (Tsjechisch verhaaltje), Hoe de (Meijer)-11, p.27.
 Paddenstoelen, Oude studies over (Kleijn) - 1, p. 64-65.
 Paddenstoelen, Oude studies over (M.) - 1, p. 71.
 Paddestoelenschilder, Over Antony Keizer den (Schweers) - 8, p. 41-42.
 Paddenstoelenseizoen 1934, Het (Brakman) - 6, p. 71.
 Paddenstoelenseizoen 1934, Het (Nannenga) - 6, p. 71-72.
 Paddenstoelenseizoen 1934, Het (de Veye) - 6, p. 56.
 Paddestoelenspel - 12, p. 17.
 Paddestoelententoonstelling te Arnhem, Bezoekt vooral onze a.s. (de
 Veye) - 9, p. 1.
 Paddenstoelenvangst na een droge zomer, De (Akke de Vries) - 6, p. 33-34.
 Paddenstoelenvergiftiging - zie onder vergiftiging.
 Paddenstoelen voor onze flora, Nog een paar nieuwe (de Veye) - 6, p. 64-
 68.
 Paddenstoelen-zoeken (Fabius) 1, p.18-19.
 Paddenstoelen zoeken (de Veye) - 4, p.71-76.
 Paddenstoelen zoeken in November (Boting) - noot (de Veye) - 5, p.
 66-69.

Paddestoeltje, Een geheel gewoon (Middelhoek) - 12, p.44-45.
 Panaeolus separatus (Linn.)Fr. (Anellaria separata (Linn.)Karst.)
 (Meijer) - 13, p. 13-14.
 Panus stipticus, Abnormale (de Lint) - 11, p. 65.
 Parasieten (Klein) - 6, p. 30-31.
 Parasieten van paddestoelen, Enkele merkwaardige (van Zinderen
 Bakker) - 12, p. 39-41.
 Parasolzwam uit de duinen, Een mooie (Akke de Vries) 10, p. 35-36.
 Peniophora gigantea (Fr.) Masee aan jonge Douglassparretjes (van Luyk)
 - 8, p. 64-65.
 Peperbus (Myxostoma coliformis), Jeugdlichaam van de (Boting) - 2, p.44-
 45.
 Peperbus, zonder steeltjes, Een (van Eyndhoven) - 11, p. 63.
 Peronospora violacea Berkeley (Nieuw voor ons land)(Prell) - 14, p. 72-73.
 Phaenologie, Aanteekeningen ten dienste van de - 1, p. 24-25, 52-53.
 Phaenologie. Verschijnen van morieljes. Bijdragen voor de (Boting) - 2,
 p. 79-80.
 Phaenologie, Bijdragen voor de (Fabius) I - 2, p. 30-31; II - 2, p. 45-46.
 Phaenologie, Ulvenhoutsche bosch, Bijdragen voor de (Fabius) - 3, p. 74-
 75.
 Phaenologie, Oproep voor de medewerking ten dienste van de
 (Lütjeharms) - 1, p. 59-61.
 Phaenologie en Boletus rufus (Boting) - 2, p. 63-64.
 Phaenologie voor de bestrijding van plantenziekten en schadelijke dieren,
 De beteekenis van de (Schoevers) - 2, p. 3-5.
 Phaenologische waarnemingen (R.) - 2, p.13-14.
 Phallus hadriani Fries (Meulenhoff) - 7, p. 38-39, 53-55.
 Pistillaria quisquilliaris Fr., Nieuwe vindplaats van (van Eyndhoven) - 5,
 p. 55.
 Plaatzwammen, Twee, vermoedelijk voor Nederland nieuwe (Reijnders) -
 11, p. 4-5.
 Pleurotus (Rhodotus) palmatus (Bull. ex Fr.) (Boting) - 5, p. 33.
 Pleurotus petaloides (Bull.) Fr. (Kleijn) - 12, p. 62-64.
 Pleurotus petaloides (Bull.) Fr. (van der Lek) - 12, p. 21-23.
 Pleurotus porrigens (Pers.) Fr. (Huysman) - 7, p. 48.
 Pleurotus-puzzle, Een nieuwe (Schweers) - 8, p. 63-64.
 Pleurotus serotinus (Schrad.) (Schweers) - 9, p. 59-60.

Pluteus pellitus Pers. (de V.) - 5, p. 55.
Polyporus tuberaster Jacq. ex Fr. in Nederland gevonden, Het vruchtlichaam van (Zaneveld) - 13, p. 1-5.
 Populaire schetsen (Daams) I - 16, p. 44-45; II - 17, p. 22-23; III - 17, p. 34-36; IV - 17, p. 44-46.
Poronia punctata (L.) (van Eyndhoven) - 9, p. 69-70.
Poronia punctata (L.) (Uffellie) - 9 p. 68-69.
 Propagandacommissie, Een actieve (de V.) - 9, p. 28.
 Propagandanummer (Reijnders) - 4, p. 63.
 Proppenschietters onder de zwammen (Middelhoek) 10, p. 57-60 - Naschrift, p. 60-61.
 Prijswedstrijd - 17, p.27.
Psathyrella's, Een tweetal aardige (de Veye) - 5, p.57-59.
 Puzzeltjes (van der Lek) - 7, p. 42-44; II - 8, p. 33-37.
 Rariteiten onder de paddestoelen (Meijer) 9, p. 75-76.
 Recepten (*Pelagicus*) - 14, p.76-77, 15, p. 14-15.
Reticularia lycoperdon Bull., Over (Schure) - 5, p. 14-15.
 Retouches, Enkele (Huysman) - 19, p. 2-7.
 Reuzenbovist, De (*Bovista gigantea*) (van Herwijnen) 6, p. 29-30.
 Reuzenbovist, Eenige opmerkingen omtrent de nomenclatuur van de (van Eyndhoven) - 13, p. 50-52.
 Reuzenknotszwam (*Clavaria pistillaris*(L.)Fr.) na 36 jaar opnieuw in ons land gevonden (de Veye)- 7, p.30-32.
 Reuzenzwam in Amsterdamsch turngebouw, De "onbekende" (de Veye) - 5, p.94-95.
Rhacodium cellare (Pers.), Bloedstelpende werking van (Ligtenberg) - 10, p.65-66.
Rhizophidium acuforme is zijn naam! (Boedijn) - 17, p. 32.
Rhizophidium pollinis ? (Middelhoek) -17, p. 20-22.
 Rietland, Door het (Schweers) - 18, p.1-4.
 Roestzwammen-flora van de Zuid-Veluwerand I (Gremmen) - 19, p. 36-42.
 Roestzwammen van het riet en iets over *Darluca* (Gremmen)- 20, p. 49-52.
 Roodsporigen uit het jaar 1943 (Schweers) - 18, p. 51-52.
 Rotterdam, Enige vondsten rond (Hueck) - 16, p. 17-18.
Rozites caperata (Fries ex Persoon)Karsten (de Veye) - 7, p. 11-12.

Russula cyanoxantha ? (Bakker) - 9, p. 26.
Russula lijdensweg, Mijn genoeijlike (Imler) - 20, p. 22-32.
Russula nigricans Bull. Eigenaardige vergroeiing van (van Kregten) - 15,
p. 3-4.
Russula's, Over enkele (Huysman) - 11, p. 35-40; 12, p. 53-57.
Ruys 75 jaar. Ons eereid Joh (Meulenhoff) - 2, p. 71.
Satansboleet ? (Bredius) 3, p. 31.
Schimmels en asthma (de Fremery) - 2, p. 58-59.
Schimmels, Insecten en (Bels) 11, p 13-14.
Schizophyllum commune op walvis-beenderen (van der Lek) -7, p. 76.
Schooljeugd en de paddenstoelen, De - 1, p. 7-9.
Schooljeugd en paddenstoelen (Fabius) - 1, p.70.
Sclerotinia kirschsteiniana P.Hennings, nieuw voor ons land (Kleijn) - 15,
p. 9-10.
Sclerotinia oxycocci Wor. (Nannenga) - 7, p. 75.
Secretariaatswisseling ! (de Veye) - 11, p. 14.
September ! - 6, p. 1.
Slakkenspijs (Klein) - 6, p. 14.
Slijmzwam binnenshuis, Een (van der Lek) - 6. p. 80-82.
Slijmzwam-waarneming, Een (F.) - 1, p. 26-27.
Société mycologique de France (van Eyndhoven) - 19, p. 60- 61.
Société Mycologique de France, De session 1946 van de (Reijnders) - 17,
p. 10-15.
Spa, De afgebroken excursie te (Huysman) - 10, p. 30-32.
Speurtochten 1948 (Klein) - 19, p. 10-11.
Sporbedrijf en sporenbedrijf (Schweers) - 6, p. 41-44.
Sporenval (Schweers) - 7, p. 71-72.
Standplaats en groeiwijze der paddestoelen, Waarnemingen betreffende
de (Reijnders) - 3, p. 78-80.
Sterkop-stinkzwam - 2, p. 64-65.
Sterkopstinkzwam, De - 3, p. 1-3.
Sterzwammetje (*Nyctalis asterophora* Fr.) en zijn verwant (*Nyctalis
parasitica* Bull.), Het (Reijnders) - 9, p. 33-37.
Stinkzwammen en enkele andere kleinigheden, Geurende (van den
Bergh) - 17, p. 39.
Stinkzwam te stinken?, Wanneer begint de (Fabius) - 3, p. 32-33;
verbetering - 3, p. 50.

Stinkzwamtweeling, Een Siameesche (Edie) - 11, p. 12.
 Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. (Nannenga) - 8, p. 27-28.
 Stropharia's, Zeldzame (van der Lek) - 14, p. 30.
 Struikelblokken (Klein) - 9, p. 40.
 Suggesties (Nannenga) - 18, p. 72-73.
 Swanenburg de Veye afgetreden als redacteur van Fungus (Schoevers) -
 15, p. 1-2.
 Swanenburg de Veye afgetreden als redacteur van Fungus (Zaneveld) - 15,
 p. 1.
 Systematiek der Basidiomyceten, Inleiding tot de (Lütjeharms) I -9, p. 5-9;
 II - 9, p. 19-23.
 Systematiek der hogere zwammen van H. Romagnesi, Een interessant
 artikel over de (Reijnders) I -19, p. 26-30; II - 19, p.57-60; III - 20, p.
 40-45.
 Teekent uwe waarnemingen op ! (Fabius) - 3, p. 22-28.
 Tekenen in inkt van paddestoelen, Het (Middelhoek) - 9, p. 42-44, 52-54,
 70-72; 10, p. 9-11, 21-23.
 Tentoonstellingen, Onze - 2, p. 17-20.
 Tentoonstelling verslagen - zie rubriek Excursies, Tentoonstellingen,
 Voordrachten.
 Terschelling, Paddenstoelen in de winter op (Liernur) - 20, p. 18.
 Texel, 'n Tocht naar (Schweers) - naschrift - 7, p. 49-50.
 Texel, Zwammen-excursie op (van 't Woudt) - 6, p. 54-55.
 Thelephora sowerbii B. et Br. en Polystictus cinnamomeus (Jacq. ex Pers.)
 Sacc. (Smits) - 12, p. 23, 26-27.
 Thijsse 70 jaar, Dr Jac.P. (de Veye) - 7, p. 18.
 Toezending, Verzoek om - 3, p. 34.
 Tonderzwam als recordbreekster, Nog iets over de (Schweers) - 10, p. 65.
 Tonderzwam (Fomes fomentarius (Linn.) Fr.) eens weldoenster der
 menschheid (Schweers) - 10, p. 32-35, 45-48.
 Tralie-stinkzwam (Clathrus ruber), Een nieuwe vondst van de (van Dijk) -
 13, p. 19-24.
 Tremella mycetophila Peck (de Veye) - 5, p. 72-73.
 Tricholoma, Een zeldzame en merkwaardige (Boetje-van Ruyven) -
 8, p. 55.
 Tricholoma inocybeoides Pearson (van der Laan) - 11, p. 20.
 Tricholoma personatum (Bakker) - 7, p. 32.

Tricholoma personatum var. anserina (Boting) - 3, p. 64.
 Tricholoma's, De zwart wordende (van der Laan) - 13, p.27.
 Tricholoma virgatum (Fries)Gillet (Akke de Vries) - 9, p. 24-25.
 Tricholoma virgatum bij Hilversum (Doets) - 9, p. 44-45.
 Truffel en haar cultuur, De (Ligtenberg) - 14, p. 1-4.
 Truffel-knotszwam en Hertentruffel (R.) - 1, p. 62-63.
 Truffels en maniet (Schraevesande) - 17, p. 38-39.
 Twenthe, Paddestoelen-rijkdom in ons (Meijer) - 12, p. 14-16.
 Typhula en Cnazonaria (Middelhoek) - 18, p. 13-15.
 Urgentieprogram, punt no 1 (Huysman) - 18, p. 16-17.
 Utrecht, Op naar - 1, p. 69.
 Varen(s)gezellen, Gezellige (Schweers) - 9, p. 48.
 Varia (Verslag excursie Buunderkamp; Meyendel onderzoek;
 Mycologische plaatwerken; Leiderskamp; van het redactie bureau
 (de Veye) - 6, p. 73-74.
 Variabiliteit bij plaatzwammen (referaal)(Uffellie) - 18, p. 11-12;
 Verbetering (Huysman) - 18, p. 24.
 Veendam, De gewone morielje in (de Veye) - 6, p. 18.
 Vergadering, Onze jaarlijksche algemeene (Schoevers) - 6, p. 75-76.
 Vergadering! , Op ter (Schoevers) - 8, p. 57-58.
 Vergiftiging, De Gooische paddestoelen- (Nannenga) - 9, p. 13.
 Vergiftiging door Amanita phalloides, De (Hueck) - 20, p. 58-65.
 Vergiftiging door de Voorjaars-Helvella (Bakker) - 3, p. 21-22.
 Vergiftiging door paddenstoelen (Meulenhoff) I - 1, p.2-3; II - 1, p. 30 33; III
 - 2, p. 54-56; IV - 2, p. 72-75; V - 3, p. 18-21; VI - 4, p. 8-11; VII - 4, p.
 23-24; VIII - 4, p. 58-60.
 Vergiftiging, Paddenstoelen- (Liernur) - 19, p. 64-65.
 Vergiftigingsgeval door Coprinus atramentarius, Een (Kalff) - 14, p. 48-49.
 Vergiftiging, Valsche waarborgen tegen (M.) - 2e aankondig.no, p.7-8.
 Verkleurzwammetje, Het (Clerx) - 6, p. 35.
 Verpa digitaliformis (Docters van Leeuwen) - 10, p. 49-50.
 Verpa digitaliformis (van der Lek) - naschrift (de V.) - 10, p. 50.
 Verzamelen en verzenden van paddenstoelen, Twee dozijn tips voor het
 (Swanenburg de Veye) - 18, p. 55-58.
 Vezelkop, Een nieuwe (Boting) - 2, p. 44.
 Vindplaatsen, Zonderlinge (van der Lek) - 9, p. 9.

Voedingswaarden van paddestoelen, Over de (Smit) - 13, p. 55-56.

Volvaria loveiana e.a., Het bosch van Oosterhout, de woonplaats van
(Schweers) - 13, p.41-44.

Vondst, die een groote bleek te zijn, Een kleine (Smits) - 10, p. 4-8.

Vondst, Een aardige (de Lint) - 7, p. 76.

Vondsten, Aardige (Middelhoek) - 16, p. 43-44.

Vondsten, Aardige (G.A. de Vries) - 10, p. 39-40.

Vondsten, Enige (Middelhoek) - 14, p. 8-9.

Vondsten, Enige (Neyzen en van Rijn) - 13, p. 14-15.

Vondsten in de pers - zie aparte rubriek.

Vondsten in Drente, Enige aardige (Reijnders) - 12, p. 7-11, 57-62.

Vondsten in een stadstuin (van Waveren) - 3, p. 11-13.

Vondsten in het najaar 1933, Merkwaardige (van der Lek) - 5, p.28-31.

Vondsten in het verkoalde veen (Schweers) - 12, p. 5-7.

Vondsten in 1935 en 1936, Vroege (Smits) - 7, p. 77.

Vondsten in 1941 (tot half September) I, Bijzondere (Reijnders) - 13,
p. 5- 10.

Vondsten in 1941 (II), Nog enkele aardige (Reijnders) - 13, p. 31-33.

Vondsten in 1942 (III), Interessante (Reijnders) - 14, p. 53-57.

Vondsten in 1943 (IV), Interessante, - onderschrift (Reijnders) - 14,
p. 63-66.

Vondsten op Voorne, Bijzondere (van Eyndhoven) - 19, p. 24.

Vondsten productief, Maakt Uw (Maas Geesteranus) - 15, p. 23-24.

Vondst in een kelder, Een interessante (de Veye) - 10, p. 63-64.

Vondst van een zeer bijzondere paddestoel, Een zeer toevallige (de Veye)
- 12, p. 12-13.

Voorjaar 1935 (Boting) - 6, p. 89-90.

Voorjaarspaddestoelen (Oort) - 9, p. 37-38.

Voorjaarsvondsten (Schweers) - 4, p. 13-14.

Voorjaarsvondsten (Smits) - 12, p. 75-76.

Voorne, Bijzondere vondsten op (van Eyndhoven) - 19, p. 24.

Vragenbus (de Veye) - 5, p. 15-17; 6, p. 17-18.

Vreemdeling, Van een (Klein) - 8, p. 16.

Vruchtvormen bij zwammen, Over enkele typen van (Lütjeharms) -
4, p. 6-8.

Waaiertje, Het (de Veye) - 6, p. 7-8.

Waarnemingen zie aparte rubriek.

Waarom sommige zwammen twee namen dragen (Schoevers) - 1, p. 38-39.
 Walcheren, Rijke dagen op (de Lint) - 8, p.28-29.
 Walcheren, Uit (Huysman) - 5, p. 31-33.
 Wat is dat nu weer? (Middelhoek) - 17, p. 61-63; 18, p. 11.
 Wat over 't hoofd wordt gezien (Bakker) - 4, p.62.
 Weidechampignon in westelijk Noord-Holland, Het voorkomen van de
 (van Herwijnen) - 11, p. 23-24.
 Westerdijk 25 jaar directrice phytopathologisch laboratorium Willie Com-
 melin Scholten, Ons medelid Prof. Dr. Joh.a. - 2, p.72.
 Wetenschappelijke namen der fungi, De (van Eyndhoven) - 14, p. 39-46.
 Wieringermeerpolder-paddenstoelen (Schweers) - 5, p. 72.
 Winter, In den - 1, p. 41-42.
 Winterswijkse flitsen (Middelhoek) - 11, p. 17-19.
 Wonderen de wereld al uit ?, Zijn de (Huysman) naschrift - 13, p. 54-55.
 Wortelschimmels (Klein) - 9, p. 74.
 Xylariaceeën (Lütjeharms) - 2e aankondig. no. , p. 11-12.
 Zadelhelvella, Nog een vindplaats van de (Maas Geesteranus en Perdeck)
 - 15, p. 5.
 Zaneveld geen conservator meer (Smit) - 14, p. 36.
 Zeldzaamheden op bladscheeden en traptreden (Schweers) - 10, p.51-52.
 "Zoekt en gij zult vinden" (Schweers) - 11, p. 40-42.
 Zuid-Limburg, Met de Nederl. Mycologische Vereeniging naar (van
 Eyndhoven) - 10, p. 27-30.
 Zwambeschrijving, Rationeele (Schweers) - 7, p. 45-46.
 Zwammen en strenge winters (Meijer) - 17, p. 42-44.
 Zwammenluister (de V.) - 5, p. 5-6.
 Zwammen op doode iepenboomen, Zeldzame (Stehouwer-Weyerse) - 9, p.
 41
 Zwammen, Vroege (van der Laan) - 17, p. 24-26.
 Zwamstoel, Geen padden-, maar een (Oort) - 6, p. 54.
 Zwarte vlekziekte op eschdoorn, De (van Eyndhoven) - 9, p. 72-73.

V. AUTEURS

- Andreas, Che.H., De Hygrophorusweide, een associatie - 20, p. 66-68;
Omphalia viridis Lange, Omphalia umbellifera (L.) Fr. var. Viridis
Fr. - 20, p. 72.
- Andriessse, K., Fungilore (Judasoor, Middel tegen koorts) - 2, p. 81; Het
kweken van paddestoelen - 3, p. 5-7; Phaenologische
waarnemingen- 4,p.14.
- Bakker, K., Vergiftiging door de Voorjaars-Helvella - 3, p. 21-22;
Tricholoma personatum, Mycena arcangeliana Bres, - 4, p. 46; Wat
over ' t hoofd wordt gezien - 4, p.62; Andermaal Coprinus comatus
- 5, p. 94; Tricholoma personatum - 7, p. 32; Daedalea en Trametes -
8, p. 41; Russula cyanoxantha ? - 9, p. 26; Oranje bekerzwammen -
10, p. 38-39; Waarnemingen - 14, p. 30-31; Foutief determineeren -
14, p. 59-60; Waarnemingen - 14, p. 61; 78; Kleuren - 16,
p. 8; Waarnemingen - 16, p. 9; 17, p. 26-27, 40, 46-47.
- Bels, P.J., Insecten en Schimmels (Medewerking gevraagd) - 11, p. 13-14;
Medewerking gevraagd voor het verzamelen van gegevens
omtrent de weidechampignon, Psalliota campestris - 16, p. 24-25.
- Bels-Koning, H.C., Iets over de mycologie in Scandinavië en Finland - 19,
p. 42-46.
- Bergh, J. G. van den, Geurende stinkzwammen en enkele andere
kleinigheden - 17, p. 39; "Les champignons prédateurs" (verslag
van lezing en film) - 17, p. 57-61; Droogte en toch ... ofwel; ende
desespereert niet ! - 18, p. 7-8; Ambrosia - 18, p. 31-33, 49-51; Mea
culpa - 19, p. 23; Waarnemingen - 19, p. 23.
- Boedijn, K.B., De studie der mycologie in de tropen - 7, p. 67-70; De
morieljes van Java - 11, p. 6-8; Rhizophidium acuforme is zijn naam!
- 17, p. 32.
- Boetje-van Ruyven, M.R.S., Boekbespreking: Verkade's Paddenstoelen-
album - 1, p. 42-44; Boekbespreking: Paddenstoelen-kalender - 1, p.
44-45; Oproep tot medewerking - 1, p. 52; Meyendelnieuws - 5, p.
87-88; Enkele weinig bekende of over het hoofd geziene
paddestoelen - 6, p. 68-69; Boekbespreking: M.Kruseman en
Martine Wittop Koning, Paddestoelen zoeken en eten - 7, p. 50-51;
Navraag omtrent afbeeldingen van Nederlandse paddestoelen - 8,
p. 43; Een zeldzame en merkwaardige Tricholoma - 8, p. 55;

- Inktzwammen met rode inkt - 10, p. 25; Negen gesluisde dames in één tuin - 11, p. 46-47; Waarnemingen - 14, p. 51; Na de brand - 19, p. 23-24.
- Bol, J., Hoofdstedelijke mycologie - 7, p. 59-61.
- Boting, H., Een nieuwe vezelkop - 2, p. 44; Jeugdlichaam van de Peperbus (*Myxostoma coliformis*) - 2, p. 44-45; Phaenologie en *Boletus rufus* - 2, p. 9; *Boletus aurantiacus* Roques ex Bulliard - 16, p. 16 - 17; De substraten van *Marasmius (Crinipellis) stipitarius* (Fr.) - 16, p. 34-35; Verslag van den penningmeester over de periode 1 Juli 1942 - 31 December 1945 - 16, p. 37-38; De hygrometrische aardster, *Astraeus hygrometricus* in het westen des lands - 17, p. 30 - 32; Verslag van de penningmeester over het jaar 1946 - 17, p. 48; Mededelingen van de Ned. Myc. Vereniging - 19, p.11; Bijzondere vondsten op Voorne - 19, p.24; Société Mycologique de France - 19, p. 60-61.
- Eyndhoven, G.L. van en Kleijn, H., Verslag van de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van den penningmeester over de vereenigingsjaren 1939/1940, 1940/1941 en 1941/1942, tevens verslag van den wnd. penningmeester over 1941/1942 - 14, p. 23-24.
- Fabius, G. C. A., Morieljes - 1e aankondig.no. p. 7-9; Kampernoeljes of Champignons - 2e aankondig.no. p. 5-7; Fungilore - 1, p. 10; Paddenstoelen-zoeken - 1, p. 18-19; Een purperroode boleet - 1, p. 25-26; Een slijmzwam-waarneming - 1, p.26-27; De schooljeugd en de padden stoelen - 1, p. 70; Bijdragen voor de phaenologie I - 2, p.30-31; Lichtend hout - 2, p. 37-39; Boekbespreking: Kallenbach M. und F., Wandtafelserie, Tafel 1, Grüne Knollenblätterpilz (*Amanita phalloides*) - 2, p. 40-42; Bijdragen voor de phaenologie II - 2, p. 45-46; Fungilore (Volksgeloof en Vogelnestzwammetjes) - 2, p. 80-81; Teekent Uwe waarnemingen op ! - 3, p. 22-28; Boekbespreking: Acta phaenologica - 3, p. 28-30; Wanneer begint de stinkzwam te stinken ? - 3, p. 32-33; Lichtend hout - 3, p. 40-42; Heeft de maan invloed op den groei van paddenstoelen ? - 3, p. 54-58; Bijdragen voor de phaenologie, Ulvenhoutsche bosch - 3, p. 74-75.
- Fabius, G.C.A. en Reijnders, A.F.M., Ons terrein - 1e aankondig.no.p.3-4.
- Formijne, P., Mykologie in het hooggebergte - 8, p. 24-27; Enige critische opmerkingen over de moderne mycologie I - 19, p. 54-57.
- Fransen, J.J. Door welke oorzaak ontstaan de coremia van *Ceratostomella*

- ulmi in de poppenwiegen van de iepenspintkevers ? - 7, p. 39-41.
- Fremery, H.N. de, Schimmels en asthma - 2, p. 58-59.
- Gremmen, J., *Coccomyces coronatus* (Schum.) De Not. - 17, p. 4-5; Een bijdrage tot de kennis der Nederlandse Ascomyceten - 17, p. 32-34; *Arachnopeziza aurelia* (Fr. ex Pers.) Fuck., een nieuwe Discomyceet voor ons land ? - 18, p. 4-6; Een bijdrage tot de mycoflora van Nederland, in het bijzonder van de fungi van brandnetels - 18, p. 27-31; *Dothidella ulmi* (Duv.) Winter en zijn levenswijze - 19, p. 8-10; De imperfecte vorm van *Desmazierella acicola* Lib. - 19, p. 32-35; De roestzwammenflora van de Zuid Veluwerand (I) - 19, p. 36-42; Het genus *Belonioscypha* sensu Rehm en de identiteit van *B. ciliatospora* (Fuck.) Rehm en *Helotium scutula* (Pers. ex Fr.) Karst. - 20, p. 17; De roestzwammen van het riet en iets over *Darluca* - 20, p. 49-52.
- Herwijnen, A. van, De reuzenbovist (*Bovista gigantea*) - 6, p. 29-30; Het voorkomen van de weidechampignon in westelijk Noord Holland - 11, p. 23 - 24; Mycologische lessen - 13, p. 56.
- Hueck, H.J., *Mycena osmundicola* Lange - 13, p. 49-50; Enige vondsten rond Rotterdam - 16, p. 17-18; Uit de buitenlandse literatuur: Gosta Lindeberg: Über die Physiologie Lignin-abbauender Boden-Hymenomyzeten; Oskar Modesz: Zur Kenntnis der Mykorrhizabildner von Kiefer und Fichte - 16, p.35; Heksenkringen en antibiotica - 17, p. 1-4; Het voorkomen van paddestoelen naar plaats en tijd - 17, p. 17-20; Rectificatie op Heksenkringen en antibiotica - 17, p. 44; Uit de buitenlandse literatuur: Karl Höfler, Pilzsoziologie; Karl Friedrich, Untersuchungen zur Ökologie der höheren Pilze - 17, p.53-54; De vergiftiging door *Amanita phalloides* - 20, p 58-65.
- Huijsman, H.S.C., Bekeerd - 1, p. 5-7; Boekbespreking: R.Heim, Le genre *Inocybe* - 4, p. 16; Uit Walcheren - 5, p 31-33; Nieuwe *Inocybe* soorten uit ons land (voorloopige mededeeling) - 7, p. 5-7; *Pleurotus porrigens* (Pers.)Fr. - 7, p. 48; Korte aantekeningen over paddestoelen I - 7, p. 72-74; II - 8, p. 11-15; III - 8, p. 50-55; Met de Fransche mycologen op stap - 9, p. 23-24; Aan het bestuur en aan alle leden onzer vereeniging - 9, p. 47-48; Over *Lepiota*'s en nog wat - 9, p. 50-52; Over het geslacht *Lepiota* en nog wat - 9, p. 65-68; De afgebroken excursie te Spa - 10, p.30; Over enkele *Russula*'s - 11, p.

- 35-40; II - 12, p. 53-57; *Lepiota brebissonii* Godey - 12, p. 67-73; Herinneringen aan enkele vacantiedagen te Denekamp doorgebracht - 13, p. 46-48; Zijn de wonderen de wereld al uit ? naschrift - 13, p. 54-55; Inleiding tot de morphologie en Physiologie der fungi - 15, p. 11-13, 17-19; 16, p. 2-4, 20-22; Urgentie-program, punt no 1 - 18, p. 16-17; Over Boleten - 18, p. 17-23, 37; Variabiliteit bij plaatzwammen (verbetering) - 18, p.24; Paul Konrad - 19, p. 1; Enkele retouches - 19, p. 2-7; Boekbespreking: Agaricaceae par P. Konrad et A. Maublanc - 20, p. 18-19; Boekbespreking: Les associations fongiques des Hauts-Marais Jurassiens et de quelques régions voisines par Jules Favre - 20, p. 19-20.
- Imler, L., Mijn genoeglijke *Russula* ... lijdensweg - 20, p. 22-32.
- Joman, A., Inleiding tot de kennis van paddenstoelen - 1, p. 3-5; Een nieuwe vindplaats van *Lepiota odorata* Cool - 5, p. 34; De Nederlandsche boleten (Proeve tot determineering der soorten, vrij bewerkt naar Kallenbach's Pilzbestimmungstabelle, Die Röhrlinge") - 6, p. 46-48, 62-63, 82-84.
- Jurriaanse, T., Moeilijkheden voor den paddenstoelenjager - 7, p. 46-48.
- Kalff, J., Een vergiftigingsgeval door *Coprinus atramentarius* - 14, p.48-49.
- Kam, N.G., Mycologische herinnering - 13, p. 35; Waarnemingen. Champignons in verdedigingswerken - 16, p. 24.
- Kits van Waveren, E., Vondsten in een stadstuin - 3, p. 11-13.
- Klein, R., Giftigheid *Claviceps purpurea sclerotiën* - 4, p.47; De kapjes-morielje - 5, p.90-91; Slakkenspijs - 6, p. 14; Parasieten - 6, p. 30- 31; Een kopschimmel + naschrift (de Veye) - 6, p. 69-70; Grijze klokjes - 7, p.12-13; De kegelmycena - 7, p.50; Van een vreemdeling - 8, p.16; Kopergroenzwam en brandnetel - 8, p. 40; *Isaria farinosa* - 9, p. 10; Struikelblokken - 9, p. 40; Kerstgaven - 9, p. 46; Wortelschimmels - 9, p. 74; *Craterellus sinuosus* e.a. - 10, p. 36; Eerstelingen -10, p.66; De gesluierte dame - 11, p. 8-9; Glinsteringen - 11, p. 25; Kleinigheden - 11, p. 64-65; Waarnemingen - 12, p. 47-48; Speurtochten 1948 - 19, p. 10-11; Misvormingen bij paddenstoelen - 20, p. 52-53.
- Kleijn, H., Oude studies over paddenstoelen - 1, p. 64-65; Amsterdam als paddenstoelen dorado - 8, p. 38-39; Bekerzwammetjes in den winter - 8, p. 55-56; Fungi in Amsterdam - 11, p. 24; *Pleurotus petaloides* (Bull.) Fr. - 12, p. 62-64; *Omphalia belliae* Johnst. - 13, p. 25-27;

- Sclerotinia kirschsteiniana* P.Hennings, nieuw voor ons land - 15, p. 9-10.
- Kleijn, H. en Agsteribbe, E., Een zeldzame *Helvella* weergevonden (*Helvella ephippium* Lév.) - 14, p. 73-74.
- Kregten, T. O. van, Waarnemingen - 14, p. 32-33; Eigenaardige vergroeiing van *Russula nigricans* Bull. - 15, p. 3-4; Waarnemingen - 15, p. 6, 15; *Daldinia concentrica* (Bolt. ex Fr.) Ces. et De Not. - 16, p. 4-6; Paddestoelen en knaagdieren? - 17, p. 9-10; Waarnemingen - 17, p.10.
- Kruyt, W., Oproep tot medewerking - 11, p. 66.
- Laan, H.J. van der, *Tricholoma inocybeoides* Pearson - 11, p. 20; De zwart wordende *Tricholoma*'s - 13, p. 27; Mycologische lessen - 13, p. 37; Waarnemingen - 14, p. 31-32, 52, 60-61; *Coprinus dilectus* Fr. - 14, p. 75; Een tropische *Lepiota*? -15, p.4-5; Vroege zwammen - 17, p.24-26.
- Lek, H.A.A. van der, Lichtende *Mycena*'s - 4, p. 42-44; Merkwaardige vondsten in het najaar 1933 - 5, p. 28-31; Enorme ontwikkeling van *Fuligo septica* - 5, p. 91; Boekbespreking: Friesia, Nordisk Mycologisk Tidsskrift - 6, p. 15-17; Boekbespreking: Takewo Hemmi, Studies on some wood-destroying Fungi attacking Conifers in Japan - 6, p.35-36; Boekbespreking: Friesia, Nordisk Mykologisk Tidsskrift Bd. 1, Heft 3, 1934 - 6, p. 36-37; Een slijmzwam binnenshuis - 6, p. 80-82; De geschiedenis van een heksenkring - 7, p.10-11; Boekbespreking: Atlas des Champignons de l'Europe, rédigé par Prof. Dr. Ch. Kavina et Dr A. Pilát, Fasc.1-5, 1934 - 7, p.15-17; Puzzletjes - 7, p. 42-44; *Schizophyllum commune* op walvisbeenderen - 7, p. 76; Eigenaardige vindplaatsen van de grote parasolzwam, *Lepiota procera* - 8, p. 15-16; Boekbespreking: Roelfsema, E.J.D., De champignoncultuur - 8, p. 31-32; Puzzletjes II - 8, p. 33-37; Zonderlinge vindplaatsen - 9, p. 9; Paas-paddestoelen (en een blunder van een ouden rat!) - 9, p. 56-59; Albino's onder de paddestoelen - 10, p. 12; Boekbespreking: W.W Ray. Some mushrooms, edible and poisonous - 10, p. 12-13; Albinisme bij paddestoelen - 10, p. 24-25; *Verpa digitaliformis* - naschrift (de Veye) - 10, p. 50; Ongewone ontwikkeling van *Hebeloma sacchariolens* -10, p. 61-63; *Pleurotus petaloides* (Bull.)Fr.,

- Naschrift - 12, p.21-23; De krulzoom zoekt het hoger op - 13, p.35-37; Zeldzame Stropharia's - 14, p. 30; In memoriam T.A.C.
- Schoevers - 16, p. 11-12; Verslag bibliotheek - 16, p. 38-39; Verslag van de bibliothecaris - 17, p. 49-50; Paddestoelen in de winter - 20, p. 33-34; *Lepiota brebissonii* Godey - 20, p. 45-46.
- Liernur, A.G.M., Paddenstoelenvergiftiging - 19, p. 64-65; Paddenstoelen in de winter op Terschelling - 20, p. 18.
- Ligtenberg, P.C., Bloedstelpende werking van *Rhacodium cellare* (Pers.) - 10, p. 65-66; De truffel en haar cultuur - 14, p. 1-4; Waarneming - 15, p. 23.
- Lint, S. de, Paddenstoelenkweekerij - 3, p. 76-77; Vroege vondsten en waarnemingen voorjaar 1934 - 5, p. 92-93; Indische Cordyceps-soorten - 7, p. 30; Een aardige vondst - 7, p. 76; Rijke dagen op Walcheren - 8, p. 28-29; Wenken voor paddenstoelen-eters - 11, p. 64; Abnormale *Panus stipticus* - 11, p. 65; Waarnemingen - 12, p. 49; 13, p. 56; 14, p. 33-34; 16, p. 48; Een woord van dank - 18, p. 76.
- Lint, S. de, Graaf, Dr H. de, Weverling, J.A., Kort verslag van de excursies van het district V, Zuid Holland, gehouden op 3 en 17 October 1943 - 14, p. 77-78; Verslag van de in 1948 door district V (Zuid Holland) gehouden excursie - 18, p. 75-76.
- Louwaars, W., Morieljesporen met het bloote oog zichtbaar - 1, p. 37-38; Paddenstoelen in Engeland - 2, p. 43-44.
- Lütjeharms, W.J., Een merkwaardige vondst - 1e aankondig.no, p. 15-16; Xylariaceeën 2e aankondig.no, p. 11-12; Oproep voor de medewerking ten dienste van de phaenologie - 1, p. 59-61; De muurzwam, *Plicaria muralis* (Sow.)Rehm - 2, p. 6-9; Groene schimmels - 2, p. 30; Onderschrift - 3, p.31-32; Over enkele typen van vruchtvormen bij zwammen - 4, P. 6-8; *Lysurus australiensis* weer gevonden! - 4, p. 16; Verslag van de vijftiende paddenstoelentoonstelling - 5, p. 44-51; Mycologische waarnemingen in Indië 9, p. 3-5; Inleiding tot de systematiek der Basidiomyceten I - 9, p. 5-9; II - 9, p. 19-23.
- Luyks, A.van, *Peniophora gigantea* (Fr.)Massee aan jonge Douglas-sparretjes - 8, p. 64-65.
- Maas Geesteranus, R.A., Mycologisch werk uit het buitenland - 15, p.22-23; Maakt Uw vondsten productief - 15, p. 23-24; Over de berkenboleet en zijn verwanten - 16, p.13-16, 27-30; Mycologische

- aanteekeningen - 17, p. 27; 2-4 - 17, p. 37-38; Mycologisch werk uit het buitenland II - 17, p. 66-68; Een paar fungi van de Kaloot - 20, p. 69-71.
- Maas Geesteranus, R.A. en Perdeck, A.C., Nog een vindplaats van de zadel-helvella - 15, p. 5; Voorlopig verslag van het Lycoperdon-onderzoek - 19, p. 18-22.
- Maas-van der Meulen, E., Waarnemingen - 14, p. 17-18.
- Meulemeester, P.J.A.J., Het determineeren van de hoogere fungi - 2^e aankondig.no, p.25; Bij het afscheid nemen van Dr J.S.Meulenhoff als voorzitter van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging - 5, p.3-5; In memoriam Dr J.S.Meulenhoff eereid van de Ned. Mycologische Vereeniging -7, p. 65-66; In memoriam C.Brakman - 10, p. 43; Frater Wilhadus - 18, p.39.
- Meulen, H. van der, Waarnemingen - 14, p. 31.
- Meulenhoff, J.S., Valsche waarborgen tegen vergiftiging - 2^e aankondig.no, p.7-8; Vergiftiging door paddenstoelen I - 1, p. 2-3; Groene schimmels - 1, p. 9; Boekbespreking; Dr E. Martin-Sans, l'Empoisonnement par les Champignons et particulièrement les intoxications dues aux Agaricacées du groupe des Clitocybe et du groupe des Cortinarius - 1, p. 14; Boekbespreking: Ullstein Sonderheft nr 12, Pilze und Pilzgerichte - 1, p. 23-24; Groene Schimmels - 1, p. 28; Vergiftiging door paddenstoelen II - 1, p. 30-33; Boekbespreking: Jacob E. Lange, Studies in the Agarics of Denmark, Part VII; Franz Kallenbach, Die Pilze Mitteleuropas, Bd.1, Die Röhrlinge, 8 Lief., P.Konrad et A.Maublanc, Icones selectae Fungorum fasc. IV - 1, p. 45-46; Groene schimmels - 1, p. 46; Oude studies over paddenstoelen - 1, p. 71; Giftige paddenstoelen - 1, p. 73,74; Boekbespreking: Pilzmerkblatt, Ausgabe 28 - 2, p. 40; Vergiftiging door paddenstoelen III - 2, p.54-56; Ons ereid Joh.Ruys 75 jaar - 2, p.71; Vergiftiging door paddenstoelen IV - 2, p. 72-75; Conserveeren van paddenstoelen - 2, p. 81-82; Vergiftiging door paddenstoelen V - 3, p.18-21; In memoriam Dr L.Vuyck - 3, p. 53-54; In memoriam G.C.A. Fabius - 3, p. 70-72; Ceratostomella ulmi de geslachtelijke vorm van Graphium ulmi Schwarz - 3, p.77-78; Vergiftiging door paddenstoelen VI - 4, p. 8-11; VII - 4, p. 23-24; Boekbespreking: Vuillemin, Les champignons parasites et les mycoses de l'homme - 4, p.28-29; Vergiftiging door paddenstoelen

VIII - 4, p.58-60; De Nederlandsche Mycologische Vereeniging bij haar vijf en twintigjarig bestaan - 4, p. 64-70; *Leptonia parasitica* Quélet (= *Claudopus subdepluens* Fitzpatrick) - 5, p. 84-86; Boekbespreking: Konrad, P. et Maublanc, A., *Icones selectae Fungorum*, fasc. VIII; Lange, Jacob E., *Studies in the Agarics of Denmark* no IX; Lange, Jacob E., *Flora Agaricina Danica*; Kavina, Prof. Dr. C. et Pilát, Dr. A., *Atlas des champignons de l'Europe*; Dujarric de la Rivière, R., *Le poison des Amanites mortelles* - 5, p. 88-90; *Nyctalis asterophora* - 6, p. 9-10; *Phallus hadriani* Fries - 7, p. 38-39, 53-55.

Meulenhoff, J.S. en Vuyck, L., *Ons tweede periodiek - le aankondig.no*, p.2.

Meijer, M.G.J., *Een paddestoel als veroorzaker van huiselijk leed* - 9, p. 25-26; *Rariteiten onder de paddestoelen* - 9, p. 75-76; *Hoe de paddestoelen ontstonden (Cechisch verhaaltje in en uit het Esperanto ver taald)* - 11 p. 27; *Paddestoelenrijkdom in ons Twenthe* - 12, p. 14-16; *Panaeolus separatus* (Linn.) Fr. (*Anellaria separata* (Linn.)Karst.) - 13, p. 13-14; *Lepiotas in bloemenkassen; een nieuwe soort?* - 14, p. 4-8; *Zwammen en strenge winters* - 17, p. 42-44; *Glinsteringen van een fungi-arm jaar* - 18, p. 52-53.

Middelhoek, A., *Het tekenen in inkt van paddestoelen* - 9, p. 42-44, 52-54, 70-72; 10, p.9-11, 21-23; *Proppenschietters onder de zwammen - naschrift* - 10, p.57-61; *Winterswijkse flitsen (Verslag excursie Ned. Myc. Ver. op 14 en 15 October 1939)* - 11, p. 17-19; *Een amoëbe met een staartje* - 11, p.59-61; *Om een diagnose* - 12, p. 27-30; *Een geheel gewoon paddestoeltje* - 12, p.44-45; *Dichomyces princeps* Thaxter - 12, p. 76-77; *Waarnemingen* - 13, p. 38; *Een nieuwe Laboulbeniaceae voor ons land* - 13, p. 52-53; *Enige vondsten* - 14, p. 8-9; *Kort verslag van de excursie te Lunteren op 26-27 October j.l.* - 14, p. 25-27; *Waarnemingen* - 14, p. 51; *Enige nieuwe Laboulbeniales voor ons land* - 14, p. 57-59, 71-72; *Boletus rufescens* (Secr.)Konrad - 15, p. 10-11; *Twee keverschimmels op een gastheer* - 16, p. 6-8; *Hydnotria tulasnei* - 16, p. 19; *Aardige vondsten* - 16, p. 43-44; *Rhizophidium pollinis ?* - 17, p. 20-22; *Wat is dat nu weer ?* - 17, p. 61-63; 18, p. 11; *Typhula en Cnazonaria* - 18, p. 13-15.

Müller, J.R., *Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1936-1937* - 9, p. 2; *Financieel overzicht vereenigingsjaar 1937- '38* -

- 10, p. 26; Financieel overzicht vereenigingsjaar 1938-'39 - 11, p. 28;
 Financieel overzicht vereenigingsjaar 1939-1940 - 12, p. 52.
- Nannenga, E.T., Paddenstoelen uit de omgeving van Nieuw Beerta - 6, p. 15; Nogmaals de Nieuw Beertasche paddenstoelen - naschrift (de V.) - 6, p. 31-32; Het paddenstoelenseizoen 1934 - 6, p. 71-72; Sclerotinia oxycocci Wor. - 7, p. 75; Strobilomyces strobilaceus (Scop.)Berck. - 8, p.27-28; De Gooische paddenstoelenvergiftiging 9, p. 13; Suggesties - 18, p. 72-73.
- Neijtzell de Wilde, E., Waarnemingen. Boleten en konijnen - 16, p. 24; Waarnemingen - 17, p. 46.
- Neyzen, Nora en Rijn, K. van, Enige vondsten - 13, p.14-15.
- Oets, J., Een nieuwe Ganoderma voor ons land ? - 16, p. 32.
- Oort, A.J.P., Nog eens de Zeeden-Mycena - 4, p.15; Ter inleiding - 5, p.1; Kort verslag van de jaarvergadering te Utrecht op 8 Juli 1933 - 5, p. 11-12; Jaarverslag van den secretaris over 1932-33 - 5, p. 12-13; Vroege vondsten en waarnemingen voorjaar 1934 -5, p. 93; Jaarverslag van den secretaris over het jaar 1933 - '34,- 6, p.3-5; Kort verslag van de algemeene ledenvergadering gehouden op Zaterdag 14 Juli 1934 te Utrecht - 6, p. 5-7; Onze excursie naar Baarn op 14 Oct. j.l. - 6, p. 24-25; Cantharellus olidus - Geurende cantharel - 6, p. 25-27; Geen padden- maar een zwamstoel - 6, p. 54; Jaarverslag van den secretaris - 7, p. 2-3; Verslag van de algemeene Ledenvergadering op Zaterdag 3 Juli te Utrecht gehouden - 7, p. 3-4; Tentoonstelling in het Koloniaal Instituut - 7, p. 13; Verslag van de excursie naar Ruurlo op 9 en 10 September j.l. - 7, p. 13-14; Verslag van den secretaris over het jaar 1935-1936 - 8, p.7-9; Verslag van de algemeene ledenvergadering - 8, p. 9; Boekbespreking: Paddenstoelenboek, deel 1, door Cath. Cool en Dr H.A.A. van der Lek, derde druk bewerkt door Dr.H.A.A. van der Lek - 8, p.42-43; Boekbespreking: Het raadsel der iepenziekte door Dr S.Broekhuizen, Libellenserie no 134 - 8, p. 43; Verslag van de zestiende paddestoelententoonstelling gehouden op 16, 17 en 18 October 1937 te Arnhem - 9, p. 15-17; Interessante vondsten in de Ardennen - 9, p.26-27; Voorjaarspaddestoelen - 9, p. 37-38; Jaarverslag van den secretaris over het jaar 1937-'38 -10, p. 1-2; Kort verslag van de jaarvergadering - 10, p. 3-4; Verzoek om medewerking voor het doen van waarnemingen betreffende het

voorkomen van *Stereum purpureum* en *Fomes pomaceus* - 10 , p. 52-53; Jaarverslag van den secretaris 1938-'39 - 11, p.2; Verslag van de jaarvergadering - 11, p. 2-4; Verzoek om medewerking - 14, p. 70; De Jubilee Meeting van de British Mycological Society London, 20-25 October 1946 - 17, p. 51-52; Dennenmoorder en Zwavelkopje als concurrenten - 20, p. 2-4.

- Ooststroom, S.J. van, Waarnemingen - 12, p. 49; *Geastrum nanum* Pers. met twee peristomen - 14, p. 49. *Pelagicus*, Mycophagie I-III - 14, p. 11-15; IV - 14, p. 34-35; V - 14, p. 49-51; VI - 14, p. 75-76; Recepten - 14, p. 76-77; Mycophagie VII - 15, p. 13-14; Recepten - 15, p. 14-15.
- Prell, Hans H., *Peronospora violacea* Berkeley (Nieuw voor ons land) - 14, p. 72-73.
- Reijnders, A.F.M., Boekbespreking: Dr. A.Schierbeek, De wonderwereld van het mikroskoop - 2e aankondig.no, p.8; Truffelknotszwam en Hertentruffel - 1, p. 62-63; Bespreking van mycologische verhandelingen: Dr J.G. Betrem, De Iepenziekte en de iepenspintkevers; A.J.P. Oort, The sexuality of *Coprinus fimetarius* - 1, p.63-64; Paddenstoelen en regenval - 2, 9-13, 22-26; Phaenologische waarnemingen - 2, p. 13-14; Boekbespreking: artikelen Dr Rant in *Tropische Natuur* - 3, p. 7-8; Boekbesprekingen: *Transactions British Mycological Society*, vol. 15, parts 1 en 2 - 3, p. 8-10; Onderschrift - 3, p. 40; G.C.A.Fabius als Fungus-redacteur - 3, p. 73-74; Waarnemingen betreffende de standplaats en groeiwijze der paddenstoelen - 3, p. 78-80; Boekbespreking: Kallenbach, *Merulius lacrymans* - 4, p. 28; *Lepiota Friesii* (Lasch) = *Lep. acutesquamosa* Weinm. - 4, p. 30-31; *Lentinus suavissimus* - 4, p. 31; Monstruositeiten bij paddenstoelen I - 4, p. 35-41; II - 4, p. 51-57; Propaganda nummer - 4, p. 63; *Mycena's* gevraagd - 5, p. 35; Boekbespreking: G.D. Swanenburg de Veye, Paddenstoelen in woord en beeld - 5, p. 37; Een merkwaardige monstruositeit - 6, p. 60-62; Het vruchtlichaam van *Fistulina hepatica*, de biefstukzwam - 8, p. 58-63; Het sterzwammetje (*Nyctalis asterophora* Fr.) en zijn verwant (*Nyctalis parasitica* Bull.) - 9, p. 33-37; Fungus 10 jaar ! - 10, p. 44-45; Twee, vermoedelijk voor Nederland nieuwe, plaatszwammen - 11, p. 4-5; *Dictyophora duplicata* (de gesluierde dame) waarschijnlijk reeds in 1917 in ons land gevonden en andere belangrijke Phalloideeën-vondsten hier te lande - 11, p. 29-35; Een

paar merkwaardige misvormingen bij plaatzwammen - 11, p. 45-46; De sluier van Dictyophora - 11, p. 49-53; Enige aardige vondsten in Drente - 12, p. 7- 11; 57-62; Bijzondere vondsten in 1941 (tot half September) I - 13, p. 5-10; Nog enkele aardige vondsten in 1941 (II) - 13, p. 31-33; Twee Inocybe's - 13, p.44-46; Interessante vondsten in 1942 (III) - 14, p. 53-57; Interessante vondsten in 1943 (IV) - 14, p. 63-66; Fungus 15 jaar ! - 15, p. 15-16; De session 1946 van de Société Mycologique de France - 17, p. 10-15; Verslag van de jubileum tentoonstelling der Ned. Mycol. Ver., ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan, gehouden op 16, 17 en 18 October in Artis te Amsterdam - 18, p.63-72; Een interessant artikel over de systematiek der hogere zwammen van H.Romagnesi - 19, p. 26-30; Verslag over Fungus 18e jaargang 1943 en 19e jaargang 1949, eerste gedeelte - 19, p. 51; Een interessant artikel over de systematiek der hogere zwammen van H Romagnesi II - 19, p. 57-60; In memoriam E.J. A.Boellaard - 19, p. 66; Een interessant artikel over de systematiek der hogere zwammen van H.Romagnesi III - 20, p. 40-45.

Scheevers, T.A.C., Waarom sommige zwammen twee namen dragen - 1, p. 38-39; De beteekenis der phaenologie voor de bestrijding van plantenziekten en schadelijke dieren - 2, p. 3-5; Verzoek aan onze myxomyceten-verzamelaars - 3, p. 13; Onze 15de paddenstoelen tentoonstelling te Haarlem op 7, 8 en 9 October - 5, p. 6-10; Onze jubileumtentoonstelling. Terugblik - 5, p. 20-26; Onze jaarlijksche algemeene vergadering - 6, p. 75-76; Op ter vergadering ! - 8, p. 57-58; De invloed van de biefstukzwam op het hout van eiken - 10, p. 19-21; Mijn grootste champignon - 11, p. 9 -11; G.D. Swanenburg de Veye afgetreden als redacteur van Fungus - 15, p. 1-2.

Schravesande, J.A., Herfstkleuren - 16, p. 47-48; Truffels en manniet - 17, p. 38-39; Blauwzuur in paddenstoelen - 18, p. 6; Paddenstoelen en antibiotica - 18, p. 53-54;

Schure, P.J.S., Over Reticularia lycoperdon Bull. - 5, p. 14-15.

Schweers, A.C.S., Een nieuwe mycologische film - 2e aankondig.no, p. 1-2; Komt naar Delden ! - 1, p. 17-18; Glinsteringen des jaars - 2, p. 64; 3, p. 75-76; Voorjaarsvondsten - 4, p. 13-14; Milieu-verruiming - 4, p. 76-77; Geopyxis ammophila (Dur. et Lév.)Sacc. (= Peziza sabulicola Dunal) - 5, p.64-65; Wieringermeerpolder paddenstoelen - 5, p. 72;

Spoorbedrijf en Sporenbedrijf - 6, p. 41-44; Nullenschemering en vruchtbaarheid - 6, p. 52-53; Nogmaals de "groene" berkenboleet - 6, p. 70-71; Een merkwaardige groeiplaats - 6, p. 72; *Omphalia typhae* nov. spec. (Sect. *Mycenarae* Fr.) - 6, p. 79-80; Met de Fransche Mycologen op stap - 6, p. 86-88; Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1933-1934 - 7, p. 4-5; Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1934-1935 - 7, p. 5; Rationeele zwambeschrijving - 7, p. 45-46; 'n Tocht naar Texel (- naschrift) - 7, p. 49-50; Glinsteringen des jaars 1935 - 7, p.55-56; Sporenval - 7, p. 71-72; Nieuwe voedsterzwam voor *Badhamia utricuiaris* (Berk.) - 7, p. 77; Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1935-1936 - 8, p. 9-10 ; Glinsteringen des jaars - 8, p. 37-38; Over Antony Keizer, den paddenstoelenschilder - 8, p. 41-42; Een nieuwe *Pleurotus* puzzle - 8, p. 63-64; Een paar nieuwe *Asco*'s - 8, p. 66-67; *Ombrophila clavus* (Alb. en Schw.)Fr. - 9, p. 9-10; Glinsteringen des jaars 1937 - 9, p. 39-40; Gezellige varen(s)gezellen - 9, p. 48; *Pleurotus serotinus* (Schrud.) - 9, p. 59-60; De tonderzwam (*Fomes fomentarius* (Linn.)Fr.) eens weldoenster der menschheid - 10, p. 32-35, 45-48; Glinsteringen des jaars 1938 - 10, p. 37; Zeldzaamheden op bladscheeden en traptreden - naschrift - 10, p.51-52; *Naucoria fulgens* J.Favre et R.Maire n.s (subgenus *Alnicola* Kühner) - 10, p.63; Nog iets over de tonderzwam als recordbreekster - 10, p. 65; "Zoekt en gij zult vinden" - 11, p. 40-42; Glinsteringen des jaars 1939 - 11, p. 43; Vondsten in het verkoolde veen - 12, p. 57; Kleine gele en roode *Disco*'s der Nederlandsche flora - 12, p. 24-25, 42; Waarnemingen - 12, p. 30-31; Lichtgevende larven in boomzwammen - 12, p. 32; Kleine bruine of zwarte *Disco*'s der Nederlandsche flora - 12, p.42-43; Kleine bleeke *Disco*'s der Nederlandsche flora - 12, p. 43; Waarnemingen - 12, p.48-49; *Desmazierella acicola* Lib. - 12, p. 73-75; Waarnemingen - 12, p. 79; *Helvella queletii* Bres. - 13 p. 24-25; Josef Hanel (gestorven den 12en November 1940 te Hannersdorf in de Oost-Sudeten) - 13, p. 28; Waarnemingen - 13, p. 28-30; Glinsteringen der jaren 1940 en 1941 - 13, p. 34; Waarnemingen - 13, p. 37-38; Het bosch van Oosterhout, de woonplaats van *Volvaria loveiana* e.a. - 13, p. 41-44; Mycologische dissertatie - 13, p. 55; Over een mycophagische

eigenschap van *Claudopus byssisedus* (Fr. ex Pers.) Gillet - 14, p. 10-11; Waarnemingen - 14, p. 52; Glinsteringen des jaars 1942 - 14, p. 66; *Inocybe fulvida* Bres. - 15, p. 2-3; Glinsteringen des jaars 1943 - 15, p. 11; Oproep - 15, p. 24; *Omphalia sphagnicola* (Berk.) Karst. - 16, p. 9; Glinsteringen des jaars 1944 - 16, p. 31; Glinsteringen des jaars 1945 - 17 p. 8; Een nieuwe exotische *Discomyceet*, parasiterende op het Steenlevermos - 17, p. 36-37; Door het rietland - 18, p. 1-4; Glinsteringen der jaren 1946 en 1947 - 18, p. 34; Waarnemingen - 18, p. 35; Artikelbespreking *T.Petch*, *Cordyceps militaris* and *Isaria farinosa* - 18, p. 44; Roodsporigen uit het jaar 1943 - 18, p. 51-52; *Entoloma sphagneti* R.Naveau n.s. 1923 - 19, p. 10; De *Hygrophorus*weide, een associatie - 19 p. 17-18; Bijzondere mycologische vondsten van de Plasmolen en Gennep in het tijdvak 1937-1949 - 20, p. 46-49; *Gloeoglossum affine* Durand een nieuwe aardtong voor Europa - 20, p. 68-69.

Siteur, G., Excursies van de Nederl. Mycologische Vereniging op 12 en 13 October in de omgeving van Eindhoven - 17, p. 7-9.

Smit, J.P.S., De zuidelijke wandelweg bij Amsterdam - 8, p. 67; Paddestoelen in een cactuskas - 11, p. 24; Jaarverslag 1939-'40 - 12, p. 1; Verslag van de ledenvergadering op 21 Sept. 1940 in het hotel Zeelandia te Apeldoorn 12, p. 12; Waarnemingen - 12, p. 31; Verslag van de algemene ledenvergadering op 27 Sept. 1941 te 20 uur in hotel Zeiler te Baarn - 13, p. 17-18; Verslag van een leden excursie op Zondag 19 Oct. 1941 tussen Hilversum en Baarn - 13, p. 18-19; Verslag van de excursies op 25 en 26 Oct. 1941 in de omgeving van Kievitsdel - 13, p. 19; Over de voedingswaarden van paddestoelen - 13, p. 55-56; Jaarverslag 1941-1942 - 14, p. 21-22; Verslag van de algemene ledenvergadering op Zaterdag 26 Sept. 1942, 20 uur, in hotel De Veluwe te Lunteren - 14, p. 22-23; Plan voor districtsgewijze excursies op kleinere schaal - 14, p. 36; Dr Zaneveld geen conservator meer - 14, p. 36; Jaarverslag 1 Juli 1942 - 1 Januari 1946 - 16, p. 36-37; Programma der excursies Ned. Myc. Ver. te Eindhoven op 12 en 13 October 1946 - 16, p. 40-41; Algemene ledenvergadering 1946 - 16, p. 48-50; Waarnemingen - 17, p. 10; Hulp gevraagd - 17, p. 28; Algemene ledenvergadering - 17, p.29; Jaarverslag 1946 - 17, p. 47; Weekendexcursie in de omgeving van Oisterwijk op 25 en 26 October 1947, Concept-programma - 17,

p. 54; Verslag van de ledenvergadering op Zaterdag 13 December 1947 te Utrecht - 18, p. 9-10; Nederlandse Mycologische Vereniging algemene ledenvergadering (agenda) - 18, p. 25; 40-Jarig bestaan van de Nederlandse Mycologische Vereniging - 18, p. 26; Verslag van de algemene ledenvergadering op Zaterdag 24 Juli 1948 om 11 uur in het Pharm. Lab. te Utrecht - 18, p. 40; Jaarverslag 1947 - 18, p. 40-41; Algemene ledenvergadering (Agenda) - 19, p. 13; Jaarverslag 1948 - 19, p. 49-50; Verslag van de algemene ledenvergadering op Zaterdag 16 Juli in het Pharm. Lab. te Utrecht 19, p. 50; Jaarverslag 1949 - 20, p. 54.

Smith, W., Waarnemingen - 12, p. 49.

Smits, Jr., W.F., Na de Gorsselsche excursie (4-5 Oct. 1935) - 7, p. 77; Vroege vondsten in 1935 en 1936 - 7, p. 77; Verslag van de algemeene ledenexcursie op Zaterdag 24 en Zondag 25 October 1936 in de omgeving van Wageningen - 8, p. 17-19; Een kleine vondst die een groote bleek te zijn - 10, p. 4-8; Algemeene ledenexcursie der N.M.V. te Gorssel op 12 en 13 October 1940 - 12, p. 19-21; *Thelephora sowerbii* B. et Br. en *Polystictus cinnamomeus* (Jacq. ex Pers.) Sacc. - 12, p. 23, 26-27; Voorjaarsvondsten - 12, p. 75-76.

Spiereburg, D., Een "versteende" paddenstoel - 5, p. 80-84.

Stehouwer-Weyerse, Chr., Zeldzame zwammen op doode iepenboomen - 9, p. 41.

Stork, F., Paddenstoelen in Britsch Indië - 5, p. 92.

Swanenburg de Veye, G.D., Paddenstoelennieuws uit Groningen I.

Mycologische vondsten op een fabrieksterrein - 2, p. 33-37; II - 2, p. 50-53; Mycologische vondsten in de Fransche Alpen - 4, p. 3-6; De ruwsporige *Psilocybe foenicis* (Pers.) - 4, p. 15-16; Mycologische vondsten in de Fransche Alpen II - 4, p. 19-23; Verslag van de excursie der Ned. Mycol. Vereeniging te Ruurlo op 1, 2 en 3 October 1932 - 4, p. 25-27; *Psalliota echinata* (Roth) - 4, p. 30; *Leptonia sarcita* (Fr.) - 4, p. 30; Was het paddenstoelen najaar '32 overal in ons land en in alle opzichten gunstig? - 4, p. 45; Het paddenstoelenjaar 1932 - 4, p. 60; Paddenstoelen zoeken - 4, p. 71-76; Zwammenluister - 5, p. 5-6; Belangrijk bericht - 5, p. 13-14; Vragenbus - 5, p. 15-17; Een en ander over de gepeperde melkzwam - 5, p. 17; Dankbetuiging - 5, p. 26-27; Ons tweede

eerelid - 5, p. 27; Belangrijk bericht - 5, p. 27-28; Een mycologische
 rareiteit - 5, p. 43; *Pluteus pellitus* Pers. - 5, p. 55; *Naucoria*
carpophila Fr., een nieuwe zwam voor ons land - 5, p. 57; Een
 tweetal aardige *Psathyrella*'s - 5, p.57-59; Eikhaas en Reuzenzwam -
 5, p. 70-71; *Tremella mycetophila* Peck. - 5, p. 72-73; Het
 Dennenschelpje - 5, p. 73-74; Komt allen 14 Juli a.s. op de algemeene
 vergadering in Utrecht - 5, p.79-80; De "onbekende" Reuzenzwam
 in het Amsterdamsche turngebouw - 5, p. 94-95; Het waaiertje -
 6,p.7-8; Het drama van de aardappelbovist - 6, p. 10-11; Vragenbus -
 6, p. 17- 18; De gewone morielje in Veendam - 6, p. 18; Diversen -
 6, p. 19; De grote bruine bekerzwam - 6, p. 21; Verslag van de
 algemene ledenexcursies op Zaterdag 6 en Zondag 7 Oct. '34 in de
 omgeving van Nijmegen en Kleef - 6, p. 22-24; De levertraanzwam,
Naucoria cucumis (Pers.) Fr. - 6, p. 27-29; Enkele voor ons land
 nieuwe *Cortinarius*-soorten - 6, p. 48-52; Het paddenstoelenseizoen
 1934 - 6,p. 56; Allerhande - 6, p. 57-58; Als de natuur ornamenteert
 - 6, p. 59; Nog een paar nieuwe paddenstoelen voor onze flora -
 6, p. 64-68; De kinderkamer van de familie *Coprinus* geb.
atramentarius - 6, p. 72-73; *Varia* - 6, p. 73-74; In memoriam A.
 Joman - 6, p. 75; Aardtong en truffelknotszwam - 6, p. 84-85;
 Koeienboleet en rose spijkerzwam - 6, p. 88-89; Diversen - 6, p. 90;
 In memoriam B.E.Bouwman - 7, p. 1; De algemeene ledenexcursie
 te Gorssel op 5 en 6 October a.s. - 7, p. 1-2; Wat ge te Gorssel als
 mycologische delicatessen opgediend krijgt! - 7, p. 8-10; *Rozites*
caperata (Fries ex Persoon) Karsten - 7, p. 11-12; Diversen 7, p. 18;
 Dr Jac.P.Thijssse 70 jaar - 7, p. 18; In memoriam H.Botting - 7, p.21;
 De algemeene ledenexcursie der N.M.V. te Gorssel op 5, 6 en 7
 October j.l. - 7, p. 21-25; De reuzenknotszwam (*Clavaria pistillaris*
 (L.)Fr.) na 36 jaar opnieuw in ons land gevonden - 7, p. 30-32;
 Boekbespreking: Cool, Cath. en Lek, Dr H.A.A. van der,
 Paddenstoelenboek, deel II, 3e druk; Hana, K. , Onze
 paddenstoelen, Libellenserie no 84; Lange, Jacob E., *Flora Agaricina*
Danica, vol. 1-7, p. 32-33; Een abnormaal gevormde oesterzwam - 7,
 p. 37; Over het aanleggen van een gedroogde paddenstoelen-
 herbarium - 7, p. 58-59; Boekbespreking: De "Revue de Mycologie",
 een nieuw Frans tijdschrift - 7, p. 61-64; Boekbespreking: De "Revue
 de Mycologie" (vervolg) - 7, p. 78-79; Kort verslag van de op 26 en

27 Sept. j.l. te Heeze gehouden algemeene ledenexcursie der N.M.V. - 8, p. 19-20; De blaasvormige bekerzwam - 8, p. 45; Bezoekt vooral onze a.s. paddestoelen-tentoonstelling te Arnhem - 9, p. 1; Een nieuwe, rijk voorziene vindplaats van de Hoorn-van-overvloed - 9, p. 11-12; Meulemeester tot erelid der N.M.V. benoemd - 9, p. 13-14; Een vijftal lezingen over paddestoelen voor de Volksuniversiteit te A'dam - 9, p. 14; Nogmaals het Hendricus Bottingfonds - 9, p. 14; Met de Mycologische op excursie in de omstreken van Enschede - 9, p. 17- 19; Een actieve propaganda - commissie - 9, p 28; Telegrafisch verslag van de propaganda-excursie - 9, p. 28-29; Intermezzo - 9, p.29; Dr W. J.Lütjeharms tot hoogleeraar benoemd - 9, p. 29-30; Veenkoloniale morieljes - 9, p. 49-50; Het brandnetelklokje - 9, p. 54-56; Een mycologische rariteit uit de medische wereld - 10, p. 11; Inktzammen zonder inkt - 10, p. 12; Een kleine aanvulling - 10, p. 25-26; Enkele brandplekervaringen - 10, p. 39; Nog een verzoek om medewerking - 10, p. 53; Een interessante vondst in een kelder - 10, p. 63-64; Secretariaatswisseling ! - 11, p. 14; *Omphalia philonotis* (Lasch)Quél., een nieuwe aanwinst voor onze flora - 11, p 21-22; Van een eikhaas, die een beukhaas bleek te zijn - 11, p. 27; Attentie voor het Botting-fonds! - 11, p. 48; *Clitocybe olearia* (De Candolle)R. Maire (syn. *Pleurotus olearius* (D.C.) Fr.), een nieuwe aanwinst voor onze fungiflora - 11, p. 53-58; Met de N.M.V. op excursie in de omstreken van Apeldoorn 21-22 Sept. 1940 - 12, p. 2-5; Een zéér toevallige vondst van een zéér bijzondere paddestoel - 12, p.12-13; De Hoorn van overvloed bij Gieten - 12, p.17; Waarnemingen - 12, p. 31; Huidverschijnselen veroorzaakt door eetbare paddestoelen - 13, p. 28; Een laatste woord van den redacteur - 14, p. 78; Dr van der Lek erelid van onze vereniging - 17, p. 41-42; Leden helpt allen mee, onze jubileums-paddenstoelen-tentoonstelling te doen slagen - 18, p. 42-44; Twee dozijn tips voor het verzamelen en verzenden van paddenstoelen - 18, p. 55-58; Dr A.J.P. Oort tot hoogleeraar benoemd - 19, p. 66; In memoriam P.J.A.J.Meulemeester - 20, p.38-39.

Uffellie, O.F., Een conserveermiddel voor paddestoelen - 9, p. 45; *Poronia punctata* (L.) - 9, p. 68-69; Variabiliteit bij plaatszammen (referaat) - 18, p. 11-12; Verslag van een lezing voor de flora-commissie op Zaterdag 10 April 1948 in het Pharmaceutisch Laboratorium te

- Utrecht door Dr A.F.M. Reijnders over "Coprinus" - 18, p. 35-37;
 Jaarverslag bibliothecaris 1948-1949 - 19, p. 50-51; Jaarverslag
 Commissie voor de Mededelingen - 19, p. 51.
- Valckenier Suringar, J., Over eetbaarheid van zwammen - 4, p. 11-12.
- Ver Sacrum, Loflied op den morielje - 16, p. 41-42.
- Verschuieren, C.Ph., Enkele merkwaardige vondsten uit de Betuwe - 6, p.8-9.
- Vloten, H. van, Waarnemingen over *Fomes annosus* Fr. - 7, p.25-27;
 Onderzoekingen over *Armillaria mellea* (Vahl)Quél, - 8, p. 20-23.
- Vries, A. de, Nomenclatuur - 3, p. 83; Amsterdam en de mycologie - 5, p. 51-54; De paddenstoelen inventaris van Amsterdam - 5, p. 69-70;
 Twee merkwaardige droogtevormen van *Collybia maculata* - 6, p. 33;
 De paddenstoelenvangst na een droge zomer - 6, p. 33-34;
 Kleurvariaties bij *Boletus scaber* en *rufus* - 6, p. 55; Verslag der
 propaganda-excursie op Zondag 4 Oct. '36 op het terrein van
 Meeren Bosch - 8, p. 29-30; Verslag van de propaganda-excursie op
 1 Nov. 1936 te Lage Vuursche - 8, p. 30-31; Paarden, paddenstoelen
 en P.K. - 8, p. 39-40; *Tricholoma virgatum* (Fries) Gillet - 9, p.24-25;
 Een mooie parasolzwam uit de duinen - 10, p.35-36; Onze
 propaganda excursies 1938 - 10, p. 40-41.
- Vries, G.A. de, Aardige vondsten - 10, p. 39-40; *Hymenogaster tener*
 (Berk.), een nieuw geslacht en een nieuwe soort voor Nederland -
 11, p. 20-21; *Amanitopsis strangulata* Fr. en nog iets - 13, p. 10-12;
Lentinus adhaerens Fries (1836) ex Albertini et Schweinitz, een
 nieuwe aanwinst voor onze fungi-flora - 14, p. 46-47; Kort verslag
 der excursies van district III - 14, p. 77; Twee melkzwammen - 15, p.
 56; Mycologische waarnemingen uit de jaren 1942-1947 - 18, p. 46-
 47; Verslag van de excursies gehouden door district III - 19, p. 67.
- Walrecht, B.J.J.R., Paddenstoelenvondsten in de omgeving van Chaam
 (N.B.) - 6 p. 34-35.
- Welsmann, L., Über Giftpilze und Pilzvergiftungen - 6, p. 77-78.
- Westerdijk, Joha, Mycologie en industrie - 15, p. 25-30.
- Westmijze, W.L., Het congres van de Franse mycologen - 18, p. 73-75;
Flammula henningsii Bres. - 19, p. 30-32.
- Weverling, J.A., De oliebolzwam (*Rhizina inflata* Schiff.) - 12, p. 46-47;
 Waarnemingen - 12, p. 66, 79-80; 13, p 56-57; 17, p. 65; Verslag van
 de in 1947 door district V (Zuid-Holland) gehouden excursies - 18,

- p. 8-9.
- Wiersma, J.H., Waarnemingen - 18, p. 34-35.
- Wildervanck, L.S., *Cordyceps capitata* en *C. ophioglossoides* - 16, p. 46; Waarnemingen - 17, p. 65; 18, p. 34; Enkele zeldzame afwijkingen bij paddestoelen - 19, p. 13-17; *Coprinus atramentarius* en alcohol - 20, p. 4-6.
- Wilhadus, Frater, Generaal Fabius - 3, p. 72-73; "Education mycologique" - 5, p. 34-35; *Merulius lacrimans* op steenkool - 11, p. 11-12; Uit mijn notitieboekje 1939 -11, p. 61-63.
- Wilhadus, Frater en Fabius, G.C.A., Paddenstoelen in ultraviolet licht - 2, p. 26-28.
- Woudt, B.D.van 't, Zwammen-excursie op Texel - 6, p. 54-55.
- Wouw, A.P. van de, De kleine stinkzwam - 3, p. 32.
- Wijk, L.J. van, Uit de myco-onderwereld - 16, p. 22-23; Waarnemingen - 17, p. 65.
- Zaneveld, J.S., *Laboulbenia flagellata* Peyritsch, een merkwaardige en voor Nederland nieuwe fungus - 9, p. 61-65; Komt *Dictyophora duplicata* (Bosc) Ed. Fischer in Nederland voor ? - 10, p. 48-49; Het vruchtlichaam van *Polyporus tuberaster* Jacq. ex Fr. in Nederland gevonden - 13, p. 1-5; G.D.Swanenburg de Veye afgetreden als redacteur van *Fungus* - 15, p. 1; Uit het nieuwe redactie bureau - 15, p.8; Boekbespreking: Jean Anker en Svend Dahl, *Leven en Wetenschap, 3000 jaren biologie* - 16, p.10; Verslag van den redacteur van *Fungus* - 16, p. 39; Verslag "Fungus" - 17, p. 50-51; Laatste bericht uit het redactie bureau - 18, p.38; Verslag "Fungus" - 18, p.41-42.
- Zinderen Bakker, E. M. van, Enkele merkwaardige parasieten van paddestoelen - 12, p. 39-41.
- Zijm, A.C., Van Oudemans tot Donk - 10, p. 15-18.

VI. BESTUURSMEEDEDELINGEN

- Bibliothecaris 1948-1949, Jaarverslag (Uffellie) - 19, p. 50-51.
- Bibliothecaris, Verslag van de (Van der Lek) - 17, P. 49-50.
- Bibliotheek, Catalogus van de - 16, p. 25.
- Bibliotheek, Mededeling over de - 19, p. 11.
- Bibliotheek, Verslag (Van der Lek) - 16, p. 38-39.
- Commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van den penningmeester over de vereenigingsjaren 1939/40, 1940/41 en 1941/42, tevens verslag van den wnd. Penningmeester over 1941/42, Verslag van de (Van Eyndhoven Kleijn) - 14, p. 23-24.
- Commissie voor de Mededelingen, Jaarverslag (Uffellie) - 19, p. 51.
- Contributies, Voorstel van het bestuur inzake wijziging der - 17, p. 55-56.
- Financieel overzicht vereenigingsjaar 1937-'38 (Müller) - 10, p. 26.
- Financieel overzicht vereenigingsjaar 1938-'39 (Müller) - 11, p. 28.
- Financieel overzicht vereenigingsjaar 1939-'40 (Müller) - 12, p. 52.
- Floracommissie - 19, p. 12.
- Fungus 18^e Jrg. 1948 en 19^e Jrg. 1949 eerste gedeelte, Verslag over (Reijnders) - 19, p. 51.
- Fungus 19^e - 20^e jaargang, Verslag over (Daams) - 20, p. 55-56.
- "Fungus", Verslag (Zaneveld) - 17, p. 50-51; 18, p. 41-42.
- Fungus, Verslag van den redacteur van (Zaneveld) - 16, p. 39.
- Jaarvergadering, Kort verslag van de (Oort) - 10, p. 3-4.
- Jaarvergadering te Utrecht op 8 Juli 1933, Kort verslag van de - 5, p. 11-12.
- Jaarvergadering, Verslag van de (Oort) - 11, p. 2-4.
- Jaarverslag 1939-'40 (Smit) - 12, p. 1.
- Jaarverslag 1940-'41 (Smit) - 13, p. 1.
- Jaarverslag 1941-1942 (Smit) - 14, p. 21-22.
- Jaarverslag 1 Juli 1942 - 1 Januari 1946 (Smit) - 16, p. 36-37.
- Jaarverslag 1946 (Smit) - 17, p. 47.
- Jaarverslag 1947 (Smit) - 18, p. 40-41.
- Jaarverslag 1948 (Smit) - 19, p. 49-50.
- Jaarverslag 1949 (Smit) - 20, p. 54.
- Jaarverslag van den secretaris over 1932-33 (Oort) - 5, p. 12-13.
- Jaarverslag van den secretaris over 1933-34 (Oort) - 6, p. 3-5.
- Jaarverslag van den secretaris (1934-35) (Oort) - 7, p. 2-3.
- Jaarverslag van den secretaris over 1935-1936 (Oort) - 8, p. 7-9.

Jaarverslag van den secretaris over het jaar 1936-1937 - 9, p. 1-2.
 Jaarverslag van den secretaris over het jaar 1937-'38 (Oort) - 10, p. 1-2.
 Jaarverslag van den secretaris 1938-39 (Oort) - 11, p. 2.
 Ledenvergadering, Agenda - 5, p. 86-87, 6, p. 76-77.
 Ledenvergadering, Agenda algemeene - 8, p. 58.
 Ledenvergadering, Agenda algemeene (Smit) - 17, p.29; 18, p. 25; 19, p. 13; 20, p. 35.
 Ledenvergadering in Juli, De algemeene - 2, p. 1-3.
 Ledenvergadering op 9 Juli te Utrecht, Kort verslag over de algemeene - 4, p. 17-18.
 Ledenvergadering op 14 Juli 1934 te Utrecht, Kort verslag van de algemeene - 6, p. 5-7.
 Ledenvergadering op 3 Juli (1935) te Utrecht, Verslag van de algemeene (Oort) - 7, p. 3-4.
 Ledenvergadering op 21 Sept. 1940 te Apeldoorn, Verslag van de (Smit) - 12, p. 1-2.
 Ledenvergadering op 27 Sept. 1941 te Baarn, Verslag van de algemeene (Smit) - 13, p. 17-18.
 Ledenvergadering op 26 Sept. 1942 te Lunteren, Verslag van de algemene (Smit) - 14, p. 22-23.
 Ledenvergadering 1946, Algemene (Smit) - 16, p. 48-50.
 Ledenvergadering op 13 December 1947 te Utrecht, Verslag van de (Smit) - 18, p. 9-10.
 Ledenvergadering op 24 Juli 1948 te Utrecht, Verslag van de algemene (Smit) - 18, p. 40.
 Ledenvergadering op 16 Juli te Utrecht, Verslag van de algemene (Smit) - 19, p. 50.
 Ledenvergadering, Verslag van de algemeene (Oort) - 8, p. 9.
 Mededelingen van het Bestuur - 1e aankondig.no, p. 14-15; 2e aankondig.no, 12-14; 1, p 14-16, 28, 40, 58, 68, 75-76; 2, p. 14-15, 31, 46-47, 67-68; 82-84; 3, p. 13-15, 34-36, 50-51, 67-68; 4, p. 18, 34, 78; 5, p. 18, 74-75; 7, p. 36; 8, P. 1-2, 10, 32, 44, 56; 9, p. 31-32; 11, p. 15; 12, p. 51; 13, p.15-16, 38-39, 57-58;14, p. 18-19, 37-38, 62, 63, 70; 15, p. 24, 32; 16, p. 25-26, 40, 50, 51; 17, p. 16, 57; 18, p. 10, 41; 19, p. 11, 52, 67; 20, p. 53-54, 72.

Ons tweede periodiek (Meulenhoff en Vuyck) - le aankondig.no, p. 2.
Programma der excursies Ned. Myc. Ver. te Eindhoven op 12 en 13
October 1946 (Smit) - 16, p. 40-41.
Programma excursie Ned. Mycol. Ver. 14-16 Oct. 1939 te Winterswijk - 11,
p. 1.
Programma (concept) weekend excursie omgeving Oisterwijk op 25-26
Oct. 1947 (Smit) - 17, p. 54.
Rede van de voorzitter ter gelegenheid van de opening der tentoonstelling
- 18, p. 59-62.
Vergadering, Algemeene - 11, p. 65-66.
Verslag secretaris van de redactie der Mededelingen - 16, p. 39.
Verslag van den penningmeester over de periode 1 Juli 1942 - 31
December 1945 (Van Eyndhoven) - 16, p. 37-38.
Verslag van de penningmeester over het boekjaar 1949 - 20, p. 55.
Verslag van de penningmeester over het jaar 1946 (Van Eyndhoven) -
17, p. 48.
Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1933-34
(Schweers) - 7, p. 45.
Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1934-35
(Schweers) - 7, p. 5.
Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1935/36
(Schweers) - 8, p. 9-10.
Verslag van den penningmeester over het vereenigingsjaar 1936-1937
(Müller) - 9, p. 2.

VII. BOEKBESPREKINGEN

- Acta Phaenologica (Fabius) - 3, p. 28-30.
- Anker, Jean & Dahl, Svend, Leven en wetenschap, 3000 jaren biologie (Zaneveld) - 16, p. 10.
- Betrem, Dr J.G., De Iepenziekte en de iepenspintkevers (R.) - 1, p. 63-64.
- Boedijn, K.B., en Steinmann, A., Les espèces des genres *Helicobasidium* et *Septobasidium* des Indes Néerlandaises (Donk) - 3, p. 82.
- Broekhuizen, Dr S., Het raadsel der iepenziekte. Libellenserie no 134 (Oort) - 8, p. 43.
- Cool, Cath. en Lek, Dr H.A.A. van der, Paddenstoelenboek (de V.) - 7, p. 32-33.
- Cool, Cath. en Lek, Dr H.A.A. van der, Paddenstoelenboek, deel 1, derde druk bewerkt door Lek, Dr H.A.A. van der (Oort) - 8, p. 42-43.
- Crawshay, R., Spore ornamentation of the Russulas - 2, p. 57-58.
- Die Pilze Mitteleuropas Bd. I. 8 Lief. Kallenbach, Fr., Die Röhrlinge (M.) - 1, p. 45.
- Die Pilze Mitteleuropas Bd. I, Lief. 12. Kallenbach, Fr., Die Röhrlinge - 5, p.76.
- Die Pilze Mitteleuropas Bd. II, Lief. 1 Neuhoff, W., Die Gallert-pilze (Tremellineae) - 6, p. 73-74.
- Dujarric de la Rivière, R., Le poison des Amanites mortelles (M.) - 5, p.90.
- Favre, J., Les associations fongiques des Hauts Marais Jurassiens et de quelques régions voisines (Huijsman) - 20, p. 19-20.
- Friedrich, Karl, Untersuchungen zur Ökologie der höheren Pilze (Hueck) - 17, p. 53-54.
- Friesia, Nordisk Mykologisk Tidsskrift (v.d.Lek) - 6, p.15-17, 36-37.
- Gilbert, E.J., Les Bolets (Donk) - 3, p. 62-63.
- Hana, K., Onze paddenstoelen, Libellenserie no 84 (de V.) - 7, p. 33.
- Heim, R., Le genre *Inocybe* (Huijsman) - 4, p. 16.
- Hintikka, T.J., Sieni Kirja (Daams) - 19, p. 66.
- Höfler, Karl, Pilzsoziologie (Hueck) - 17, p. 53.
- Josserand, M. et Konrad, P., Note sur deux *Collybia* du groupe *clusilis* (Donk) - 3, p. 82.
- Kallenbach, *Merulius lacrymans*, plaat en Merkblatt (R.) - 4, p. 28.
- Kallenbach, M. & F., Wandtafelserie essbarer und giftiger Pilze, Tafel 1. Der grüne Knollenblätterpilz (*Amanita phalloides*) in verschiedener

- Färbung und in allen Entwicklungs-stufen (F.) - 2, p. 40-42.
- Kavina, Prof. Dr C. et Pilát, Dr A.. Atlas des champignons de l'Europe (Meulenhoff) - 5, p. 89-90.
- Kavina, Prof. Dr C. et Pilát, Dr A., Atlas des Champignons de l'Europe, Fasc. 1-5, 1934, Amanita (van der Lek) - 7, p. 15-17.
- Kavina, Prof. Dr C. et Pilát, Dr A., Atlas des champignons de l'Europe, Fasc. 6. Pleurotus - 6, p.74.
- Konrad, P. Notes critiques sur quelques Champignons de Jura - 2, p. 57.
- Konrad, P. et Maublanc, A., Agaricaceae (Huijsman) - 20, p.18-19.
- Konrad, P. et Maublanc, A., Icones selectae Fungorum fasc. IV (M.) - 1, p. 45.
- Konrad, P. et Maublanc, A., Icones selectae Fungorum fasc. VIII (Meulenhoff) - 5, p. 88-89.
- Kruseman, M. en Wittop Koning, Martine, Paddestoelen zoeken en eten (Boetje) - 19, p. 50-51.
- Lange, Jakob E., Flora agaricina Danica (Meulenhoff) - 5, p. 88-89.
- Lange, Jakob E., Flora agaricina Danica - 6, p. 58.
- Lange, Jakob E., Flora Agaricina Danica vol. 1 (de V.) - 7, p. 33.
- Lange, Jakob E., Studies in the Agarics of Denmark, part VII (M.) - 1, p. 45.
- Lange, Jakob E., Studies in the Agarics of Denmark, no IX (Meulenhoff) - 5, p. 88-89.
- Lindeberg, Gosta, Über die Physiologie Ligninabbauender Boden-Hymenomyzeten (Hueck) - 16, p. 35.
- Martin-Sans, Dr E., L'Empoisonnement par les Champignons et particulièrement les intoxications dues aux Agaricacées du groupe des Clitocybe et du groupe des Cortinarius (M.) - 1, p. 14.
- Modesz, Oskar, Zur Kenntnisse der Mykorrhiza-bildner von Kiefer und Fichte (Hueck) - 16, p. 35.
- Nannfeldt, Prof. J.A., Svampar in Svenska Växter onder redactie van Björn Ursing (Daams) - 19, p. 65.
- Naveau, R., Bijdrage tot de kennis van Pholiota - 2, p. 57.
- Naveau, R., Nieuwe zwammen voor de Antwerpse Kempen - 23, p. 56-57.
- Neuhoff, Dr W., Kritische Gallertpilze II (Donk) - 3, p. 82-83.
- Oort, A.J.P., The sexuality of Coprinus fimetarius (R.) - 1, p.64, 74.
- Paddenstoelenkalender (Boetje-v.R.) - 1, p. 44-45.
- Petch, T., Cordyceps militaris and Isaria farinosa (Schweers) - 18, p. 44.
- Pilzmerkblatt, Ausgabe 28 (M.) - 2, p.40.

- Rautavaraa, T., Suomen Sienisato, Studies on the mushroom crop in Finland and its utilisation (Daams) - 19, p. 46-48.
- Ray, W.W., Some mushrooms edible and poisonous (van der Lek) - 10, p. 12-13.
- "Revue de Mycologie" een nieuw Frans tijdschrift (de Veye) - 7, p. 61-64.
- "Revue de Mycologie" (vervolg) (de Veye) - 7, p.78-79.
- Roelfsema, E.J.D., De champignoncultuur (van der Lek)- 8, p. 31-32.
- Ruys, Joh., De champignoncultuur - 5, p. 76.
- Schierbeek, Dr A., De wonderwereld van het mikroskoop (R.)- 2^e aankondig.no, p. 8.
- Swanenburg de Veye, G.D., Paddenstoelen in woord en beeld (Reijnders) - 5, p. 37.
- Takewo Hemmi, Studies on some wood-destroying Fungi attacking Conifers in Japan (van der Lek) - 6, p. 35-36.
- Transactions British Mycological Society vol. 15, parts 1 en 2 (R.) - 3, p. 8-10.
- Ullstein Sonderheft no 12 Pilze und Pilzgerichte (M.) - 1, p. 23-24.
- Verkade's Paddenstoelen-album (Boetje-v.R.) - 1, p. 42-44.
- Vuillemin, P., Les champignons parasites et les mycoses de l'homme (Meulenhoff) - 4, p. 28.

VIII. DETERMINATIETABELLEN

- Agaricaceae (Lütjeharms) - 9, p. 21-23.
- Agaricaceae, gekleurdsporige (van Eyndhoven) - 15, p. 19-22.
- Agaricaceae, witsporige (van Eyndhoven) - 14, p. 15-17.
- Boleten, Overzicht der in Nederland voorkomende of te verwachten (Huijsman) - 18, p. 17-23.
- Boletus (Joman) - 6, p. 46-48, 62-63, 82-84.
- Boletus scaber-groep (Maas Geesteranus) - 16, p. 29.
- Russula (Immler) - 20, p. 27-32.

IX. EXCURSIES, TENTOONSTELLINGEN, VOORDRACHTEN

Chronologische volgorde der algemene ledenexcursies

- 1929, 28-29 Sept., Delden - 1, p. 29-30.
1930,
- 1931, 10-12 Oct., Nunspeet - 3, p. 34, 37-39.
1932, 1-3 Oct., Ruurlo - 4, p. 25-27.
1933, 9 Oct., Overveen, "Elswout" - 5, p. 37-39.
1934, 6-7 Oct., Nijmegen en Kleef - 6, p. 2, 22-24.
1934, 14 Oct., Baarn - 6 p. 2-3, 24-25.
1934, 28 Oct Heelsum, "Buunderkamp" - 6, p. 25, 73.
1935, 5-7 Oct., Gorssel - 7, p. 21-25.
1936, 26 -27 Sept., Heeze - 8 p. 19 -20.
1936, 24-25 Oct, Wageningen - 8, p. 17-19.
1937, 2-3 Oct, Enschede - 9, p. 17-19.
1938, 24-25 Sept., Roermond en Valkenburg - 10, p. 27-30.
1939, 14-15 Oct., Winterswijk - 11, p. 17-19.
1940, 21-22 Sept., Apeldoorn - 12, p. 2-5.
1940, 12-13 Oct., Gorssel - 12, p. 19-21.
1941, 19 Oct., Hilversum-Baarn - 13, p. 18-19.
1941, 25-26 Oct., Heelsum, "Kievitsdel" - 13, p. 19.
1942, 26-27 Oct., Lunteren - 14, p. 25-27.
1943,
- 1944,
- 1945,
- 1946, 12-13 Oct., Eindhoven - 17, p. 7-9.
1947, 25-26 Oct., Oisterwijk - 17, p. 54.
1948, 25-26 Sept., Ruurlo - 18, p. 39.
1949, 8-9 Oct., Breda - 19, p. 50.
1949, 22-23 Oct., Bergen - 19, p. 50.
1950, 30 Sept. - 1 Oct., Denekamp - niet gepubliceerd !
1950, 29 Oct., Castricum - niet gepubliceerd !

Chronologische volgorde der tentoonstellingen

- 1930, 1-3 Nov., Nijmegen - 2, p. 20-22, 47-48, 49-50, 69.

- 1933, 7-9 Oct., Haarlem - 5, p. 6-10, 20-27, 44-50.
- 1937, 16-18 Oct., Arnhem - 9, p. 15-17.
- 1948, 16-18 Oct., Amsterdam - 18, p. 63-72.
- Excursie "Elswout" (Boting) - 5, p. 37-39.
- Excursie in de omstreken van Apeldoorn, 21-22 Sept. 1940, Met de N.M.V.
op (de Veye) - 12, p. 2-5.
- Excursie in de omstreken van Delden, Onze - 1, p. 29-30.
- Excursie in de omstreken van Enschede, Met de Mycologische op (de
Veye) - 9, p. 17-19.
- Excursie naar Baarn op 14 Oct. j.l., Onze (Oort) - 6, p. 24-25.
- Excursie naar "Elswout" (van Eyndhoven) - 4, p. 47.
- Excursie naar Ruurlo op 9 en 10 Sept. j.l., Verslag van de Oort)- 7, p. 13-14.
- Excursie Ned. Myc. Vereniging op 14 en 15 October 1939, Verslag (Middel-
hoek) - 11, p. 17-19.
- Excursie Ned. Mycol. Ver. te Ruurlo op 1-3 Oct. 1932, Verslag van de
(Swanenburg de Veye) - 4, p. 25-27.
- Excursieprogramma's - zijn te vinden onder de rubriek Bestuurs-
mededelingen.
- Excursies gehouden door district III, Verslag van de (G.A.de Vries) - 19,
p. 67.
- Excursies in België, Mycologische - 17, p. 15-16.
- Excursies, Onze - 6, p. 2-3.
- Excursies op 25 en 26 Oct. 1941 in de omgeving van Kievitsdel, Verslag
van de (Smit) - 13, p. 19.
- Excursies van de Nederl. Mycologische Vereniging op 12 en 13 October in
de omgeving van Eindhoven (Siteur) - 17, p. 79.
- Excursies van district III, Kort verslag der (G.A.de Vries) 14, p. 77.
- Excursies van district V, Zuid-Holland, gehouden op 3 en 17 Oct. 1943,
Kort verslag van de (de Lint, de Graaf en Weverling) 14, p. 77-78.
- Excursies, Verslag van de in 1947 door district V (Zuid-Holland)
Gehouden (Weverling) - 18, p. 8-9.
- Excursie te Lunteren op 26 en 27 Oct. j.l., Kort verslag van de (Middel-
hoek) - 14, p. 25-27.
- Excursie te Spa, De afgebroken (Huijsman) - 10 p. 30-32.
- Excursie, Verslag van de in 1948 door district V (Zuid-Holland)
Gehouden (de Lint, de Graaf, en Weverling) - 18, p. 75-76.

Jubileumtentoonstelling Ned. Mycol. Ver. ter gelegenheid 40-jarig bestaan,
16-18 Oct. in Artis te Amsterdam, Verslag van de (Reijnders)
- 18 p. 63-72.

Jubileumtentoonstelling 1948 - 18, p. 26.

Jubileumtentoonstelling, Terugblik Onze (Schoevers) - 5, p. 20-26.

Korte verslagen - 1, p. 24, 54-58, 68, 74; 2, p. 65-66; 3, p. 13, 48-50,
65-67; 4, p. 33-34, 47-48; 5, p. 10, 39-42, 59-60, 76; 6, p. 37-40,
57, 73; 7, p. 34-35.

Ledenexcursie der N.M.V., Kort verslag van de op 26 en 27 Sept. j.l. te
Heeze gehouden algemeene (de Veye) - 8, p. 19-20.

Ledenexcursie der N.M.V. te Gorssel op 5, 6 en 7 Oct. j.l., De algemeene
(de Veye) - 7, p. 21-25.

Ledenexcursie der N.M.V. te Gorssel op 12 en 13 Oct. 1940, Algemeene
(Smits) - 12, p. 19-20.

Ledenexcursie op 24 en 25 Oct. 1936 in de omgeving Wageningen, Verslag
van de algemeene (Smits) - 8, p. 17-19.

Ledenexcursie op 19 Oct. 1941 tussen Hilversum en Baarn, Verslag van
Een (Smit) - 13, p. 18-19.

Ledenexcursies op 6 en 7 Oct. 1934 in de omgeving van Nijmegen en
Kleef, Verslag van de algemeene (de Veye) - 6, p. 22-24.

Ledenexcursie te Gorssel op 5 en 6 October a.s., De algemeene (de V.) -
7, p. 1-2.

Lezingen over paddestoelen voor de Volksuniversiteit te A'dam, Een
vijftal (de V.) - 9, p. 14.

Lezing voor de flora-commissie. Verslag van een (Uffellie) - 18, p.35-37.

Mededeelingen van de tentoonstellingscommissie - 2, p. 15-16, 47-48, 69.

Nederl. Mycologische Vereeniging naar Zuid-Limburg, Met de (van
Eyndhoven) - 10, p. 27-30.

Paddenstoelententoonstelling gehouden op 16, 17 en 18 Oct., 1937 te
Arnhem, Verslag van de 16e (Oort) - 9, p. 15-17.

Paddenstoelen-tentoonstelling, Onze 14^e - 2, p.49-50.

Paddenstoelententoonstelling te Haarlem op 7-9 Oct., Onze 15e
(Schoevers) - 5, p. 6-10.

Paddenstoelen tentoonstelling, Verslag van de vijftiende (Lütjeharms) -5,
p. 44-51.

Programma van excursies - zie Bestuursmededelingen.

Propaganda-excursie op 4 Oct. '36 op het terrein van Meer en Bosch,

Verslag der (Akke de Vries) - 8, p. 29-30.
Propaganda-excursie op 1 Nov. 1936 te Lage Vuursche, Verslag van de
(Akke de Vries) - 8, p. 30-31.
Propaganda-excursies 1938, Onze (Akke de Vries) - 10, p. 40-41.
Propaganda-excursies Baarn, "Groeneveld", Wolfheze, "Buunderkamp",
Bergen en Schoorl, Telegrafisch verslag van de (de V.) - 9, p. 28-29.
Tentoonstelling in het Koloniaal Instituut (Oort) - 7, p. 13.

X. FIGUREN en FOTO ' S

(Afbeeldingen van fungi zijn in de soortenlijst verwerkt).

- Agsteribbe, E. (met G.L. van Eyndhoven en W.F.Smits Jr.) - 18, p. 71.
Bestuur Nederl. Mycol. Ver. - 5, tegenover p. 28.
Excursiefoto' s - 7, p. 22; 9, p. 29; 10, p. 28; 12, p. 4; 14, p. 26.
Eyndhoven, G.L. van (met E.Agsteribbe en W.F. Smits Jr.) - 18, p. 71.
Fabius, G.C.A. (en face; met J. Valckenier Suringar) - 3, p. 69.
Heideplas, Milieufoto - 12, p. 8.
Kleijn, H. - 18, p. 65.
Lint, Suze de - 19, p. 22.
Meulemeester, P.J.A.J. - 7, p. 14.
Meulenhoff, J.S. - 7, p. 65.
Schematische tekeningen. Aantastingen van bomen door dennenmoorder
en zwavelkopje - 20, p. 3; ascus - 3 p. 6; basidium - 9, p. 6;
hymenium - 9, p. 6; kern- en celdelingsproces - 15, p. 18; osmose -
16, p. 3; plasmolyse - 16, p. 3; sporentypen - 15, p. 19; verband
tussen bodemtemperatuur en bodemvochtigheid en het optreden
van paddestoelen - 17, p. 19.
Schoevers, T.A.C. - 7, p 14; 16, p. 11.
Schweers, A.C.S. - 18, p. 69.
Smit, Mej. J.P.S. (met G.D.Swanenburg de Veye) - 18, p. 67.
Smits Jr., W.F. (met E.Agsteribbe en G.L. van Eyndhoven) - 18, p. 71.
Sporoscoop, constructietekening - 7, p. 71.
Swanenburg de Veye, G.D. (met Mej. J.P.S.Smit) - 18, p. 67.
Tekenvoorbeelden (Middelhoek) - 9, p. 42, 53, 71.
Tondeldozen - 10, p. 45, 46.
Valckenier Suringar, J. (en profiel; met G.C.A.Fabius) - 3, p. 69.

XI. IN MEMORIAM

- Boellaard, In memoriam E.J.A.(Reijnders) - 19, p. 66.
Boting, In memoriam H. (de V.) - 7, p. 21.
Bouwman, In memoriam B.E. (de V.) - 7, p. 1.
Brakman, In memoriam C. (Meulemeester) - 10, p. 43.
Bresadolaj Dr Giacomo - 2e aankondig. no, p. 16.
Fabius, In memoriam G.C.A. (Meulenhoff) - 3, p. 70-72.
Hanel, Josef (Schweers) - 13, p. 28.
Joman, In memoriam A. (de V.) - 6, p. 75.
Koningin Emma, In memoriam H.M. - 5, p. 63.
Konrad, Paul (Huijsman) - 19, p 1.
Meulemeester, In memoriam P.J.A.J. (Swanenburg de Veye) - 20, p. 38-39.
Meulenhoff, eereid van de Ned. Mycol. Ver., In memoriam Dr J.S.(Meulemeester) - 7, p. 65-66.
Schoevers, In memoriam T.A.C. (van der Lek) - 16, p. 11-12.
Thijsse, 25 Juli 1865 - 8 Januari 1945, In memoriam Dr Jac.P. (van Eyndhoven) - 16, p.1-2.
Valckenier Suringar, In memoriam Prof. Dr J. (Red.) - 4, p. 19.
Vuyck, In memoriam Dr L. (Meulenhoff) - 3, p. 53-54.
Wilhadus, Frater (Meulemeester) - 18, p. 39.

XII. REDACTIONEEL

Bij het begin van den eersten jaargang - 1, p. 1.

Bij ' t begin van den nieuwen jaargang - 4, p. 1-2.

Een laatste woord van den redacteur (de Veye) - 14, p. 78.

Laatste bericht uit het redactie bureau (Zaneveld) - 18, p. 38.

Mededelingen van de redactie - 2e aankondig. no. p. 15, 1, p. 16, 40, 58;

2, p. 16, 32, 48, 69-70, 84-85; 3, p. 15-16, 36, 51-52, 84; 4, p. 34,

48; 5, p. 61-62, 77, 95-96; 6, p. 58, 90; 7, p. 18, 36, 64, 80; 8, p. 16, 32,

44, 56, 68; 9, p. 14, 32, 46, 60, 78; 10, p. 14, 26, 42, 54, 66; 11, p.

15-16, 28, 48, 66; 12, p. 18, 32, 52, 66, 80; 13, p. 16, 30, 39-40, 59;

14, p. 38, 52, 62, 70; 15, p. 16, 24, 32; 16, p. 10, 26, 41, 50; 17, p.

16, 40, 56, 68; 18, p. 12, 24, 58, 76; 20, p. 36, 72.

Onderling hulpbetoon (Red.) - 18, p.54-55.

Ons terrein (Fabius en Reijnders) - 1e aankondig. no., p. 3-4.

Uit het nieuwe redactie bureau (Zaneveld) - 15, p. 8.

Van de redacteur (Daams) - 19, p. 52.

XIII. VONDSTEN IN DE PERS

- Aardsterren in Zeist - 2, p. 61.
- Amanita virosa en Mycena Seynii - 1, p. 35-36.
- Antiquarische hoeken - 3, p. 61.
- Artikels over paddenstoelen - 1, p. 48; 2, p. 29, 61, 63; 3, p. 44-45.
- Baldadigheid en paddenstoelen - 1, p. 71.
- Berichten uit couranten en tijdschriften - 4, p. 32.
- Berkenzwam op levend hout - 1, p. 62.
- Bestrijding van dennenroest - 3, p. 81.
- Catalogus mycologische werken - 2, p. 78.
- Cath. Cool-fonds - 1, p. 10-11.
- De eerste microscopische vergrooting van een schimmel - 1, p. 20.
- De groene knolzwam - 2, p. 43.
- De Nederlandsche jeugd en de natuur - 3, p. 61-62.
- De paddenstoelen van Twente - 2, p. 62.
- De sport van het paddenstoelenzoeken - 3, p. 43.
- De Valsche Zwavelboleet - 2, p. 62.
- De wetenschap stiefkind - 1, p. 50.
- Die Sexualität von Coprinus fimetarius - 1, p. 74.
- Dr L. Vuyck overleden - 3, p. 59.
- Een antieke in steen gebeitelde paddenstoel - 1, p. 13.
- Een suikerbietenschimmel - 1, p. 49.
- Fungilore - 2, p. 78.
- Gekleurde afbeeldingen - 1, p. 72.
- Gekleurde transparantjes - 1e aankondig.no., p. 11.
- Gevaren voor niet-leden - 3, p. 43-44.
- Giftige paddenstoelen - 1, p. 73-74.
- Giftige paddenstoelen en dubbelgangers - 2, p. 29.
- Gistsoorten - 1, p. 51.
- Glimmerinktzwam - 1, p. 11.
- Heksenbezems - 1e aankondig.no., p. 11; 2e aankondig.no., p. 10; 1, p.66; 2, p. 61.
- Heksenkring van veenpluis - 2, p. 63.
- Hygrophorus lacmus - 2, p. 76.
- Iepen ziekte - 1, p. 36, 66.
- Invloed van schimmels op bouwstijl - 1, p. 34-35.

Jagershoed van tonderzwam 1, p. 49.
 Kleurstoffen in paddenstoelen - 2, p. 29.
 Lagere organismen in dienst van de biologie - 2, p. 60.
 Leiderskamp voor Natuurstudie - 2e aankondig.no., p. 9.
 Levensduur van roestzwamsporen - 1, p. 52.
 Litho-kalender van Jan Voerman Jr. - 3, p. 60.
 Meeldauw, bestrijding en immuniteit - 1, p. 66-67.
 Merkwaardig gevormd eekhoortjesbrood - 1, p. 11-12.
 Moederkoorn 2, p. 77-78.
 Moeilijkheden bij determineeren van boleten - 1, p. 49.
 Mycologische persberichten - 6, p. 57.
 Mycorrhiza - 1, p. 21; 3, p. 45.
 Naphtaline voor planten - 3, p. 80.
 Natuurbescherming - 1e aankondig.no., p. 9-10.
 Natuurindrukken - 1e aankondig.no., p. 9.
 Nieuwe reïncultuur methoden voor ascomyceten op mest - 1, p. 51-52.
 Orchideeën en mycorrhiza - 2e aankondig.no., p. 9-10.
 Paddenstoelen-album van Verkade - 1, p. 47-48.
 Paddenstoelen en gezondheid - 3, p. 30-31.
 Paddenstoelen eten en vergiftigingen - 2, p. 61.
 Paddenstoelenexcursie - 1e aankondig.no., p. 10.
 Paddenstoelen-foto's in "De Wandelaar" - 3, p. 59-60.
 Paddenstoelengerechten - 1, p. 12.
 Paddenstoelenjaar 1928 en Mycorrhiza - 1e aankondig.no., p. 10-11.
 Paddenstoelennummer van Natura - 1, p. 48.
 Paddenstoelen-phaenologie - 3, p. 45.
 Paddenstoelententoonstelling - 1e aankondig.no., p. 10.
 Paddenstoelen van de Dommelkampen - 3, p. 61.
 Paddenstoelenvergift en kanker - 2, p. 28.
 Paddenstoelenvergiftigingen - 1, p. 47, 72-73; 2, p. 28, 43.
 Parasitische zwammen op Weymouthsden en Juniperus - 1, p. 33.
 Peziza rutilans - 1, p. 33.
 Phaenologische waarnemingen - 1, p. 67, 74; 2, p. 61.
 Phalloïdesvergiftiging, Therapeutische ingreep bij - 4, p. 31-32; rectificatie:
 4, p. 48.
 Psathyra disseminatus en Mycena Seynii - 3, p. 44.
 Rapport Iepenziekte - 1, p. 46-47.

Regenval en paddenstoelen - 3, p. 30.
 Regenval in dezen zomer - 2, p. 29.
 Roestzwammen - 1, p. 33-34.
 Schilder van paddenstoelen - 2e aankondig.no., p. 10.
 Schimmelplaag bestrijding met sluipwespjes 1, p. 12-13.
 Schimmels en asthma - 2, p. 30.
 Schimmels en visscherij - 1, p. 50-51.
 Schouwen in Augustus - 2, p. 78.
 Sexualiteit bij Basidiomyceten - 1, p. 50.
 Spiraalgroei bij een cel - 2, p. 78.
 Sporen en zwamdraden duizenden jaren oud - 2, p. 62.
 Sporen in de ijskoude wereldruimte ? - 3, p. 60-61.
 Sprekers op mycologisch gebied - 1, p. 47; 3, p. 46.
 Steltstuifbal (*Battarea phalloides*) - 2, p. 77.
 Sterkop-stinkzwam - 2, p. 76.
 Stinkzwammen - 3, p. 45-46.
 Truffels - 2e aankondig.no, p. 9; 2, p. 13.
 Uilen op honingdauw van moederkoorn - 3, p. 10-11.
 Varia - 5, p. 42, 60-61.
 Vergiftiging door paddenstoelen - 3, p. 60.
 Verslag paddenstoelentochten Nunspeet - 3, p. 43.
 Vitaminen in gist - 1, p. 51.
 Vitaminen in paddenstoelen - 2, p. 75-76.
 Voordracht - 3, p. 83.
 Voordracht zwammen - 1e aankondig.no, p. 10.
 Werking in de grond van schimmels - 1e aankondig.no., p. 11.
 Wonderlijke paddenstoelen te Batavia - 3, p. 80.
 Zwammen in de Biesbosch - 3, p. 11.
 Zwammen in de duinen - 2, p. 63.
 Zwammen voor tonder - 1, p. 71.

XIV. WAARNEMINGEN

- Aardsterren - 1, p. 63.
Berkenzwam - 2, p. 79.
Champignons in verdedigingswerken (Kam) - 16, p. 24.
De kleine stinkzwam (Van de Wouw) - 3, p. 32.
De nieuwe hoolet *B. pseudo-sulphureus* Kallenbach (Bouwman) - 1, p. 62.
De ruwsporige *Psilocybe foenicisecii* (Pers.) (de Veye) - 4, p. 15-16.
Een nieuwe vezelkop - 2, p. 44.
Fluweelpootje groeiende tusschen het gras (Clerx) - 3, p. 64-65.
Giftigheid *Claviceps purpurea sclerotiën* (Klein) - 4, p. 47.
Glinsteringen des jaars - 2, p. 64.
Heksenkringen van *Clitocybe vibecina* (Clerx) - 3, p. 65.
Jeugdlichaarn van de Peperbus (*Myxostoma coliformis*) - 2, p. 44.
Lentinus suavissimus (Fr.) (R.) - 4, p. 31.
Lepiota Friesii (Lasch) - *Lep. acutesquamosa* Weinm. (R.) - 4, p. 30-31.
Leptonia sarcita (Fr.) (de Veye) 4, p. 30.
Lysurus australiensis weer gevonden (W.J.L.) - 4, p. 16.
Mycena arcangeliana Bres. (Bakker) 4, p. 46.
Nieuwe vindplaats *Inocybe ammophila* (Atk.) - 3, p. 47.
Nog eens de Zeeden-*Mycena* (Oort) - 4, p. 15.
Nogmaals *Coprinus comatus* - 5, p. 75-76.
Nomenclatuur (A. de Vries) - 3, p. 83.
Opwekking om aan te teekenen - 2, p. 79.
Phaenologie en *Boletus rufus* - 2, p. 63-64.
Phaenologische waarnemingen (Andriessse) - 4, p. 14.
Psalliota echinata (Boting) - 4, p. 29-30.
Psalliota echinata (de Veye) - 4, p. 30.
Satansboleet ? (Bredius) - 3, p. 31.
Sterkop-stinkzwam - 2, p. 64-65.
Stinkzwammen - 3, p. 32.
Tricholoma personatum (Bakker) - 4, p. 46.
Tricholoma personatum var. *anserina* (Boting) - 3, p. 64.
Truffelknotzwam en Hertentruffel (R.) - 1, p. 62.
Voorjaar 1933 (van Eyndhoven) - 5, p. 18.
Vroege vondsten en waarnemingen voorjaar 1934 (de Lint, Boting, van Eyndhoven, Oort) - 5, p. 92-93.

Waarnemingen (Bakker) - 1, p. 30-31, 61, 78; 16, p.9; 17, p. 26-27, 40, 46-47.
 Waarnemingen (van den Bergh) - 19, p. 23.
 Waarnemingen (Boetje-van Ruyven) - 14, p. 51.
 Waarnemingen (Brouwer) - 12, p. 79.
 Waarnemingen (Daams) -14, p. 60.
 Waarnemingen (van Dijk)- 17, p. 46.
 Waarnemingen (van Eyndhoven) - 12, p. 65; 14, p. 61; 15, p. 6, 32; 16, p. 9.
 Waarnemingen (Klein) - 4, p. 47; 12, p. 47-48.
 Waarnemingen (van Kregten) - 14, p. 32-33; 15, p. 6, 15; 17, p. 10.
 Waarnemingen (van der Laan) - 14, p. 31-32, 52, 60-61.
 Waarnemingen (Ligtenberg) - 15, p. 23.
 Waarnemingen (de Lint) - 12, p. 49; 13, p. 56; 14, p. 33-34; 16, p. 48.
 Waarnemingen (Maas-van der Meulen) - 14, p.17-18.
 Waarnemingen (van der Meulen) - 14, p. 31.
 Waarnemingen (Middelhoek) - 13, p. 38; 14, p. 51.
 Waarnemingen (Neijtzal de Wilde) - 17, p. 46.
 Waarnemingen (van Ooststroom) - 12, p. 49.
 Waarnemingen (Schweers) 12, p. 30-31, 48-49, 79; 13, p. 28-30, 37-38;
 14, p. 52; 18, p. 35.
 Waarnemingen (Smit) - 12, p. 31; 17, p. 10.
 Waarnemingen (Smith) - 12 p. 49.
 Waarnemingen (de Veye) - 12, p. 31.
 Waarnemingen (Weverling) - 12, p. 66, 79-80; 13, p. 56-57; 17, p. 65.
 Waarnemingen (Wiersma) - 18, p. 34-35.
 Waarnemingen (Wildervanck) - 17, p. 65; 18, p. 34.
 Waarnemingen (van Wijk) - 17, p. 65.
 Wanneer begint de stinkzwam te stinken ? (Fabius) - 3, p. 32-33.
 Was het paddenstoelenjaar '32 overal in ons land en in alle opzichten
 gunstig ? (de Veye) - 4, p. 45.
 Zeedenappel mycena (Boting) - 3, p. 83.

XV. SOORTENLIJST

(Synoniemen zijn cursief gedrukt. Voorzover niet apart vermeld, zijn afbeeldingen van fungi aangeduid door een sterretje bij het paginanummer. Van oudsher bekende geografische namen in oude spelling, buitenplaatsen e.d. tussen aanhalingstekens.)

Zoveel hoofden, zoveel zinnen.

- Acanthocystis algidus* (Fr.) Kühner (*Pleurotus algidus*) omstreken
Haarlem - 6, p. 39.
- Acanthocystis applicatus* (Batsch ex Fr.) Kühner (*Pleurotus applicatus*):
Bergen - Schoorl - 9, p. 29; Ruurlo, "Medler" - 4, p. 27; Wassenaar,
"Voor-Linden" - 18, p. 75.
- Acanthocystis atro-caeruleus* (Fr.) Sing. (*Pleurotus atro-caeruleus*):
Bloemendaal, "Elswout" - 6, p. 13; Renkum, "Oranje-Nassau Oord
of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; Roermond, "Ahrwinkel"
en/of Munnicksbosch - 10, p. 29; Ruurlo, "Medler" - 4, p. 27.
- Acanthocystis auriscalpium* (Maire) Konr. et Maubl. (*Pleurotus
auriscalpium*); Delden, "Twickel" - 12, p. 48.
- Acanthocystis carbonarius* (Alb. et Schw. ex Fr.) Konr. et Maubl.
(*Cantharellus carbonarius*): Baarn, "Groeneveld" (nadere
informatie) - 13, p. 10; Bennekom - 19, p. 23; Epse, Epser bos - 7, p.
9, 22; Epse, Epser bos of Gorssel, " 't Hassink" - 12 p. 20; Mook,
omgev. St. Jansberg - 12, p. 6.
- Acanthocystis petaloides* (Bull. ex Fr.) Kühner (*Pleurotus petaloides*):
beschrijving - 12, p. 63; Amsterdam, N.O. begraafplaats - 12, p. 62;
Mook, Mookerheide - 11, p. 40, 43; - 12, p. 48*; Velp, "Roozendaal" -
12, p. 21; Wageningen, plantenkas - 12; p 21, 22*.
- Acanthocystis serotinus* (Schrad. ex Fr.) Konr. et Maubl. (*Pleurotus
serotinus*): Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 59*; 20, p 47;
Slochteren, Slochterbos - 7, p. 34.
- Acetabula sulcata*: zie *Paxina sulcata*.
- Acetabula spec.* - 8, p. 38; blijkt te zijn *Paxina compressa*, zie daar.
- Agaricaceae: determinatietabel - 9, p. 21-23; tabel witsporigen -14, p. 15-17;
tabel rosesporigen - 15, p. 20; tabel bruinsporigen - 15, p. 20-21;
tabel purpersporigen 15, p. 21-22; tabel zwartsporigen - 15,

p. 22.

Agaricacee: teratologicum - 4, p. 35*.

Agaricus arvensis Schaeff. ex Fr. (*Psalliota arvensis*): kenmerken - 2^e
aankondig.no, p. 6; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; omgev. Arnhem
(nadere informatie) - 18, p. 35; Texel - 6, p. 54; Ulvenhout - 2, p. 30.

Agaricus bernardii (Quél.) Sacc. (*Psalliota bernardii*): Oostkapelle, omgev.
"Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29.

Agaricus campester L. ex Fr. (*Psalliota campestris*) (N.B. waar standplaats
straat tussen huizen, daar vrijwel zeker *Ag. edulis* (Vitt.) Møller et
J.Schaeff.): champignoncultuur - 3, p. 76-77; kweekproef - 3, p. 6;
sporenproductie - 10, p. 65; standplaats - 3, p. 79; Amsterdam,
Vondel-park - 5, p. 69; Eempolder (nadere informatie) - 13, p. 10;
omgev. Haarlem - 5, p. 93; Texel - 6, p. 54; Ulvenhout - Chaam,
"Honsdonck" -15, p. 23; Vlissingen, Scheldestraat - 9, p. 9; omgev.
Wageningen - 5, p. 93.

Agaricus campester L. ex Fr. (*Psalliota campestris*) var.:

Champignoncultuur - 3, p. 3-5; begeleidende en parasitische fungi -
8 p. 46-49.

Agaricus comtulus Fr. (*Stropharia comtula*): Overveen, "Elswout" - 5, p.
38.

Agaricus edulis (Vitt.) Møller et J.Schaeff.: zie opm. onder *Agaricus
campester*.

Agaricus haemorrhoidarius Schulz. et Kalchbr. (*Psalliota
haemorrhoidaria*): Amsterdam, Zuidelijke wandelweg - 8, p. 67;
's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 6, p. 38; Haarlem - 2^e
aankondig.no., p. 6; Heerde, Wapenvelde - 2e aankondig. no,
p. 6; Ulvenhout - 2e aankondig.no, p. 6; 2, p. 45; 3, p. 32, 74; de
Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30; Wassenaar (Meiendel ?) -
1, p. 55; Zwolle, Spoolderberg - 2e aankondig.no, p. 6.

Agaricus purpurascens Cooke (*Psalliota purpurascens*): Oostkapelle,
omgev. Zeeduin (nadere informatie) - 8, p. 28.

Agaricus rusiophyllus Lasch (*Psalliota rusiophylla*); Hooge Vuursche,
Blauwe Koepel - 6, p. 25; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25.

Agaricus silvaticus Schaeff. ex Secr. (*Psalliota silvatica/sylvatica*):
habitusfoto - 20, p. 37; Amsterdam, tuin Kol. Mus. en Sted. Mus.
(onzeker) - 7, p. 60; Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; Bloemendaal(?)
- 5, p. 93; Bloemendaal, Kraantjelek - 17, p. 25; Heilo - 15, p. 32;

- Nieuwersluis "Over-Holland" - 13, p. 12; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.
- Agaricus silvicola* (Vitt.) Sacc. (*Psalliota silvicola*): 's Gravenhage -Delft (onzeker) - 10, p. 66.
- Agaricus villaticus* Brondeau (*Psalliota campestris* var. *vaporaria*): champignoncultuur - 3, p. 76-77; Rijswijk, Hoornbrug - 5, p. 94.
- Agaricus xanthodermus* Genevier (?*Psalliota cretacea*, zie opm. aldaar): Bergen-Schoorl - 5, p. 60.
- Agaricus xanthodermus* Genevier var. *anmophilus* (Menier) Maire (*Psalliota ammophila*): Oostkapelle, "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29.
- Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod (*Pholiota cylindracea*): omgev. Veere - 8, p. 28; Walcheren (waar?) - 5, p. 31.
- Agrocybe arvalis* (Fr. sensu W.G.Smith) Sing. (*Naucoria arvalis*): microscop. kenmerken - 14, p. 55*-56; verschil t.o. *Naucoria myosotis* - 6, p. 64; verschil t.o. *Naucoria semiorbicularis* - 14, p. 55; Amersfoort - 18, p. 46; Baarn, "Pijnenburg" - 18, p. 46.
- Agrocybe dura* (Bolt. ex Fr.) Sing. (*Pholiota dura*): verschil t.o. *Agrocybe praecox* - 17, p. 45; Reeuwijk - 12, p. 79; Sybecarspel - 3, p. 75; omg. Velsen - 17, p. 25; Waalre (nadere informatie) - 17, p. 45; Wieringermeerpolder - 5, p. 72.
- Agrocybe erebia* (Fr.) Kühner (*Pholiota erebia*): vermoedelijk omgev. Denekamp (nadere informatie) - 6, p. 34; Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Wassenaar, "Raaphorst" - 11, p. 65; 18, p. 9.
- Agrocybe ombrophila* (Fr.) Konr. et Maubl. (*Pholiota ombrophila*): omgev. Haarlem - 6, p. 39; Wassenaar, "Raaphorst" 18, p. 9.
- Agrocybe pediades* (Pers. ex Fr.) Fayod (*Naucoria pediades*): Noordoostpolder - 14, p. 66.
- Agrocybe praecox* (Pers. ex Fr.) Fayod (*Pholiota praecox*): verschil t.o. *Agrocybe dura* - 17, p. 45; Aalst (nadere informatie) - 17, p. 44; Bloemendaal(?) - 5, p. 93; Bloemendaal, Kraantjelek - 17, p. 25; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Loosduinen, "Ockenburg" 5, p. 92; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; omgev. Wageningen (nadere informatie) - 9, p. 56; Wieringermeerpolder - 5, p. 72.

- Agrocybe semiorbicularis* (Bull. ex Fr.) Fayod (*Naucoria semiorbicularis*):
verschil t.o. *Naucoria arvalis* - 14, p. 55; Rijswijk - 9, p. 46; Wieringermeerpolder - 5, p. 72; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 59.
- Agrocybe sphaleromorpha* (Bull. ex Fr.) Fayod (*Pholiota praecox* subsp. *sphaleromorpha*): Schoorl - 7, p. 55.
- Aleuria aurantlaca*: zie *Peziza aurantia*.
- Aleuria cerea* (Sow. ex Fr.) Boud.: Loosduinen - 3, p. 77.
- Aleuria praetervisa*: zie *Galactinia praetervisa*.
- Aleuria sepiatra* (Cooke) Boud. Noordoostpolder - 15, p. 11.
- Aleuria sylvestris* Boud.: Enghuizen - 18, p. 34.
- Aleuria vesiculosa* (Bull. ex Fr.) Boud. (*Peziza*; *Plicaria*, *Pustularia vesiculosa*): begeleider champignoncultuur - 8, p. 47; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Bennekom (nadere informatie) - 18, p. 34; Dwingelo (nadere informatie) 16, p. 46; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Loosduinen - 3, p. 77; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Tilburg - 11, p. 62; omgev. Veendam - 8, p. 45.
- Alnicola amarescens* (Quél) Romagn. (*Naucoria amarescens*): Epse, Epserbos - 7, p. 56.
- Alnicola bohémica* (Vel.) Sing. (*Naucoria bohémica*, *Naucoria scorpioides* sensu Lange): Hatert, Hatertse broek - 9, p. 39; Wijster, biol. station - 12, p. 59-60.
- Alnicola escharoides* (Fr.) Romagn. (*Naucoria escharoides*): Winterswijk, steengroeve - 11, p. 19.
- Alnicola luteolofibrillosa* Kühner (*Naucoria conspersa* sensu Lange): Mook, Plasmolen, Groene Water en Sprengen - 13, p. 34; 20, p. 48; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
- Alnicola scolecina* (Fr. sensu Lange) Romagn. (*Naucoria scolecina*): omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
- Alnicola scolecina* (Fr. sensu Lange) Romagn. f. *gracillima* (Lange) Konr. et Maubl. (*Naucoria scolecina* f. *gracillima*): Barneveld, Haanschotergat - 13, p. 6.
- Alnicola submelinoides* Kühner (*Naucoria macrospora* Lange): Gennepe, Genneperveen - 13, p. 34; 20, p. 49.
- Alphitomyces schrötteri* Reissek: parasitisch op *Polyporus* soort - 1^e aankondig.no, p. 16.
- Amanita aspera* (Vitt.) Quél.: Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67; Zoelen - 6, p. 9.

- Amanita citrina* (Schaeff. ex) S.F.Gray (*Amanita mappa*): omgev.
Amersfoort - 2, p. 11; Ulvenhout - 3, p. 74; Wassenaar, Meiendel -
12, p. 47. *Amanita eliae* Quél.: Castricum, Geversduin - 6, p. 57, 86.
- Amanita excelsa* (Fr.) Quél. (N.B. moet waarschijnlijk met *Amanita spissa*
verenigd worden): Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; Scheveningen,
Nieuwe Scheveningsche Boschjes - 1, p. 57.
- Amanita gemmata* (Fr.) Gill. (*Amanita junquillea*): Aerdenhout,
"Naaldenveld" - 5, p. 41; Beekhuizen - 5, p. 40; omgev. Maarsbergen
- 17, p. 25; Zeist - 6, p. 71.
- Amanita inaurata* Secr. (*Amanita*, *Amanitopsis strangulata*): habitusteke-
ning - 13, p. 11; Nieuwersluis "Over-Holland" - 13, p. 12; 19, p. 67;
Swalmen, "Hillenraedtw" - 10, p. 28; omgev. Wageningen - 5, p. 93;
6, p.6.
- Amanita junquillea*: zie *Amanita gemmata*.
- Amanita mappa*: zie *Amanita citrina*.
- Amanita muscaria* (L. ex Fr.) Pers. ex S.F.Gray: omgev. Amersfoort - 2, p.
11; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Lunteren - Ede - 12, p. 31;
Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Texel, staatsbossen - 6, p. 55;
Wouwsche Plantage - 1, p. 53.
- Amanita pantherina* (D.C. ex Fr.) Secr.: 's-Graveland, "Bantam" - 16, p.47;
omgev. Hilversum - 13, p. 11; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Texel,
staatsbossen - 6, p. 55; Vaals, Drielandenpunt - 8, p. 27; Wassenaar,
Meiendel - 12, p. 47.
- Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Secr.: habitustekening - 2, p. 42;
Bergen, Verbrande Pan - 2, p. 64; Bilthoven, De Pan - 18, p. 8; 's-
Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Overveen "Elswout" - 5, p. 38;
Wassenaar, Meiendel - 12, p. 47; Zoelen - 6, p. 9.
- Amanita phalloides* var. *verna*: zie *Amanita verna*.
- Amanita plumbea*: zie *Amanita vaginata*.
- Amanita porphyria* (Alb. et Schw. ex Fr.) Secr. Apeldoorn, "Berg en Bosch"
- 12, p. 4; omgev. De Bilt - 6, p. 40; Lunteren "De Leperkoen" - 14, p.
27; omgev. Nijmegen - 6, p. 22; Olterterp - 6, p. 38.
- Amanita rubescens* (Pers. ex Fr.) S.F. Gray: afb. teratologicum - 9, p. 75;
habitusfoto - 17, p. 8; omgev. Amersfoort - 2, p. 11, 14; Gieten - 9,
p. 12; Gorssel - 7, p. 77; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Haarlem,
stadstuin - 3, p. 11; omgev. Haarlem - 6, p. 12; omgev. Maarsbergen
17 p. 25; Noordbroek - 6, p. 32; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; De

Steeg, "Middachten" - 10, p. 25; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.

Amanita solitaria (Bull. ex Fr.) Secr. (*Amanita strobiliformis*): Delden, "Twickel" - 9, p. 18; omgev. Ruurlo - 4, p. 27; Walcheren (waar?) - 8, p. 29.

Amanita spissa (Fr.) Quél. (*Amanita valida*) (N.B. moet waarschijnlijk met *Amanita excelsa* verenigd worden): habitustekening - 9, p. 71; Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; Roermond, "Ahrwinckel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Ulvenhout - 2, p. 45; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 39, omgev. Wageningen - 8, p. 19; *Amanita strangulata*: zie *Amanita inaurata*.

Amanita strobiliformis: zie *Amanita solitaria*.

Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) Quél. (*Amanita vaginata* var. *plumbea*, *Amanitopsis plumbea*, *Amanitopsis vaginata*) (N.B. niet onmogelijk hebben sommige citaten eerder betrekking op var. *fulva*): omgev. Amersfoort - 2, p. 14; Eindhoven-Best - 7, p. 46; De Lutte - 9, p. 10; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; 6, p. 13; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; omgev. Wageningen - 10, p. 12. *Amanita vaginata* (Bull. ex Fr.) Quél. var. *fulva* (Schaeff. ex Fr.) Gilbert (soms abusievelijk als *Amanita* of *Amanitopsis vaginata*): Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Swalmen, "Hillenraedt" 10, p. 28.

Amanita vaginata var. *plumbea*: zie *Amanita vaginata*.

Amanita valida: zie *Amanita spissa*.

Amanita verna (Lam. ex Fr.) Pers. ex Vitt. sensu Maire, Heim, etc. (*Amanita phalloides* var. *verna*): Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 93; Roermond, "Ahrwinckel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Zoelen - 6, p. 9.

Amanita virosa (Fr.) Quél.: afb. spiraalgroei steel - 14, p. 31; omgev. De Bilt (onzeker) - 6, p. 40; Schoorl - 1, p. 35.

Amanitopsis strangulata: zie *Amanita inaurata*.

Amanitopsis plumbea: zie *Amanita vaginata*.

Amanitopsis vaginata: zie *Amanita vaginata*.

Amoeba met parasitaire schimmel - 11, p. 60*.

Anellaria gracilipes Pat. ("*Anellaria separatus* var. *gracilipes*") (dubieuze soort, misschien een *Psathyrella*?): Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66.

Anellaria semiovata (Sow. ex Fr.) Pearson et Dennis (*Panaeolus separatus*, *Anellaria*, *Stropharia separata*) omgev. Bergen - 9, p. 68; Dokkumer

- Nieuwe Zijlen (nadere informatie) - 18, p. 34; Hengelo, stadstuin - 13, p. 13*, 14; Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29; Peize-Paterswolde - 18, p. 34.
- Anellaria separata*: zie *Anellaria semiovata*.
- Anellaria separatus* var. *gracilipes*: zie *Anellaria gracilipes*.
- Anthracobia melaloma* (Alb. et Schw. ex Fr.) Boud.; Epse - 12, p. 25.
- Anthurus australiensis*: zie *Lysurus australiensis*.
- Arachnopeziza aurelia* (Pers. ex Fr.) Fuck. : beschrijving & afb. - 18, p. 4-6; omgev. Renkum - 18, p. 4; Wolfheze, Wodanseiken - 18, p. 4.
- Armillaria mellea* zie *Armillariella mellea*.
- Armillaria mucida* zie *Oudemansiella mucida*.
- Armillaria ramentacea*: zie *Tricholoma ramentaceum*.
- Armillariella mellea* (Vahl ex Fr.) Karst. (*Armillaria mellea*): aantastingsbeeld van *Pinus silvestris* - 8, p. 20; afb. rhizomorphen en culturen - 8, p. 21-23; lichtend mycelium 2, p. 37-39; 3, p. 40-42; onderzoek parasitaire gedrag - 8, p. 20-23, Amsterdam, v.Baerlestr. - 7, p. 60; Amsterdam Vondelpark - 5, p. 70; 7, p. 60; Breda, Mastbosch, Princenhage - 3, p. 65; omgev. Delden - 1, p. 30; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; omgev. Haarlem - 2, p. 63; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19 p. 11; Ulvenhout - 2, p. 30, 39; 3, p. 41, 75; Vogelenzang -5,p.66.
- Arthrobotrys oligospora* Fresen.: Nematoden-vangend apparaat 17, p. 59*.
- Ascobolus furfuraceus* Pers. ex Fr. (*Ascobolus stercorarius*): korte beschrijving & afb. - 17, p. 33; Enschede - 12, p. 25; Wageningen, kas - 17, p.33.
- Ascobolus stercorarius*: zie *Ascobolus furfuraceus*.
- Ascobolus viridis* Currey: Hatert, Haterse broek - 15, p. 11.
- Ascophanus granulatus* (Bull. ex Fr.) Speng.: Enschede - 12, p. 25; Nijmegen, stadstuin - 11, p. 43; 12, p. 25.
- Aspergillus oryzae* (Ahlb.) Cohn.: habitustekening - 15, p. 27.
- Aspidella vittadinii* (Mor.) Gilbert (*Lepidella*, *Lepiota vittadinii*): Delft, tuin Lab. Techn. Bot. - 13, p. 54*; 17, p. 27; Delft, stadsplantsoenen - 16, p. 9; 17, p. 27, 47.
- Asterophora lycoperdoides* (Bull. ex) Ditmar ex S.F.Gray (*Nyctalis asterophora*): anatomie en gemmenvorming & afb. 9, p. 33-37; parasiet op *Russula nigricans*, *R. adusta*, *Lactarius piperatus*, *L. vellereus*, *Collybia fusipes* - 5, p. 84-85; saprophyt en parasiet - 6, p. 9-10; Boxtel-

- Best, "Veldersbosch" - 7, p. 47; omgev. Bussum - 5, p. 40; omgev. Chaam - 6, p. 34*-35; Eindhoven. "Eckart" - 17, p. 7; Gieten - 9, p. 12; Ulvenhout - 2, p. 45.
- Asterophora parasitica* (Bull ex Fr.) Sing. (*Nyctalis parasitica*): anatomie en gemmenvorming & afb. - 9, p. 33-37; parasiet op *Russula adusta*, *R. foetens*, *R. chloroides*, *R. delica*, *R. nigricans*, *Lactarius blennius*, *L. vellereus* - 5, p. 85; Delden "Twickel" - 9, p. 18; Paterswolde, "De Braak" (vermoedelijk nadere informatie) - 7, p. 34.
- Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morg. (*Geaster hygrometricus*): Amersfoort -2, p. 12; Heilo, Heiloër bos - 17, p. 30.
- Auricularia auricula-judae* (Fr.) Berk (*Hirneola auricula judae*): bijzondere gastheer-keuze: *Acer negundo* - 11, p. 3; *Euonymus europaeus* - 11, p. 3; *Fagus* - 5, p. 39; 11, p. 3; *Quercus* - 5, p. 66; 11, p. 3; *Ulmus* - 6, p. 39; 9, p. 41; 11, p. 3; Overveen, "Elswout" - 5, p. 39; Paterswolde, "De Braak" - 6, p. 56; Rozenburg, De Beer - 2, p. 65; Vogelenzang - 5, p.66.
- Auricularia mesenterica* (Fr.) Pers.: habitusfoto - 9, p. 41; Aerdenhout - 16, p. 9; Beesd, "Marienweerd" - 19, p. 64; Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28.
- Auriscalpium vulgare* Karst (*Hydnum*, *Pleurodon auriscalpium*): Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7; Gorssel, "t'Amelte"- 12, p. 20; Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77.
- Barlaea carbonaria* (Fuck.) Sacc.: Epse, Epser bos - 12, p. 20, 24, 75.
- Barlaea cinnabarina* (Fuck.) Sacc.: Epse, Epser bos - 9, p. 40.
- Barlaea constellatio*: zie *Pulvinula constellatio*.
- Barlaea convexella*: zie *Pulvinula haemastigma*.
- Barlaea persoonii* (Crouan) Sacc.: Hatert, Hatertse broek - 15, p. 11.
- Belonioscypha campanula* (Nees ex Fr.) Rehm: beschrijving & afb. - 20, p. 9-10; Wageningen, Dorskamp - 20, p. 9. *Belonioscypha ciliatospora*: zie *Helotium ciliatosporum*.
- Belonioscypha vexata* (De Not.) Rehm: afb. paraphysen en sporen - 20, p. 9.
- Bjerkandera adusta* (Willd. ex Fr.) Karst. (*Polyporus adustus*): Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Wassenaar; "Voor Linden" - 18, p. 75; Wekerom - Harskamp (nadere informatie) - 18, p. 34.
- Bjerkandera fumosa* (Pers. ex Fr.) Karst. (*Polyporus fumosus*, *P. fumosus*

- var. *fragrans*): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39;omgev. Oosterwijk -11, p. 62; Oosterhout, "Oosterhout" -13, p. 42; Wassenaar "Voor-Linden" - 18, p. 75.
- Bolbitius conocephalus* (Bull. ex Fr.) Ricken (N.B. is vermoedelijk een *Conocybe*) omgev. Valkenswaard - 3, p. 48.
- Bolbitius fragilis* (L. ex) Fr. (*Bolbitius titubans*) (N.B. waarschijnlijk onbetekenende vorm van *Bolbitius vitellinus*): Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
- Bolbitius hydrophilus*: zie *Psathyrella hydrophila*.
- Bolbitius reticulatus* (Pers. ex Fr.) Ricken (*Pluteolus aleuriatus*): Doetinchem, "Slangenburger" - 7, p. 56. *Bolbitius titubans*: zie *Bolbitius fragilis*.
- Bolbitius vitellinus* (Pers. ex) Fr. : obligaat mestbewoner - 8, p. 39; Best-Boxtel, "Veldersbosch" - 7, p. 46-47; Hengelo-Delden, Twente-Rijnkanaal - 17, p. 43*.
- Boletinus cavipes* (Opat.) Kalchbr. (*Boletus cavipes*): diagnose - 18, p. 18; Anlo (nadere informatie) - 16, p. 46; Chaam, "Honsdonck" - 6, p. 35; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; 12, p. 16; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Gieten (nadere informatie) - 16, p. 46; Heeze - 19, p. 63; De Lutte - 9, p. 10; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; Norg (nadere informatie) - 16, p. 46.
- Boletus determinatietabel* - 6, p. 46-48; determinatietabel scaber-groep - 16, p. 29; overzicht der in Nederland voorkomende of te verwachten boleten - 18, p. 17-23.
- Boletus aereus* Bull. ex Fr.: diagnose - 18, p. 20.
- Boletus aestivalis*: zie *Boletus appendiculatus* subsp. *pallescens*.
- Boletus albidus* Roques (*Boletus radicans* Pers. ex Fr. non sensu Kbh.): diagnose - 18, p. 19, 20; Nieuwersluis, "Over Holland" - 19, p. 67.
- Boletus appendiculatus* Schaeff. ex Fr.: diagnose - 18, p. 19, 20.
- Boletus appendiculatus* Schaeff. ex Fr. subsp. *Pallescens* Konr. (*Boletus aestivalis*): diagnose - 18, p. 19, 20.
- Boletus armeniacus* Qué. (wellicht vorm van *Boletus subtomentosus*): diagnose - 18, p. 23.
- Boletus aurantiacus* Bull. ex Pers. (*Boletus rufus*, ten dele)? diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22; verschil t. o. *Boletus rufescens* - 16, p. 17; Bergen, "Duinvermaak" - 16, p. 17; Vogelenzang, "Vinkenduin" - 16, p. 17.
- Boletus auriporus* Peck: zie *Boletus cramesinus*.

- Boletus badius* (Fr.) Fr.: diagnose - 18, p. 23; verschil t.o. *Boletus pulverulentus* - 8, p. 11; omgev. Amersfoort - 2, p. 11, 14; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; Hilversum-Baarn - 13, p.18; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Ulvenhout - 1, p. 53.
- Boletus bellini* Inzenga: diagnose - 18, p. 21.
- Boletus boudieri*: zie *Boletus placidus*.
- Boletus bovinus* L. ex Fr. diagnose - 18, p. 21; associatie met *Gomphidius roseus* - 3, p. 79; 5, p. 60; voorkomen op *Pinus silvestris* - 14, p. 33; microfoto buisjeslaag - 8, p. 60; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; 3, p. 79; Baarn "Buitenzorg" - 6, p. 24; Bergen-Schoorl - 5, p.60; Bloemendaal - 4, p. 24-25; Borger - 6, p. 88*-89*; Eoe - 14, p. 33; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; Lunteren-Ede - 12, p. 31; Norg (teratolog.) - 19, p. 16; omgev. Rijssen - 12, p. 14; omgev. Stroe (morchelloïde vorm) - 14, p. 64; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Boletus calopus* Pers. ex Fr. diagnose - 18, p. 20; Hilversum-Baarn - 13, p. 18.
- Boletus carpini* (R.Schulz) Pearson (*Boletus pseudo-scaber* Kbh., *Boletus scaber* sensu Gilbert, Maire, Quélet, etc.) diagnose - 16, p. 29; 18, p. 22.
- Boletus castaneus*: Zie *Gyroporus castaneus*.
- Boletus cavipes*: zie *Boletinus cavipes*.
- Boletus chrysenteron* Bull. ex Fr.; diagnose - 18, p. 23; Best-Boxtel, "Veldersbosch" (nadere informatie) - 17, p. 45; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12.
- Boletus cramesinus* Secr. (*Boletus auriporus*): diagnose - 18, p. 23; beschrijving & afb. - 7, p. 27-29; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 11, p. 23; 15, p. 6; Gorssel - 7, p. 24; 11, p. 23; omgev. Haarlem - 6, p. 39; 7, p. 27; 11, p. 23; Mook, Plasmolen - 9, p. 39; 20, p. 47; Santpoort, "Neethof" - 7, p. 30; 11, p. 23.
- Boletus cyanescens*: zie *Gyroporus cyanescens*.
- Boletus dupainii* Boud.: diagnose - 18, p. 21.
- Boletus duriusculus* Kalchbr. et Schulz.: diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22; omgev. Bussum - 5, p. 40.
- Boletus edulis* Bull. ex Fr.: diagnose - 18, p. 19-20; verschil t.o. *Boletus Impolitus* - 5, p. 29; teratologicum - 1, p. 11; omgev. Amersfoort - 2, p. 11, 14; Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie)- 13, p.10;

- Best-Boxtel, "Veldersbosch" (nadere informatie) - 17, p. 45; omgev. Delden - 1, p. 29; Eindhoven, "Wielewaal" (nadere informatie) - 17, p. 45; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Noordbroek - 6, p. 32; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Ulvenhout - 1, p. 53; De Vuursche - 13, p. 10.
- Boletus edulis* Bull. ex Fr. subsp. *pinicola* (Vitt.) Konr. et Maubl.: diagnose - 18, p. 19-20.
- Boletus edulis* Bull. ex Fr. subsp. *reticulatus* (Schaeff. Ex Boud.) Konr. et Maubl. (*Boletus reticulatus*): diagnose - 18, p. 19-20; Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29.
- Boletus elegans*: zie *Boletus flavus*.
- Boletus erythropus* (Fr. ex Fr.) Krombh. (non Pers.) (*Boletus miniatoporus*): diagnose - 18, p. 19-20; verschil t.o. *Boletus queletii* - 8, p. 11; Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) - 13, p. 10; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Ulvenhout - 3, p. 75.
- Boletus erythropus* Pers. (non Fr.): zie *Boletus queletii*.
- Boletus felleus*: zie *Tylopilus felleus*.
- Boletus flavidus* Fr. diagnose - 18, p. 21; beschrijving - 12, p. 20, Gorssel, "t Amelte" - 12, p. 20.
- Boletus flavus* With. ex Fr. (*Boletus elegans*, vermoedelijk) diagnose - 18, p. 21; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45; 's-Gravenhage, "Clingendaal" - 11, p. 65; omgev. Ruurlo (teratologicum) - 19, p. 15*-16; Valkenswaard-Heeze (nadere informatie) - 14, p. 60; Zoelen - 6, p. 9.
- Boletus fragrans* Vitt.: diagnose - 18, p. 19-20.
- Boletus granulatus* L. ex Fr.: diagnose - 18, p. 21; omgev. De Bilt - 6, p. 40; Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Boletus holopus* Rostk. (*Boletus niveus*): diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22; omgev. Bussum - 5, p. 40.
- Boletus impolitus* Fr.: diagnose - 18, p. 23; beschrijving & afb. - 5, p. 28-29; verschil t.o. *Boletus edulis* - 5, p. 29; Bunnik - 5, p. 29; Hemmen - 5, p. 29; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 18, p. 46; 19, p. 67; Wageningen - 5, p. 29.

- Boletus junquilleus*: zie *Boletus pseudosulphureus*.
- Boletus leucophaeus* sensu Maire, etc.: zie *Boletus scaber* Bull. ex Fr.
- Boletus leucophaeus* Pers.; dubieuze soort, niet goed bekend.
- Boletus luridus* Schaeff. ex Fr.: diagnose - 18, p. 19-20; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25; Oostkapelle, "Zeeduin" - 3, p. 11; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Wageningen, Laantje van Duivendaal - 9, p. 9.
- Boletus luteus* L. ex Fr.: diagnose 18, p. 21; groeiwijze - 3, p.79; omgev. Amersfoort - 3, p.79; Dwingelo (nadere informatie) 16, p. 46; Eindhoven - 7, p.46; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev.Rijssen - 1, p.53; Texel staatsbossen - 6, p.55; De Vuursche-Hollandsche Rading - 8, p.31.
- Boletus miniatoporus*: zie *Boletus erythropus* (non Pers.).
- Boletus niveus*: zie *Boletus holopus*.
- Boletus pachypus* (N.B. identiteit onzeker ! óf *Boletus albidus*, óf *Boletus calopus*): Amerongen - 7, p. 35; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26.
- Boletus parasiticus* Bull. ex Fr.: diagnose - 18, p. 22; biologie - 3, p. 39-40; parasiet op *Scleroderma aurantium* en *S. verrucosum* 5, p. 85; Boxtel-Best "Veldersbosch" - 17, p. 8*; Breda, Mastbosch - 3, p. 39; Loosduinen, "Ockenburg" - 11, p. 64; Roermond, "Ahrwinckel" en/of "Munnincksbosch"- 10, p.29; omgev. Stadskanaal - 6, p. 10, 11*.
- Boletus piperatus* Bull. ex Fr.: diagnose - 18, p. 21; omgev. Amersfoort -2, p. 11; Doorn-Maarn - 19, p. 11; Eindhoven, "Eckart" en Oirschotsche dijk (nadere informatie) - 17, p. 45; Hilversum-Baarn - 13, p. 18.
- Boletus placidus* Bon. (*Boletus boudieri*) diagnose - 18, p. 21; beschrijving & afb. 13, p. 8-9; Amersfoort-Woudenberg; De Treek - 13, p. 8; Apeldoorn 13, p. 9-10; Apeldoorn, "Klarenbeek" - 7, p. 22; Baarn -13, p. 9-10; Driebergen - 13, p. 9-10; Lochem - 13, p. 9-10; Oosterbeek 13, p. 9-10; Putten - 13, p. 9-10; Zeist - 13, p. 9-10.
- Boletus pseudo-scaber* Kbch.: zie *Boletus carpini*.
- Boletus pseudo-sulphureus* Kbch. (*Boletus junquilleus*): diagnose - 18, p. 19-20; Bilthoven - 1, p. 53, 62; omgev. Hilversum - 13, p. 11; Hondsrug (waar?) - 6, p. 6.
- Boletus pulverulentus* Opat.: diagnose - 18, p. 23; verschil t.o. *Boletus badius* - 8, p. 11; Bergen (op tentoonstelling, nieuw voor de flora) -6, p. 57; Best - 19, p. 63; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 34, 42;

- Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
- Boletus purpureus* Fr. (*Boletus rhodoxanthus*): diagnose - 18, p. 19-20; beschrijving - 5, p. 34; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 33; Bathmen, "Bannink" - 7, p. 24*, 77; omgev. Haarlem 5, p. 33; Oostkapelle, "Zeeduin" - 8, p. 11; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p. 47.
- Boletus queletii* Schulz (*Boletus erythropus* Pers.); diagnose - 18, p. 19, 20-21; verschil t.o. *Boletus erythropus* Fr. (non Pers.) - 8, p. 11; Oostkapelle, "Zeeduin" - 8, p. 11, 28 (nadere informatie).
- Boletus radicans* (non sensu Kbh.): zie *Boletus albides*. *Boletus regius* Krombh.: diagnose - 18, p. 19-20; DeIden, "Twickel" - 5, p. 41.
- Boletus reticulatus*: zie *Boletus edulis* subsp. *reticulatus*.
- Boletus rhodoxanthus*: zie *Boletus purpureus*.
- Boletus rufescens* (Secr.) Konr. (*Boletus rufus*, ten dele): diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22; beschrijving & afb. - 15, p. 10-11; verschil t.o. *Boletus aurantiacus* - 16, p. 17; habitusfoto - 17, p. 8.
- Boletus rufus* (N.B. dubieuze naam; niet meer na te gaan of bedoeld *B. aurantiacus* dan wel *B. rufescens*): *teratologicum* - 1, p. 12, noot; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; omgev. Haarlem (?) - 2, p. 64; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; Ulvenhout - 1, p. 53.
- Boletus satanas* Lenz: diagnose - 18, p. 19-20; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 13, p. 12; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; 6, p. 13; Zoelen - 6, p. 8-9.
- Boletus scaber* Bull. ex Fr. (non sensu Quél., etc) (*Boletus leucophaeus* sensu Maire): diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22; kweekproef 3, p. 6; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Eefde -3, p. 6; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Boletus scaber* sensu Gilbert, Maire, Quél., etc.: zie *Boletus carpini*.
- Boletus subtomentosus* L. ex Fr.: diagnose - 18, p. 23; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Gorssel - 7, p. 77; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Boletus subtomentosus* L. ex Fr. subsp. *spadiceus* (Fr.) Konr. et Maubl.: diagnose - 18, p. 23.
- Boletus sulphureus* Fr.: diagnose - 18, p. 21-22; Bussum - 1, p. 62; Enschede - 1, p. 62.
- Boletus tessellatus* Gill. (bijgeval synoniem van *Boletus nigrescens* Rich. Et

- Rose?): diagnose - 16, p. 30; 18, p. 22.
- Boletus torosus* Fr.: diagnose - 18, p. 19-20.
- Boletus tridentinus* Bres.: diagnose - 18, p. 21.
- Boletus variegatus* Sw. ex Fr.: diagnose - 18, p. 21-22; groeiwijze - 3, p. 79; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; 3, p. 79; Hilversum-Baarn - 13, p. 18.
- Boletus versicolor* (Rostk.) Masee: diagnose - 18, p. 23; Baarn, "Groeneveld" - 13, p. 10; Beekhuizen - 5, p. 40; Best (nadere informatie) - 17, p. 45; Chaam, "Valkenberg" - 1, p. 25; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Dwingelo, Brink (nadere informatie) - 16, p. 46; Eindhoven, Oirschotse dijk (nadere informatie) - 17, p. 45; Middelburg "Veldzicht" - 8, p. 28; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18; Ulvenhout - 1, p. 26; 2, p. 46; 3, p. 75; Walcheren (waar?) - 5, p. 31; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17.
- Boletus viscidus* L. ex Fr.: diagnose 18, p. 21; Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35; Rotterdam, Kralinger Hout - 16, p. 18; Zoelen - 6, p. 9.
- Boletus spec.* : afb. *teratologicum* - 6, p. 54.
- Botryosporium pulchrum* Corda: beschrijving - 18, p. 30; Amsterdam, A'damse bos - 18, p. 30.
- Botrytis gemella* (Bon.) Sacc.: omgev. Rijswijk (onzeker) - 11, p. 25.
- Bovista gigantea*: zie *Calvatia gigantea*.
- Bovista nigrescens* Pers. ex Pers.: 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56; Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 93.
- Bovista plumbea* Pers. ex Pers.: Egmond aan Zee - 5, p. 61.
- Brefeldia maxima* (Fr.) Rost. (Myxomycetes): De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
- Bulgaria inquinans*: zie *Phaeobulgaria inquinans*.
- Calocera cornea* (Batsch ex Fr.) Fr.: habitustekening - 10, p. 22; Wassenaar, Meiendel - 2, p. 66.
- Calvatia bovista* (Pers. ex Pers.) Th. Fr. Jr. (*Lycoperdon bovista*, *Lycoperdon caelatum*): 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56; omgev. Haarlem - 5, p. 93; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
- Calvatia excipuliformis* (Scop. ex Pers.) Perdeck (*Lycoperdon excipuliforme*, *Lycoperdon saccatum*): Gorssel - 7, p. 77; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
- Calvatia gigantea* (Batsch ex Pers.) Lloyd (*Bovista gigantea*, *Lycoperdon*

- giganteum): sporenproductie - 10, p. 65; Alkmaar, Centraal Ziekenhuis - 6, p. 52; Amsterdam Vondelpark - 7, p. 59; 's-Gravenhage, Zuiderpark - 10, p. 66; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; omgev. Schagen - 6, p. 30*; 11, p. 23.
- Camarophyllus irrigatus* (Pers. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus irrigatus*): Ulvenhout - 2, p. 45.
- Camarophyllus niveus* (Scop. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus niveus*): Beekhuizen - 5, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 47; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Gorssel, "'t Joppe" - 12, p.20; Haren, Hortus "De Wolf" (onzeker) - 20, p. 67; Heelsum, omgev. Heelsumsche beek - 13, p. 19; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.
- Camarophyllus pratensis* (Pers. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus pratensis*): Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67.
- Camarophyllus russocoriaceus* (Berk. et Miller) Lange (*Hygrophorus russo-coriaceus*): omgev. Bussum - 14, p. 77; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67.
- Camarophyllus subradiatus* (Schum. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus subradiatus*): habitustekening - 19, p. 5; Delden, "Backenhage" (nadere informatie) - 18, p. 53; Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20.
- Camarophyllus virgineus* (Wulf. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus virgineus*): Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.
- Cantharellus aurantiacus*: zie *Clitocybe aurantiaca*.
- Cantharellus carbonarius*: zie *Acanthocystis carbonarius*.
- Cantharellus cibarius* Fr.: habitusfoto - 20, p.21; gastheer van *Leptonia parasitica* - 5, p. 85; standplaats - 3, p.79; omgev. Amersfoort - 2, p. 11, 14; 3, p. 79; Beekhuizen - 5, p. 40; Ede, Hoekelom - 5, p. 42; Emmen, Emmerdennen - 14, p. 32; Goor-Markelo - 12, p. 14; Gorssel - 7, p. 77; Heeze - 7, p. 76; Hengelo (foutief als *Cantharellus friesii*) - 9, p. 27; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; omgev. Maarsbergen -17, p. 25; Oldenzaal, Denekamp (kleurvarianties) - 10, p. 39; omgev. Ruurlo (teratologicum) - 19, p. 14; Ulvenhout - 3, p. 74; Texel, staatsbossen - 6, p.55.
- Cantharellus friesii*: onjuiste determinatie, zie onder *C. cibarius*.
- Cantharellus infundibuliformis*: zie *Craterellus tubaeformis*.

- Cantharellus lutescens*: zie *Craterellus lutescens*.
- Cantharellus olidus*: zie *Clitocybe olida*.
- Cantharellus pallidus* Cooke: zie *Clitocybe aurantiaca*.
- Cantharellus tubaeformis*: zie *Craterellus tubaeformis*.
- Cantharellus umbonatus*: zie *Clitocybe umbonata*.
- Cantharellus spec.*: afb. *teratologicum* - 11, p. 45.
- Ceratostomella ulmi* (Schwarz) Buisman (*Graphium ulmi*): biologie - 7, p. 39-41; geslachtelijke vorm van *Graphium ulmi* - 3, p. 77-78; verwekker iepenziekte - 1, p. 36, 63.
- Ceratomyces albus* (Corda) Sacc. (*Ptychogaster albus*) (jeugd stadium van *Polyporus trabeus* (?)), bedoeld *P. borealis*, maar ook dat onbewezen): zie *Tyromyces ptychogaster*.
- Champignoncultuur: afb. kweekbed - 3, p. 4.
- Chlorosplenium aeruginosum* (Oeder) De Not.: veroorzaker groenrot - 1, p. 9; Bergen - 2, p. 30; Loosduinen, "Ockenburg" - 1, p. 57; Prinsenhage, Liesbosch - 1, p. 9; Ulvenhout - 1, p. 28; 3, p. 32; Wassenaar, "Raaphorst" - 11, p. 65; Wassenaar, "Rust en Vreugd" (abusievelijk "Rust en Vrede") - 1, p. 9.
- Ciboria batschiana* (Zopf) Buchw. (*Sclerotinia pseudo-tuberosa*): Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 42; omgev. Eindhoven - 15, p. 32; Wassenaar, Meiendel - 9, p. 40; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p. 47.
- Ciboria pygmaea* (Fr.) Rehm (N.B. hoort niet in *Ciboria* thuis, nog onbeslist waar wel): Hengelo - 12, p. 25; Vierlingsbeek - 9, p. 40; 12, p. 25.
- Ciboria pyriformis* (Hedw.) Rehm (N.B. hoort niet in *Ciboria* thuis, nog onbeslist waar wel): Beugen - 12, p. 42.
- Ciboria sydowiana*: zie *Rutstroemia sydowiana*.
- Ciliaria fleischeriana* (P.Henn.) v. Ov.: afb. sporen - 9, p. 3.
- Clathrus cancellatus*: zie *Clathrus ruber*.
- Clathrus ruber* Mich. ex Pers. (*Clathrus cancellatus*): habitustekening - 13, p. 22; Amsterdam-Haarlem - 11, p. 30; Bergh, Wijnbergen - 13, p. 35; Bloemendaal - 13, p. 19; Leiden, Hortus Bot. - 13, p. 21; Roermond - 13, p. 21.

- Claudopus byssisedus* (Pers. ex Fr.) Gill.: parasiet op *Hymenogaster tener*, *Inocybe godeyi*, *Pachyphlaeus citrinus*, *Tuber rufum* - 14, p. 10; Doetinchem, "Slangenburg" - 10, p.37; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
- Claudopus depluens* (Batsch ex Fr.) Gill.: Eindhoven(?) - 7, p. 47.
- Claudopus parasiticus* (Quél.) Ricken (*Claudopus subdepluens*, *Leptonia parasitica*): parasiet op *Cantharellus cibarius* - 5, p. 85; 14, p. 10; parasiet op *Coriolus versicolor* en *Polyporus perennis* - 5, p. 85-86*; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49; 5, p. 86-87.
- Claudopus subdepluens*: zie *Claudopus parasiticus*.
- Claudopus variabilis*: zie *Dochmiopus variabilis*.
- Clavaria abietina*: zie *Ramaria ochraceo-virens*. *Clavaria abietina* f. *flaccida*: zie *Ramaria flaccida*.
- Clavaria acuta* Sow. ex Fr. (*Clavaria falcata*): omgev. Ruurlo - 4. p. 27.
- Clavaria affinis* Pat. et Doass.: Ooij - 15, p. 11.
- Clavaria argillacea* Pers. ex Fr. Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66.
- Clavaria asterospora*: zie *Clavulinopsis asterospora*.
- Clavaria aurea*: zie *Ramaria aurea*.
- Clavaria botrytis*: zie *Ramaria botrytis*.
- Clavaria corniculata*: zie *Clavulinopsis corniculata*.
- Clavaria falcata*: zie *Clavaria acuta*.
- Clavaria fistulosa*: zie *Clavariadelphus fistulosus*.
- Clavaria inaequalis*: zie *Clavulinopsis helvola*.
- Clavaria juncea*: zie *Clavariadelphus junceus*.
- Clavaria juncea* var. *vivipara*: zie *Clavariadelphus junceus*.
- Clavaria pallida*: zie *Ramaria mairei*.
- Clavaria pistillaris*: zie *Clavariadelphus pistillaris*.
- Clavaria rosea* Dalman (N.B. wordt niet vermeld in Donk, Corner, etc.): Venraay, Oostrum - 14, p. 66.
- Clavaria rugosa*: zie *Clavulina rugosa*.
- Clavaria subtilis*: zie *Clavulinopsis subtilis*.
- Clavaria vernalis*: zie *Clavulinopsis vernalis*.
- Clavariadelphus fistulosus* (Holmskj. ex Fr.) Corner (*Clavaria fistulosa*): Baarn, "Groeneveld" - 18, p.47; Olterterp - 6, p. 38; omgev. Oosterwolde - 5, p. 41; Vogelenzang - 5, p. 68.
- Clavariadelphus junceus* (Alb. et Schw. ex Fr.) Corner (*Clavaria juncea* et var. *vivipara*, *Typhula juncea*): Amersfoort - 2, p. 12; Baarn,

- "Groeneveld" - 18, p. 47; Drouwen, Drouwenerzand - 5, p. 67-68*; Epse, Epser bos - 10, p. 41; Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; Slochteren, Slochter bos - 6, p. 38; Vogelenzang - 5, p. 67.
- Clavariadelphus pistillaris* (L. ex Fr.) Donk (*Clavaria pistillaris*): omgev. Deventer - 7, p. 31*.
- Claviceps purpurea* (Fr.) Tul.: Ommen - 1, p. 52.
- Clavulina cristata* (Holmskj. ex Fr.) Schroet. (*Ramaria cristata*): Vaals, Drielandenpunt - 8, p. 27.
- Clavulina rugosa* (Bull. ex Fr.) Schroet. (*Clavaria rugosa*): Amersfoort - 2, p. 12.
- Clavulinopsis asterospora* (Pat.) Corner (*Clavaria asterospora*): Hatert - 10, p. 37.
- Clavulinopsis corniculata* (Schaeff. ex Fr.) Corner (*Clavaria corniculata*): Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20.
- Clavulinopsis helvola* (Pers. ex Fr.) Corner (*Clavaria inaequalis*, zie echter vooral Corner, p. 343!): Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67.
- Clavulinopsis subtilis* (Pers. ex Fr.) Corner (*Clavaria subtilis*): Doetinchem, "Slangenburger" - 7, p. 55.
- Clavulinopsis vernalis* (Schw.) Corner (*Clavaria vernalis*): Bergeyk - 17, p. 35; Esbeek - 17, p. 35; Gennep, Genneperveen - 11, p. 42-43; 20, p. 48; Hengelo - 11, p. 42; Lheebroek, Lheebroekerzand - 11, p. 42-43; Limmel - 17, p. 35; Valkenswaard - 17, p. 35.
- Clitocybe alexandri* (Gill.) Konr.: Velsen, "Velserbeek" - 14, p. 61. *Clitocybe aurantiaca* (Wulf. ex Fr.) Studer (*Cantharellus aurantiacus*, *Cantharellus "pallidus"*): Amsterdam (?), kas - 11, p. 24; Bergen-Schoorl - 5, p. 60; Breda, Mastbosch - 1, p. 53; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Hilversum-Baarn - 13, p. 18; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Ulvenhout - 1, p. 53; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77; Wassenaar, Meiendel (onzeker) - 6, p. 68. *Clitocybe brumalis* (Fr.) Quél.: Vogelenzang - 5, p. 66.
- Clitocybe cerussata* (Fr.) Quél.: Beekhuizen (onzeker) - 5, p. 40; Wassenaar, (Meiendel?) - 1, p. 55; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.
- Clitocybe clavipes* (Pers. ex Fr.) Quél.: veldkenmerk blauwzuurgeur - 18, p. 74; gastheer van *Volvaria loveiana* - 5, p. 85; Hilversum-Baarn, 13, p. 18-19.

- Clitocybe connata* (Schum. ex Fr.) Gill: Enschede, "Smalenbroek" - 9, p. 17*-18; Wassenaar "Duinrel" - 14, p. 77.
- Clitocybe cyathiformis* (Bull. ex Fr.) Quél. (N.B. hetgeen Schweers *Cl. tarda* noemt is "zwarte, grote variëteit" van *Cl. cyathiformis*, beschreven in weinig bekend werk van Frans auteur (Dunant??), nadere informatie): Winterswijk (Het Woold?) - 11, p. 19.
- Clitocybe dealbata* (Sow. ex Fr.) Gill.: 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 6, p. 38.
- Clitocybe ericetorum* (Bull. ex Fr.) Quél.: Texel, staatsbossen - 7, p. 49.
- Clitocybe flaccida*: zie *Lepista inversa*.
- Clitocybe gangraenosa*: zie *Lyophyllum leucophaeatum*.
- Clitocybe geotropa* (Bull. ex Fr.) Quél, Walcheren (waar?) - 3, p. 29.
- Clitocybe gigantea* (Sow. ex Fr.) Quél, ontwikkeling heksenkring - 7, p. 10-11; Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
- Clitocybe gyrans* (Paulet) Gill.: Wouwsche Plantage (onzeker) - 1, p. 53.
- Clitocybe hydrogramma* (Bull. ex Fr.) Sing. (*Omphalia hydrogramma*): veldkenmerk geur van kippenhok - 18, p. 75.
- Clitocybe infundibuliformis* (Schaeff. ex Fr.) Quél.: omgev. Maarsbergen - 17, p. 26.
- Clitocybe inversa*: zie *Lepista inversa*.
- Clitocybe laccata*: zie *Laccaria laccata*.
- Clitocybe nebularis* (Batsch ex Fr.) Quél.: gastheer van *Volvaria loveiana* - 5, p. 85; Amersfoort - 2, p. 12; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 34, 42; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; Vogelenzang - 5, p. 66.
- Clitocybe obbata* (Fr.) Quél.: Amersfoort - 2, p. 12.
- Clitocybe obsoleta* (Batsch ex Fr.) Quél.: Renkum, "Oranje-Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
- Clitocybe odora* (Bull. ex Fr.) Quél.: omgev. Chaam. - 6, p. 34; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; 5, p. 38.
- Clitocybe olearia* (D.C. ex Fr.) Maire (*Pleurotus olearius*): beschrijving & afb. 11, p. 54-57; omgev. Wilp - 11, p. 19 (abusievelijk opgegeven Deventer), 53.
- Clitocybe olida* (Quél.) Konr. (*Cantharellus olidus*): beschrijving & afb. 6, p. 26; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 25, 39.

- Clitocybe pachyphylla* (Fr.) Gill: veldkenmerken - 12, p. 49; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17; 12, p. 49.
- Clitocybe phyllophila* (Fr.) Quél.: De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
- Clitocybe rivulosa* (Pers. ex Fr.) Quél.: Noordbroek - 6, p. 32; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Vogelenzang - 5, p. 66.
- Clitocybe splendens*: zie *Lepista gilva*.
- Clitocybe suaveolens* (Schum. ex Fr.) Quél.; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; omgev. Rijssen - 12, p. 15; Vogelenzang - 5, p. 66.
- Clitocybe tarda*: zie *Clitocybe cyathiformis*.
- Clitocybe tornata* (Fr.) Quél.: Ede-Bennekom - 14, p. 61.
- Clitocybe umbonata* (Gmel. ex Fr.) Konr. (*Cantharellus umbonatus*): Waalre - 19, p. 64; Wassenaar, "Duinrel" 14, p. 77.
- Clitocybe vibecina* (Fr.) Quél.: Breda, Mastbosch - 3, p. 65; Norg (onzeker *teratologicum*) - 19, p. 16; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
- Clitocybe spec.*: beschrijving - 14, p. 64-65; omgev. Stroe - 14, p. 64.
- Clitopilopsis mundulus* (Lasch) Kühner (*Rhodopaxillus mundulus*): Wassenaar, Meiendel - 13, p. 14.
- Clitopilus cretatus* (Berk. et Br.) Sacc.: verschil t.o. *Pleurotus mutilus* - 8, p. 47-48; begeleider champignoncultuur - 8, p. 48.
- Clitopilus pinsitus* (Fr.) Joss. (*Pleurotus passeckerianus*, vermoedelijk): beschrijving & afb. - 12, p. 61; opgevat als cultuurvorm van *Pleurotus mutilus* - 8, p. 48, noot; Wijster, "Klencke" - 12, p. 61-62.
- Clitopilus prunulus* (Scop. ex Fr.) Quél.: Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28; omgev. Rijssen - 12, p. 15; De Vuursche - Hollandsche Rading - 8, p. 31; Wageningen, Laantje van Duivendaal - 9, p. 9.
- Cnazonaria erythropus*: zie *Typhula erythropus*.
- Coccomyces coronatus* (Schum.) De Not.: korte beschrijving & afb. - 17, p. 5.
- Coleosporium melampyri* (Reb.) Kleb.: uredin., telium: Bennekom - 19, p. 40; Wageningen - 19, p. 40.
- Coleosporium senecionis* (Pers.) Fr. aecid. stad. hiervan waarschijnlijk *Peridermium oblongisporium* Rostr. 19, p. 40; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 30: uredin., telium; Wageningen, Binnenhaven en Eng - 19, p. 40.

- Coleosporium sonchi* (-arvensis) (Pers.) Lév.: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 40.
- Collybia acervata* (Fr.) Gill. (N.B. zie opm. bij *Marasmius erythropus*): Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5.
- Collybia ambusta* (Fr.) Quél.: Bergen, staatsbossen - 11, p. 42.
- Collybia atrata* (Fr.) Quél. (*Tephrophana atrata*): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Epse, Epser bos - 7, p. 9, 22; 10, p. 41; Epse, Epser bos of Gorssel, "t Hassink" - 12, p. 20; Heeze (nadere informatie) - 17, p. 45; Valkenswaard, Beuven en visvijvers (nadere informatie) - 17, p. 45; De Vuursche-Hollandsche Rading - 8, p. 31; Wageningen - 20, p. 33; Wassenaar, Meiendel - 13, p. 15.
- Collybia butyracea* (Bull. ex Fr.) Quél.: Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18.
- Collybia cirrhata* (Schum. ex Fr.) Quél.: Doorn-Maarn - 19, p. 11.
- Collybia clusilis* (Fr.) Gill.: Hatert, Uiversnest - 17, p. 6.
- Collybia collina* (Scop. ex Fr.) Quél.: omgev. Gorssel - 7, p. 73.
- Collybia conigena* sensu Fr., Gill., Sacc., Lange: zie *Collybia myosura*.
- Collybia coracina* (Fr.) Gill.: Oosterhout, "Oosterhout" - 10, p. 37; 13, p. 42.
- Collybia dryophila* (Bull. ex Fr.) Quél. *afb. teratologica* - 6, p. 45-46; Amsterdam Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Heeze - 7, p. 76; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.
- Collybia erosa*: zie *Collybia tesquorum*.
- Collybia funicularis* (Bull. ex Fr.) Konr. et Maubl.: Heeze - 7, p. 76.
- Collybia fusipes* (Bull. ex Fr.) Quél.: gastheer van *Nyctalis asterophora* - 5, p. 85; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; De Steeg, "Middachten" - 5, p. 60; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; Vijlen, Vijlener bos - 10, p. 30.
- Collybia inolens* (Fr.) Quél.: Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87.
- Collybia laccata*: zie *Laccaria laccata*.
- Collybia laxipes* (Fr.) Quél.: omgev. Denekamp (vermoedelijk nadere informatie) - 6, p. 33.
- Collybia leucomyosotis*: zie *Collybia palustris*.
- Collybia longipes*: zie *Xerula pudens*.
- Collybia maculata* (Alb. et Schw. ex Fr.) Quél.: droogtevormen - 6, p. 33*; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; omgev. Chaam - 6, p. 35; Texel staatsbossen - 6, p. 55; 7, p. 49; Zeist - 6, p. 71.

- Collybia mephitica* (Fr.) Karst.: Mook, Plasmolen, St Jansberg - 14, p. 66; 20, p. 49.
- Collybia misera* (Fr.) Sacc.: onduidelijk verschil t.o. *Collybia leucomyosotis* - 12, p. 9; Wassenaar, Meiendel - 5, p. 88.
- Collybia myosura* (Fr.) Quél. (*Collybia conigena*): Oosterhout, "Oosterhout" -13, p. 42; Texel, staatsbossen - 7, p.35, 49, 56; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p.17.
- Collybia obstans* Britzelm.: Hatert, Hatertse vennen - 14, p. 66.
- Collybia palustris* Peck (*Collybia leucomyosotis*, *Tephrophana palustris*): onduidelijk verschil t.o. *Collybia misera* - 12, p. 9; omgev. Eindhoven -17, p. 35; Gennepe - 9, p. 39; 20, p. 47; omgev. Krommenie (nadere informatie) - 17, p. 43; omgev. Wijster - 12, p.8, 9*.
- Collybia platyphylla* (Pers. ex Fr.) Quél.: Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25; Ruurlo, "Kleine Meene" - 12, p. 76; De Vuursche-Hollandsche Rading - 8, p. 31.
- Collybia protracta* (Fr.) Gill.: Winterswijk, Ratum - 11, p. 43.
- Collybia radicata*: zie *Oudemansiella radicata*.
- Collybia tenacella*: zie *Marasmius tenacellus*.
- Collybia tesquorum* (Fr.) Gill. (*Collybia erosa*): beschrijving - 7, p. 50; Gennepe, Genneper veen - 13, p. 34; 20, p. 48; Nistelrode - 7, p. 50; Schoorl, Ijsbeer - 11, p. 43; Texel, staatsterrein - 7, p. 35, 49, 56.
- Collybia tuberosa* (Bull. ex Fr.) Quél.: parasiet op *Russula adusta*, *R. nigricans*, *Lactarius vellereus*, *Polyperus squamosus*, *Hydnum* soorten - 5, p. 85; omgev. Chaam - 6, p. 34*-35.
- Collybia velutipes* (Curt. ex Fr.) Quél.: vegetatiefoto - 6, p. 59; grondbewonend en wortelend - 14, p. 61; Amsterdam, Vondelpark - 5, p.70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Breda, Wilhelminapark - 3, p. 64; Breda-Terheyden - 3, p. 65; Haarlem, Haarlemmer Hout -20, p. 18; Haarlem stadstuin - 3, p. 12; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 34; Rijswijk - 9, p. 46; Rijswijk, Hoornbrug - 5, p. 94; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; omgev. Wageningen -20, p. 33.
- Collybia spec.*: beschrijving & afb. sporen - 13, p. 32-33; Amersfoort-Woudenberg, de Treek - 13, p. 32.
- Coniophora puteana* (Schum. ex Fr.) Karst.: Haarlem, stadstuin - 3, p. 12;

- omgev. Valkenburg - 10, p. 29.
- Conocybe appendiculata* Lange et Kühner (*Galera ravidata* sensu Ricken):
Oosterhout, "Oosterhout" - 9, p. 39.
- Conocybe blattaria* (Fr. sensu Ricken) Kühner: Oosterhout, "Oosterhout" -
13, p. 42.
- Conocybe coprophila* Kühner; beschrijving - 14, p. 54-55; Oude Mirdum,
Mirdumer Klif - 14, p. 54.
- Conocybe lateritia* (Fr.) Kühner (*Galera lateritia*): Wieringermeerpolder
(waar?) - 5, p. 72.
- Conocybe leucopoda* Kühner: beschrijving & afb. - 13, p. 7-8; Wijster,
biol. station - 13, p. 8.
- Conocybe pubescens* (Pers ex Fr.) Kühner (*Galera tenera* sensu Ricken,
non Fr.): verschil t.o. *Galera vittaeformis* - 6, p. 65; Amsterdam,
Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Wieringermeerpolder (waar?) - 5,
p. 72.
- Conocybe rickenii* (J. Schaeff.) Kühner (*Galera pygmaeo-affinis* sensu
Ricken, non Fr.): verschil 2- en 4-sporige vorm - 12, p.44*-45;
verschil t.o. *Galera vittaeformis* - 6, p. 65; Bilthoven, De Pan - 18, p.
8; Enschede, Museum Grensland - 12, p. 45; Wieringermeerpolder
(waar?) - 5, p. 72; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 59.
- Conocybe sparteae* (Fr. sensu Ricken) Konr. et Maubl. (*Galera sparteae*):
verschil t.o. *Galera vittaeformis* - 6, p. 65.
- Conocybe spicula* (Lasch sensu Ricken) Kühner (*Galera spicula*): verschil t.
o. *Galera vittaeformis* - 6, p. 65; Hatert, Vogelbos - 16, p. 31.
- Conocybe togularis* (Bull. ex Fr. sensu Ricken) Kühner (*Pholiota togularis*):
Amsterdam, Vondelpark - 8, p. 38.
- Conocybe typhicola* (P.Henn.) Schweers (*Naucoria typhicola*): Overasselt -
10, p. 37, 51; 18, p. 1*, 3.
- Conocybe spec.*: beschrijving & afb. 14, p. 68-69; Vogelenzang, "Leyduin"
- 14, p. 67.
- Coprinus angulatus* (N.B. determinatie stellig onjuist, nadere informatie;
misschien *Coprinus lipophilus* Heim et Romagn.): 's-Gravenhage -
16, p. 48; 17, p. 10; Walcheren, omgev. Nieuw en St Joosland - 8, p.
29.
- Coprinus aquatilis* Peck: Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 20, p. 47.
- Coprinus atramentarius* (Bull. ex Fr.) Fr. (*Coprinus fuscescens*):
vegetatiefoto - 6, p. 72; gastheer van *Stropharia epimyces* - 5, p. 85;

Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 69; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Appingedam - 17, p. 24; Haarlem stadstuin - 3, p. 11; Middelburg "Veldzicht" - 8, p. 28; Rotterdam, Kralinger Hout - 14, p. 48; Wieringermeerpolder (waar?)- 5, p. 72; IJzendoorn - 17, p. 25.

Coprinus boudieri Quél. (volgens M. Lange synoniem van *Coprinus angulatus* Peck): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; Epse, Epser bos - 7, p. 10, 22; 10, p. 41; Epse, Epser bos of Gorssel "'t Hassink'" - 12, p. 20; Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35.

Coprinus cinereus: zie *Coprinus fimetarius*.

Coprinus comatus (Müller ex Fr.) S.F. Gray: habitustekening - 9, p. 71; gastheer van *Stropharia epimyces* - 5, p. 85; kweekproef - 3, p. 6; sporenproductie - 10, p. 65; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Eindhoven - 7, p. 46; s-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; 's-Gravenhage, stadsplantsoen - 17, p. 65; Haarlem, omgev. Haarlemmer Hout - 5, p. 56; omgev. Rijssen - 12, p. 14; Rijswijk, Hoornbrug - 5, p. 94; omgev. Wageningen - 5, p. 93; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72; Winterswijk, Buskersbosch - 11, p. 19.

Coprinus congregatus (Bull. ex Fr.): begeleider champignon cultuur - 8, p. 46; Loosduinen, kassen - 3, p. 77.

Coprinus cordisporus: zie *Coprinus patouillardii*.

Coprinus deliquescens (Bull. ex Fr.) Fr.: Castricum, Geversduin - 6, p. 57.

Coprinus dilectus sensu Lange: zie *Coprinus erythrocephalus*, *Coprinus disseminatus* (Pers. ex Fr.) S.F. Gray (*Psathyrella disseminata*): vegetatiefoto - 7, p. 13; Appingedam - 17, p. 24; Loosduinen "Ockenburg" - 5, p. 93; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; Wageningen, plantenkas - 12, p. 21; Walcheren (waar?) - 8, p. 29.

Coprinus ephemeroideus (Bull. ex Fr.) Fr. sensu Lange: Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 9, p. 39; 20, p. 47.

Coprinus ephemerus (Bull. ex Fr.) Fr. sensu Locq.: begeleider champignon cultuur - 8, p. 46; Loosduinen, kassen - 3, p. 77.

Coprinus erythrocephalus Lév. (*Coprinus dilectus* sensu Lange): Amsterdam, Artis, plantenkas - 14, p. 75.

Coprinus fimetarius (L. ex Fr.) Fr. (*Coprinus cinereus*): begeleider

- champignon cultuur - 8, p. 46; Loosduinen, kassen - 3, p. 77;
 Wekerom (onzeker, nadere informatie) - 18, p. 34.
- Coprinus friesii* Quél., beschrijving & afb., standplaats - 8, p. 14-15;
 Oosterhout, "Oosterhout" (nadere informatie) - 18, p. 3;
 Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
- Coprinus fuscescens*: weinig belangrijke vorm van *Coprinus atramentarius*.
- Coprinus hemerobius*: zie *Coprinus plicatilis*.
- Coprinus impatiens* (Fr.) Quél.: Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 11, p. 43;
 20, p. 48.
- Coprinus lagopus* (Fr.) Fr.: habitustekening - 10, p. 22; Aerdenhout,
 "Naaldenveld" - 5, p. 41; Delden, "Twickel" - 12, p. 16;
 Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Wassenaar, "Raaphorst" - 18, p.
 9.
- Coprinus micaceus* (Bull. ex Fr.) Fr.: gebruik als voedsel - 1, p. 11;
 Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke
 Wandelweg - 8, p. 39; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56;
 Haarlem, stadstuin - 3, p. 11; Hengelo - 17, p. 42; Nieuw Beerta
 (onzeker) - 6, p. 15; Vogelenzang - 5, p. 93; *Coprinus niveus* (Pers.
 ex Fr.) Fr.: Rotterdam, Kralinger Hout - 16, p. 18; omgev. Rijswijk -
 11, p. 25.
- Coprinus patouillardii* Quél. (*Coprinus cordisporus*): Walcheren (waar?)
 5, p. 32.
- Coprinus phaeosporus* Karst.: Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
- Coprinus picaceus* (Bull. ex Fr.) Fr.: Deventer-Lochem, omgev. "'t Joppe"
 - 7, p. 23; Epse, Epser bos - 10, p. 41; Gorssel, "'t Amelte" en
 "'t Joppe" - 12, p. 20.
- Coprinus plicatilis* (Curt. ex Fr.) Fr. (*Coprinus hemerobius*): Amsterdam,
 Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Haarlem, stadstuin - 3, p. 11; De
 Vuursche - 13, p. 10.
- Coprinus radians* Desmaz.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.
- Coprinus stercorarius* (Bull. ex Fr.) Fr.: begeleider champignon cultuur -
 8, p. 46; Eindhoven, kas - 19, p. 63.
- Coprinus subtilis* (Fr.) sensu Ricken: Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 34.
- Corpinus tergiversans* (Fr.) Fr.: omgev. Bussum - 14, p. 77.
- Cordyceps capitata* (Holmskj. ex Fr.) Link: Dwingelo - 16, p. 46*; Gieten
 - 12, p. 17; Norg - 16, p. 46.

- Cordyceps militaris* (L. ex Fr.) Link: conidieënvorm is *Cephalosporium* spec., niet *Isaria farinosa* - 18, p. 44; parasiet op pop van *Agrotis pronuba* - 1, p. 30; omgev. Amersfoort - 2, p. 9-10; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; Maarn - 6, p. 37; omgev. Rijswijk - 11, p. 25; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
- Cordyceps ophioglossoides* (Ehrh. ex Fr.) Link: verschil t.o. *Geoglossum ophioglossoides* - 6, p. 84-85; parasiet op *Elaphomyces granulatus* - 13, p. 62; parasiet op *Elaphomyces cervinus* en *variegatus* - 6, p. 85; omgev. Amersfoort - 1, p. 63; Bloemendaal, "Wildhoef" - 1, p. 62; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Dwingelo - 16, p. 46*; omgev. Eindhoven - 15, p. 32; Gasselte - 6, p. 84; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; Norg - 16, p. 46; Oisterwijk, vennengebied 7, p. 47; Ulvenhout - 2, p. 45; Wassenaar, "Raaphorst" - 11, p. 65.
- Cordyceps ouwensii* v.Höhn.: vliegenparasiet - 7, p. 30.
- Cordyceps unilateralis* (Tul.) Sacc.: mierenparasiet - 7, p. 30.
- Corethromyces stilici* Thaxter: Hengelo - 16, p. 7*-8.
- Coriolus pubescens* (Schum. ex Fr.) Quél. (*Polyporus pubescens*): Bergen, staatsbossen - 11, p. 42; Schoorl, staatsbossen (onzeker) - 8, p.38.
- Coriolus versicolor* (L. ex Fr.) (*Polyporus versicolor*): gastheer van Quél. *Claudopus subdepluens* - 5, p. 86; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49; 5, p. 87; Wassenaar, "Voor Linden" - 18, p. 75.
- Corticium giganteum*: zie *Peniophora gigantea*.
- Cortinarius* (*Inoloma*) *albo-violaceus* (Pers. ex Fr.) Fr.: Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
- Cortinarius* (*Dermocybe*) *anomalus* (Fr. ex Fr.) Fr.: morchelloïde vorm - 11, p. 45*; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; omgev. Winterswijk - 11, p. 45.
- Cortinarius* (*Dermocybe*) *anthracinus* (Fr.) Fr.: Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4.
- Cortinarius* (*Telamonia*) *armillatus* (Fr.) Fr.: Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19; Lochem-Almen, "De Flesch" - 12, p. 19.
- Cortinarius* (*Telamonia*) *bibulus* Quél. (*Cortinarius pulchellus*): Heeze - 8, p. 37; 12, p. 31; 18, p. 2; Mook, Plasmolen, Groene Water - 12, p. 31; 18, p. 2; 20, p. 47; Mook, Plasmolen, Sprengen - 12, p. 31.
- Cortinarius* (*Telamonia*) *bivelus* (Fr. ex Fr.) Fr.: Overveen, "Elswout" - 5, p.

38.

- Cortinarius (Inoloma) bolaris (Pers. ex Fr.) Fr.: Amersfoort - 2, p. 12;
Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Ulvenhout - 2, p. 45.
- Cortinarius (Telamonia) bovinus Fr.: omgev. Hilversum - 9, p. 44; Utrecht,
Maliebaan - 17, p. 39.
- Cortinarius (Dermocybe) caninus (Fr.) Fr.: Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19;
Putten "Schovenhorst" (morchelloïde vorm) - 6, p. 60-61*; omgev.
Stroe (morchelloïde vorm) - 14, p. 64.
- Cortinarius (Hydrocybe) castaneus (Bull. ex Fr.) Fr.: Heelsum-Doorwerth
-13, p. 19.
- Cortinarius (Phlegmacium) cedretorum Maire: Doorwerth, "De Zalmen" -
13, p. 19, 34; 17, p. 37.
- Cortinarius (Dermocybe) cinnabarinus Fr.: Heelsum-Doorwerth - 13, p.19;
Wassenaar, "Duinrel" - 11, p. 65.
- Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus (L. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. C. cin-
namomeus var. croceus - 18, p. 47; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
- Cortinarius ("Dermocybe) cinnamomeus (L. ex Fr.) Fr. var. croceus
(Schaeff. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. C.cinnamomeus - 18, p. 47;
Bilthoven - 18, p. 47; Zeist - 18, p. 47.
- Cortinarius (Inoloma) cotoneus Fr., Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 56.
- Cortinarius (Phlegmacium) cristallinus Fr.: Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p.
5; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33.
- Cortinarius (Phlegmacium) croceo-caeruleus (Pers. ex Fr.) Fr.: verschil t.o.
Cortinarius porphyropus - 6, p. 48; Apeldoorn, "Berg en Bosch" -12,
p. 4; Oldeberkoop (nadere informatie) - 7, p. 34; Olterterp - 6, p. 38;
Overveen, "Elswout" - 5, p.38. Cortinarius (Inoloma) cyanites Fr.:
verschil t.o. Cortinarius violaceus - 6, p. 52.
- Cortinarius (Phlegmacium) decolorans (Pers. ex Fr.) Fr.: verschil t.o.
Cortinarius delibutus - 6, p. 51; verschil t.o. Cortinarius
porphyropus - 6, p. 48.
- Cortinarius (Myxacium) delibutus Fr.: beschrijving & afb. - 6, p. 50-51;
verschil t.o. Cortinarius decolorans, illibatus, pluvius, vibratilis - 8,
p. 51; Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Bergen, Uilenvangersweg - 6,
p.50; Castricum, Geversduin - 6, p. 57; Gieten- 6, p. 50; 9, p. 12; 12, p.
17; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p.29.
- Cortinarius (Myxacium) elatior Fr.: Gieten - 9, p. 12; Cortinarius
(Phlegmacium) emollitus Fr.: Hatert - 10, p. 37.

- Cortinarius (Phlegmacium) fulmineus (Fr.) Fr.: omgev. Bilthoven - 10, p. 40.
- Cortinarius (Telamonia) hemitrichus (Pers. ex Fr.) Fr.: Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19.
- Cortinarius (Phlegmacium) herpeticus Fr.: verschil t.o. Cortinarius scaurus - 6, p. 50.
- Cortinarius (Myxacium) illibatus Fr.: verschil t.o. Cortinarius delibutus - 6, p. 51.
- Cortinarius (Phlegmacium) infractus (Pers. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. Cortinarius scaurus - 6, p. 50; omgev. Amersfoort - 11, p. 48; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
- Cortinarius (Myxacium) mucosus (Bull. ex Fr.) Cooke: Heilo, Heiloër Bosch - 17, p. 30.
- Cortinarius (Phlegmacium) multiformis (Fr. ex Fr.): Baarn, "Groeneveld" - 19, p. 67; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
- Cortinarius (Phlegmacium) nemorensis (Fr.) Lange: Enschede, "Hooge Boekel" - 14, p. 9.
- Cortinarius (Dermocybe) orellanus Fr.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Enschede "Kromhof" - 9, p. 18; Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19; Oosterbeek-Laag - 13, p. 34.
- Cortinarius (Telamonia) paleaceus Fr.: Bilthoven, De Pan - 18, p. 7.
- Cortinarius (Dermocybe) phoeniceus (Bull. ex Fr.) Maire: verschil t.o. Cortinarius semisanguineus - 14, p. 9; Enschede, "Hof Espelo" - 14, p. 9.
- Cortinarius (Inoloma) pholideus (Fr. ex Fr.) Fr.: Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19.
- Cortinarius (Myxacium) pluvius (Fr.) Fr.: verschil t.o. Cortinarius delibutus - 6, p. 51.
- Cortinarius (Phlegmacium) porphyropus (Alb. et Schw. ex Fr.): beschrijving - 6, p. 48; verschil t.o. Cortinarius croceo-caeruleus, decolorans, purpurascens, subpurpurascens - 8, p. 48-49; Zuidlaren - 6, p. 48.
- Cortinarius (Myxacium) pseudo-salor Lange: Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.
- Cortinarius pulchellus Lange: zie Cortinarius bibulus.
- Cortinarius (Phlegmacium) purpurascens (Fr. ex Fr.) Fr. (C. purpurascens var.

- subpurpurascens, *C. subpurpurascens*): verschil t.o. *Cortinarius porphyropus* - 6, p. 49; Garderen - 7, p. 56.
- Cortinarius purpurascens* var. *subpurpurascens*: zie *Cortinarius purpurascens*.
- Cortinarius* (*Myxacium*) *salor* Fr.: Doorwerth - 13, p. 34.
- Cortinarius* (*Phlegmacium*) *scaurus* (Fr. ex Fr.) Fr.: beschrijving & afb., 6, p. 49; verschil t.o. *Cortinarius infractus*, *herpeticus* - 6, p. 50; Anloo, Kniphorst - 6, p. 50; Olterterp - 6, p. 38, 50.
- Cortinarius* (*Dermocybe*) *semisanguineus* (Fr.) Gill.: verschil t.o. *Cortinarius phoeniceus* - 14, p. 9; Dwingelo (*teratologica*) - 19, p. 13-14*; Hilversum Baarn - 13, p. 19; Maarn (*teratologica*) - 6, p. 37*; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Cortinarius subpurpurascens*: zie *Cortinarius purpurascens*.
- Cortinarius* (*Inoloma*) *tophaeus* Fr.: Ter Apel - 2, p. 53.
- Cortinarius* (*Telamonia*) *torvus* (Fr. ex Fr.) Fr.: Epse, Epser bos of Gorssel, "t Hassink" - 12, p. 20; Ulvenhout - 2, p. 45.
- Cortinarius* (*Phlegmacium*) *triumphans* Fr.: Walcheren (waar?) - 5, p. 31.
- Cortinarius* (*Myxacium*) *vibratilis* (Fr.) Fr.: verschil t.o. *Cortinarius delibutus* - 6, p. 51; Olterterp - 6, p. 38; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.
- Cortinarius* (*Inoloma*) *violaceus* (L. ex Fr.) Fr.: beschrijving - 6, p. 51; verschil t.o. *Cortinarius cyanites* - 6, p. 52; Appelsga - 6, p. 51.
- Coryne sarcoides* (Jacq. ex Fr.) Tul.: omgev. Aalst - 14, p. 60; Wassenaar, "Duinrel" - 12, p. 48; 14, p. 32.
- Craterellus cornucopioides* (L. ex Fr.) Pers.: omgev. Amersfoort (?) - 2, p. 12; omgev. Denekamp - 4, p. 76; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Gieten - 6, p. 56; 7, p. 34 (nadere informatie); 9, p. 11*; 12, p. 17; Heerde, Wapenvelde - 4, p. 76; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 13, p. 29, 34; 20, p. 48; Putten, Solsche Gat - 12, p. 31.
- Craterellus lutescens* (Pers. ex Fr.) Fr. (*Cantharellus lutescens*): Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 7.
- Craterellus sinuosus* (Fr.) Fr.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; Epse, Epser bos of Gorssel, "t Hassink" - 12, p. 20; Gieten - 9, p. 11; 12, p. 17; omgev. De Lutte - 10, p. 36; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10.

- Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél. (*Cantharellus infundibuliformis*, *Cantharellus tubaeformis*): omgev. Amersfoort - 2, p. 12; Beekhuizen - 5, p. 40; omgev. Chaam - 6, p. 35; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; omgev. De Lutte - 10, p. 36; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; omgev. Nijmegen - 6, p. 22; Olterterp - 7, p. 35.
- Crepidotus calolepis* (Fr.) Karst: Druten, Leuven - 9, p. 39.
- Crepidotus mollis* (Bull. ex Fr.) Quél.: Wassenaar, "Duinrel" - 12, p. 48.
- Crepidotus phillipsii* (Berk. et Fr.) Sacc.: Beuningen (nadere informatie) - 6, p. 57.
- Crinipellis stipitaria* (Fr.) Pat. (*Marasmius stipitarius*): voorkomen op *Ammophila arenaria* en *Festuca rubra* - 15, p. 15; voorkomen op andere substraten - 16, p. 34; Wassenaar, "Duinrel" - 15, p. 15; Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78; 15, p. 15.
- Cronartium ribicola* Diet.: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 40.
- Crucibulum vulgare* Tul.: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; Rozenburg, De Beer - 2, p. 65; De Vuursche Lage Vuursche - 8, p. 31.
- Cudoniella aquatica* (Lib.) Sacc. (N.B. waarschijnlijk identiek met *Ombrophila clavus*): Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 20, p. 47.
- Cyathicula coronata* (Bull. ex Karst.) De Not.: Velp - 12, p. 42.
- Cyathicula lepidula* March. (*Peristomialis lepidula*): Mook, Plasmolen, Hellekuil - 12, p. 43; 13, p. 34; 20, p. 48; Mook, Plasmolen, Sprengen - 13, p. 34.
- Cyathicula marchantiae* (Sommerf.) Sacc. (*Peristomialis marchantiae*): Mook, Plasmolen - 12, p. 7, 43; 13, p. 34; 17, p. 36; 20, p. 48; Venraay - 17, p. 36.
- Cyathipodia corium*: zie *Paxina corium*.
- Cyathus olla* (Batsch ex) Pers.: habitustekening - 10, p. 22; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30; Zuid-Beveland, Kaloot - 20, p. 71.
- Cyathus striatus* Willd. ex Pers.: De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
- Cylindrium flavo-virens* (Ditm.) Bon.: Warmond, "Huis te Warmond" - 2, p. 66.

- Cylindrocolla urticae* (Pers.) Bon.: beschrijving - 18, p. 30; Wageningen - 18, p. 30.
- Cyphella ampla*: zie *Cytidia flocculenta*.
- Cyphella capula* (Holmskj. ex) Fr.: waardplanten - 9, p. 54; Haren, Hortus Bot. - 9, p. 54-55*; Hengelo (nadere informatie) - 14, p. 9; omgev. Rijswijk - 11, p. 25.
- Cyphella muscigena* Fr. sensu Burt.: omgev. Nijmegen - 6, p. 22.
- Cystoderma amianthinum* (Scop. ex Fr.) Fayod (*Lepiota amianthina*); 's-Gravenhage "Meer en Bosch: - 8, p. 30; Hilversum-Baarn - 13, p. 19. *Cystoderma amianthinum* (Scop. ex Fr.) Fayod var *longisporum* (Kühner) Smith et Sing. (*Lepiota amianthina* var. *longispora*): Wouwsche Plantage - 9, p. 51.
- Cystoderma carcharias* (Pers. ex Secr.) Fayod. (*Lepiota carcharias*): Gieten (nadere informatie) - 7, p. 34; Gorssel, "t Amelte" - 12, p. 20; Hooge Vuursche, Blauwe Koepel (onzeker) - 6, p. 25; Maarn - 6, p. 37; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
- Cystoderma cinnabarinum* (Alb. et Schw. ex Secr.) Fayod (*Lepiota cinnabarina*): Gorssel, "t Joppe" - 12, p. 20; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Paterswolde, "De Braak" (vermoedelijk, nadere informatie), 7, p. 34.
- Cystoderma granulosum* (Batsch ex Fr.) Fayod var. *adnatifolium* (Peck) Smith et Sing. (*Lepiota adnatifolia*): vindpl. niet meer bekend (nadere informatie) - 9, p. 51.
- Cytidia flocculenta* (Fr.) v.H. et L. (*Cyphella ampla*): voorkomen op dode populierentakken - 9, p. 55*-56; 19, p. 24; duinen A'damse Waterleiding - 5, p. 41; Vogelenzang, A.W. duinen (nadere informatie); 9, p. 56; Voorne, duinen bij Rockanje - 19, p. 24.
- Dactylaria brochopaga*: zie *Dactylella brochopaga*.
- Dactylella brochopaga* (Drechsler) Drechsler (*Dactylaria brochopaga*): Nematode-vangend apparaat - 17, p. 59*.
- Dactylella ellipsospora* (Preuss) Grove: Nematode-vangend apparaat - 17, p. 59*.
- Daedalea biennis*: zie *Heteroporus biennis*.
- Daedalea poetschii*: zie *Gloeophyllum trabeum*.
- Daedalea quercina* (L. ex) Fr.: verschil t.o. *Trametes gibbosa* - 8, p. 41*; voorkomen op eiken dwarsliggers - 6, p. 44; omgev. Aalst - 14, p. 60; Wekerom-Harskamp (nadere informatie) - 18, p. 34.

- Daedaleopsis confragosa* (Bolt. ex Fr.) Schroet.: habitustekening - 10, p. 10.
- Daedaleopsis confragosa* (Bolt. ex Fr.) Schroet. f. *rubescens* (Alb. et Schw. ex Fr.) Donk: omgev. Tilburg - 11, p. 62.
- Daldinia concentrica* (Bolt. ex Fr.) Ces. et De Not.: beschrijving & afb. - 16, p. 5-6; verschil t.o. *Daldinia vernicosa* - 16, p. 5; diverse waardplanten - 16, p. 5; Bennekom - 19, p. 23; Epen - 17, p. 64; Heemstede - 16, p. 4; Heeze-Someren, Beuven - 17, p. 64; Oisterwijk Campinaheide - 19, p. 64; Rijswijk, Rijswijkse bos - 16, p. 4; omgev. Valkenswaard - 3, p. 48; Wormerveer - 16, p. 4.
- Daldinia vernicosa* (Schw.) Ces. et De Not.: verschil t.o. *Daldinia concentrica* - 16, p. 5.
- Darluca filum* (Biv.) Cast.: parasiet op *Puccinia magnusiana* - 20, p. 51*; Wageningen, Grift - 20, p. 51.
- Deconica bullacea* (Bull. ex Fr.) Karst. (*Psilocybe bullacea*): De Steeg, "Middachten" - 8, p. 40.
- Deconica coprophila* (Bull. ex Fr.) Karst. (*Psilocybe coprophila*): Delden, "Twickel" - 12, p. 16; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30, 40.
- Deconica crobula* (Fr.) Romagn. (*Naucoria crobula*): Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7-8.
- Deconica physaloides* (Bull. ex Fr.) Karst. (*Psilocybe physaloides*): Domburg (nadere informatie) - 8, p. 29; Ginneken - 12, p. 47; Loosduinen "Ockenburg" - 5, p. 93; Oostkapelle (nadere informatie) - 8, p. 29.
- Delicatula(?) gibba* (Alb. et Schw. ex) Pat. (*Omphalia gibba*): Naardermeer (nadere informatie) - 18, p. 3.
- Delicatula integrella* (Pers. ex Fr.) Pat. (*Omphalia integrella*): Breukelen, Weersloot - 19, p. 23; Mook, Plasmolen, Hellekuil (nadere informatie): - 18, p. 3.
- Dermocybe*: subgenus van *Cortinarius*.
- Desmazierella acicola* Lib.: korte beschrijving - 19, p. 32; conidiale stadium is *Verticicladium* cf. *acuum* Oudem. - 19, p. 34-35; omgev. Eindhoven - 17, p. 35; 19, p. 64 (nadere informatie): Gilze (nadere informatie) - 19, p. 64; Hatert, Hatertse vennen - 12, p. 75; 13, p. 34; 19, p. 32; Nunhem (nadere informatie) - 19, p. 64; Oirschot - 19, p. 32; Overasselt - 14, p. 52; Overasselt, "Diervoort" - 12, p. 74; 13, p. 38; Rhenen - 12, p. 74; 19, p. 32; Tegelen - 13, p. 34; 19, p. 32; Veere - 12, p. 74; 19, p. 32; Venraay - 13, p. 34; 19, p. 32; Wageningen - 19,

- p. 32.
- Dichomyces princeps* Thaxter: habitustekeningen - 12, p. 77;14, p. 58.
- Dichomyces vulgatus* Thaxter: habitustekening - 14, p. 58.
- Dictyolus lobatus* (Pers. ex Fr.) Quél.: Overasselt - 10, p. 37; vindplaats onbekend, nieuw voor de flora - 6, p. 7.
- Dictyolus retirugus* (Bull. ex Fr.) Quél., 's-Gravenhage, duinstreek - 13, p. 14; Staverden (onzeker) - 13, p. 14.
- Dictyophora duplicata* (Bosc) Ed. Fischer: beschrijving - 10, p. 48-49*; 11, p. 46; ontwikkeling in ei-stadium - 11, p. 49-53; Bergen (vrij onzeker) - 11, p. 34; 's-Gravenhage - 11, p. 33, 34; 's-Gravenhage omgev. "Clingendaal" - 11, p. 46; Loosduinen, "Ockenburg" - 11, p. 8-9*, 32; IJmuiden, 1e sluis (vrij zeker) - 11, p. 33-34.
- Discina radiculata* var. *percevali*: zie *Sarcoscypha radiculata* var. *percevalii*.
- Discina venosa*: zie *Disciotis venosa*.
- Discina venosa* var. *reticulata*: ouderdomsvorm van *Disciotis venosa*.
- Disciotis venosa* (Pers. ex Fr.) Boud. (*Discina venosa* en var. *reticulata*): Gronsveld, Schöne Grub - 20, p. 1*; Oosterhout, "Oosterhout" - 11, p. 43; 13, p. 42; Valkenburg, Sibbergroeve - 13, p. 34.
- Disciseda bovista* (Klotsch) Kambly (*Disciseda cervina*): beschrijving & afb. - 10, p. 56-57; Wassenaar, Meiendel - 10, p. 55; 18, p. 8*-9; Wassenaar, Meiendel, Kijfhoek - 18, p. 9; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9, 76.
- Disciseda cervina*: zie *Disciseda bovista*.
- Dochniopus variabilis* (Pers. ex Fr.) Pat. (*Claudopus variabilis*): verschil t.o. *Pleurotus mitis* - 5, p. 73; Tilburg - 11, p. 62.
- Dothidella ulmi* (Duv.) Wint.: ascospore-vorm van *Piggotia astroidea* - 19, p. 9*.
- Drosella irrorata* (Quél.) Kühner et Maire (*Lepiota irrorata*): Deventer-Lochem, omgev. "t Joppe" - 7, p. 23; Gorssel - 9, p. 51; Oostkapelle, "Westhoven" - 5, p. 31; 8, p. 29 (nadere informatie); 9, p. 51 (nadere informatie).
- Dryodon erinaceus*: zie *Hericium erinaceum*.
- Èccilia cancrina* (Fr.) Ricken (*Rhodophyllus cancrinus*): beschrijving - 20, p. 69-70; Zuid-Beveland, Kaloot - 20, p. 69; Zwolle, Spoolderpark - 20, p. 69.
- Eccilia carneo-alba* (With. ex Fr.) Ricken: Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9,

- p. 39; 20, p. 47; Swalmen "Hillenraedt" - 10, p. 28.
- Eccilia griseo-rubella* (Lasch) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Rotterdam, Kralingerhout - 16, p. 18.
- Eccilia nigella* Quél. (N.B. *nigrella* is onjuiste verandering) (*Rhodophyllus nigellus*): beschrijving & afb. - 8, p. 13-14; Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 13.
- Eccilia rhodocylix* (Lasch) Gill. (*Rhodophyllus rhodocylix*: N.B. *rhodocalyx* is een verschrijving): Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Assen, Asser bos - 13, p. 6-7*; Olterterp - 6, p. 38.
- Eccilia undata* (Fr.) Big. et Guill. (*Rhodophyllus undatus*): Oostkapelle, "Berkenbosch" - 8, p. 14*; 8, p. 29 (nadere informatie).
- Eccilia vilis* (Fr.) Ricken (*Rhodophyllus vilis*): Doetinchem, "Slangenburger" - 7, p. 55; Lunteren - 14, p. 66.
- Elaphomyces cervinus*: zie *Elaphomyces leucocarpus*.
- Elaphomyces granulatus*: zie *Elaphomyces leucocarpus*.
- Elaphomyces leucocarpus* Vitt. (*Elaphomyces cervinus*, *E. granulatus*): gastheer van *Cordyceps capitata* - 16, p. 46; gastheer van *Cordyceps ophio-glossoides* - 1, p. 62; 6, p. 85; Bloemendaal, "Wildhoeft" - 1, p. 62; omgev. Eindhoven - 15, p. 32; Eindhoven, Oirschotse dijk - 17, p. 64; Norg - 16, p. 48; Oisterwijk, vennengebied - 7, p. 47.
- Elaphomyces muricatus*: zie *Elaphomyces variegatus*.
- Elaphomyces variegatus* Vitt. (*Elaphomyces muricatus*): gastheer van *Cordyceps capitata* - 16, p. 46; gastheer van *Cordyceps ophioglossoides* - 2, p. 45; 6, p. 85; Dwingelo - 16, p. 46; Ulvenhout - 2, p. 45.
- Empusa muscae*: zie *Entomorphora muscae*.
- Empusa spec.*: habitus en microscop. tekeningen - 10, p. 58.
- Entoloma ameides* (Berk. en Br.) Sacc.: Bergen - 1, p. 56; omgev. Hilversum - 9, p. 44.
- Entoloma clypeatum* (L. ex Fr.) Quél.: Aerdenhout - 5, p. 18; Amsterdams Hortus Botanicus - 17, p. 25; Bloemendaal, Kraantjelek - 17, p. 25; omgev. Haarlem - 5, p. 18, 93; Hooge Vuursche, Blauwe Koepel - 6, p. 25; Wassenaar, Meiendel - 12, p. 79.
- Entoloma costatum* (Fr.) Gill.: Loosduinen, Kleiweg (nadere informatie) - 6, p. 68.
- Entoloma jubatum* (Fr.) Karst. (*Rhodophyllus jubatus*): Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 14, p. 54*-55.

- Entoloma lividum* (Bull. ex Fr.) Quél.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46; Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 56.
- Entoloma nidorosum* (Fr.) Quél.: Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
- Entoloma nitidum* Quél.: Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 40; Gieten - 9, p. 12; 12, p. 17; Olterterp - 6, p. 38.
- Entoloma porphyrophaeum* (Fr.) Karst. (*Rhodophyllus porphyrophaeus*): Eindhoven, Kanunnekes ven - 19, p. 64.
- Entoloma rhodopolium* (Fr.) Quél. (*Rhodophyllus rhodopolium*): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
- Entoloma sericeum* (Bull. ex Fr.) Quél.: Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Hooge Vuursche, Blauwe Koepel - 6, p. 24; Wassenaar, "Duinrel" - 7, p. 78.
- Entoloma speculum* (Fr.) Quél.: omgev. Heeze - 8, p. 37.
- Entoloma sphagneti* Naveau (*Rhodophyllus sphagneti*): beschrijving & afb. - 18, p. 51-52 (als *Entoloma spec.*): Hatert, Hatertse vennen - 15, p. 11 (als *Entoloma spec.*): 18, p. 34; 18, p. 51 (als *Entoloma spec.*): 19, p. 10.
- Entomophthora muscae* (Cohn) Fresen. (*Empusa muscae*): beschrijving & afb. - 10, p. 59-60.
- Erinella nylanderii* Rehm: beschrijving & afb. - 18, p. 27-28.
- Euzodiomyces lathrobii* Thaxter: habitustekening - 14, p. 71.
- Exidia glandulosa* Fr.: Amersfoort - 2, p. 12; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 32; Wassenaar, Meiendel - 2, p. 66.
- Exidia saccharina* Fr. (*Ulocolla saccharina*): Zeist, Zeister bos - 6, p. 57.
- Exidia truncata* Fr.: Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 6, p. 22.
- Fistulina hepatica* (Huds. ex Fr.): histologie & afb. 8, p. 58-63; invloed op kernhout van eiken - 10, p. 19-21; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; 's-Gravenhage, "Clingendaal" - 11, p. 65; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 78.
- Flammula astragalina* (Fr.) Quél.: Anloo (nadere informatie) - 7, p. 34; Olterterp - 6, p. 38; omgev. Oosterwolde - 5, p. 41.
- Flammula carbonaria* (Fr.) Quél.: veldkenmerk splijting van lamel - 13, p. 38; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7; Epse, Epser bos - 7, p. 9, 22: 10, p. 41; Epse, Epser bos of Gorssel, "t Hassink" - 12, p. 20; Haren, Hortus Bot. - 10, p. 39; Heeze

- (nadere informatie) - 17, p. 45; Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35;
 Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29;
 Valkenswaard, Beuven en visvijvers (nadere informatie) - 17, p. 45;
 Wassenaar, Meiendel - 13, p. 15.
- Flammula conissans* (Fr.) Gill.: Amerongen - 7, p. 35.
- Flammula flavida* (Schaeff. ex Fr.) Quél.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" -17, p. 8; Beiden, "Twickel" - 9, p. 18-19*; Valkenburg, Vogelsbosch -10, p. 29.
- Flammula fulgens* (Favre et Maire) Kühner (*Naucoria fulgens*):
 beschrijving - 19, p. 63; Eindhoven, Kanunnekesven - 19, p. 64;
 Hatert, Hatertse vennen - 10, p. 63; 11, p. 43.
- Flammula gummosa* (Lasch) Quél.: verschil t.o. *Flammula ochrochlora* - 2, p. 52; Amsterdam, Vondelpark - 7, p. 60; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Ter Apel - 2, p. 52; Epse, Epser bos of Gorssel, "t Hassink" - 12, p. 20; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 6, p. 22; Olterterp - 6, p. 38; Paterswolde "De Braak" (vermoedelijk, nadere informatie) - 7, p. 34; Rijswijk - 9, p. 46; omgev. Winterswijk - 11, p. 17.
- Flammula gymnopodia* (Bull. ex Fr.) Quél.: omgev. Amersfoort - 11, p. 48.
- Flammula henningsii* Bres.: beschrijving & afb. - 19, p. 30-31; oecologische gegevens - 19, p. 31; omgev. Eindhoven - 19, p. 31; Eindhoven, Kanunnekesven - 19, p. 63; Vinkeveen, Botshol (vermoedelijk) - 19, p.31.
- Flammula hybrida* (Fr. ex Fr.) Gill.: Texel, staatsbossen - 6, p. 55;
 Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87.
- Flammula lenta* (Pers. ex Fr.) Gill.: Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Epse, Epser bos of Gorssel, "t Hassink" - 12, p. 20; Olterterp - 6, p. 38; omgev. Oosterwolde - 5, p. 41; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23; Wassenaar, "Rust en Vreugd" - 7, p. 35.
- Flammula liquiritiae* (Pers. ex Fr.) Quél.: habitustekening - 10, p. 22.
- Flammula lubrica* (Pers. ex Fr.) Quél. (non Ricken, nec Bres. = *F. lenta*):
 Epse, Epser bos (onzeker) - 10, p. 41.
- Flammula lupina* (Fr.) Ricken: Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.
- Flammula muricella* (Fr.) Quél., (?*Naucoria pityrodes*): Geldermalsen - 10, p. 37; 18, p. 3.
- Flammula ochrochlora* (Fr.) Sacc.: beschrijving - 2, p. 52; verschil t.o.

- Flammula gummosa - 2, p. 52; Ter Apel - 2, p. 52.
- Flammula penetrans (Fr.) Quél. sensu Lange (non Bres. = F. hybrida): Delden, "Twickel" - 5, p. 41.
- Flammula sapinea (Fr.) sensu Quél.: Bilthoven, De Pan - 18, p. 7.
- Flammula scamba (Fr.) Sacc.: Heelsum, omgev. Heelsumsche beek - 13, p. 19.
- Flammula spumosa (Fr.) Karst.: Nijmegen, emplacement - 12, p. 30; Wassenaar (misschien Meiendel) - 1, p. 35.
- Fomes annosus (Fr.) Cooke: gastheren & parasitaire invloed - 7, p. 25.
- Fomes applanatus: zie Ganoderma applanatum.
- Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Gill. (Polyporus fomentarius): vegetatie-foto - 10, p. 33, 35; gebruik & economische betekenis - 10, p. 32-35, 45-48; sporenproductie - 10, p. 65; Eefde - 3, p. 48; 10, p. 46; De Steeg, "Middachten" - 5, p. 60; 10, p. 46; Wekerom (onjuiste determinatie, zie Ganoderma applanatum, nadere informatie) - 18, p. 34.
- Fomes lucidus: zie Ganoderma lucidum.
- Fomes obliquus: zie Inonotus obliquus.
- Fomes pinicola (Sw. ex Fr.) Cooke (Polyporus unguulatus): Delden, "Twickel" - 12, p. 32; Ruurlo(?) - 12, p. 32; Utrecht, Gronekan - 12, p. 32.
- Fomes robustus, duindoornvorm: zie Ochroporus robustus f. hippophaës.
- Fuligo septica (L.) Gmel. (Myxomycetes): Wageningen, Wageningsche berg - 5, p. 91.
- Galactinia ampelina (Quél.) Boud.: Beesd, Mariënweerd - 19, p. 64; Gronsveld, Schöne Grub - 19, p. 63.
- Galactinia badia (Pers. ex Fr.) Boud. (Peziza badia): Anloo, Kniphorst (nadere informatie) - 6, p. 21*; omgev. Chaam - 6, p. 35; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46.
- Galactinia brunneo-atra (Desmaz.) Boud. (Peziza brunneo-atra): omgev. Eindhoven - 18, p. 34.
- Galactinia ionella (Quél.) Boud. (?Peziza gerardi Cooke): Doetinchem, "Slangenburger" - 7, p. 56; 12, p. 43.
- Galactinia limosa (Grelet) Le Gal et Romagn.: Best - 19, p. 64; Geldermalsen - 18, p. 4.
- Galactinia plebeia Le Gal: Doetinchem, "Slangenburger" - 15, p. 11; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.
- Galactinia praetervisa (Bres.) Boud. (Aleuria praetervisa): Epse, Epser bos

- 7, p. 56.
- Galactinia succosella* Le Gal et Romagn.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.
- Gallen: afb. 15, p. 31; schimmel in inwendige - 18, p. 32.
- Galera graminea*: zie *Galerina graminea*.
- Galera hypnorum*: zie *Galerina hypnorum*.
- Galera hypnorum* f. *calyptospora*: zie *Galerina hypnorum* f. *calyptospora*.
- Galera lateritia*: zie *Conocybe lateritia*.
- Galera mycenopsis*: zie *Galerina mycenopsis*.
- Galera paludosa*: zie *Galerina paludosa*.
- Galera pygmaeo-affinis*: waarschijnlijk is alles wat als zodanig werd gedetermineerd *Conocybe rickenii*.
- Galera ravida*: zie *Conocybe appendiculata*.
- Galera sparteae*: zie *Conocybe sparteae*.
- Galera sphagnorum*: zie *Galerina sphagnorum*.
- Galera spicula*: zie *Conocybe spicula*.
- Galera tenera*: vermoedelijk bedoeld sensu Ricken, zie *Conocybe pubescens*.
- Galera vittaeformis*: zie *Galerina rubiginosa*.
- Galerina camerina* (Fr. sensu Quél.) Kühner (of beter: *Galerina pseudo-camerina* Sing.?) verschil t.o. *Galera hypnorum* - 13, p. 6-7*; Assen, Asser bosch - 13, p. 6.
- Galerina graminea* (Vel.) Kühner (*Galera graminea*): Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
- Galerina hypnorum* (Schränk ex Fr.) Kühner (*Galera hypnorum*): verschil t. o. *Galera vittaeformis* - 6, p. 65; verschil t.o. *Galerina camerina* - 13, p. 6-7; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.
- Galerina hypnorum* (Schränk ex Fr.) Kühner f. *calyptospora* (Kühner) Kühner (*Galera hypnorum* f. *calyptospora*): omgev. Wijster, biol. Station - 12, p. 60.
- Galerina marginata* (Batsch ex Fr.) Kühner (*Pholiota marginata*): beschrijving & afb. 12, p. 28-30; Gorssel, "'t Ameite" - 12, p. 20; Mook, 11, p. 40.
- Galerina muricellospora* (Atk.) Kühner (2-sporige vorm van *Galerina rubiginosa*?): Overasselt - 10, p. 37.
- Galerina mycenoides* (Fr. sensu Jaap) Kühner (*Pholiota mycenoides*):

- Beugen, kruispunt - 9, p. 39; omgev. Eindhoven - 19, p. 64; Epse, Epser bos - 10, p. 41; Hondsrug (waar?) - 6, p. 6-7; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 59.
- Galerina mycenopsis* (Fr. sensu Ricken) Kühner (*Galera mycenopsis*): Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
- Galerina nana* (Petri) Kühner: microscop. kenmerken & afb. - 13, p. 31-32; Baarn, "Groeneveld" - 13, p. 31-32; Hengelo, kas (nadere informatie) - 13, p. 38; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39; 20, p. 47.
- Galerina paludosa* (Fr.) Kühner (*Galera paludosa*): omgev. Krommenie (onzeker, nadere informatie) - 17, p. 43; omgev. Wijster - 12, p. 10.
- Galerina rubiginosa* (Pers. ex Fr.) Kühner (*Galera vittaeformis* sensu Ricken): beschrijving & afb 6, p. 64, 66; verschil t.o. *Galera pygmaeo-affinis*, *tenera*, *spicula*, *spartea*, *hypnorum* - 6, p. 65; Gasselte, Drouwenerzand - 6, p. 64.
- Galerina sphagnorum* (Pers. ex Fr. sensu Atk.) Kühner (*Galera sphagnorum*): Heelsum, omgev. Heelsumsche beek - 13, p. 19; omgev. Krommenie (onzeker, nadere informatie) - 17, p. 43.
- Galerina stagnina* (Fr.) Kühner: Assel - 10, p. 37.
- Galerina tibiicystis* (Atk.) Kühner: omgev. Wijster - 12, p. 9.
- Galerina uncialis* (Britz.) Kühner: Oosterhout - 10, p. 37.
- Galerina unicolor* (Vahl ex Fr.) Sing. (*Pholiota unicolor*): Texel, staatsbossen - 7, p. 49.
- Ganoderma applanatum* (Pers. ex Wahr.) Pat. (*Polyporus applanatus*): vegetatiefoto - 10, p. 47; sporenproductie - 10, p. 65; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 6, p. 38; Heere, Kasteellaan - 14, p. 33; Ruurlo, "Kleine Meene" - 12, p. 76, Wekerom (foutief als *Fomes fomentarius*, nadere informatie) - 18, p. 34.
- Ganoderma lucidum* (Leyss. ex Fr.) Karst. (*Polyporus lucidus*): Ruurlo, "Kleine Meene" - 12, p. 76; Tilburg - 11, p. 62.
- Ganoderma resinaceum* Boud.: beschrijving & afb. - 16, p. 32-33; Nigtevecht - 16, p. 32.
- Gautieria graveolens* Vitt.: Baarn, "Pijnenburg" - 18, p. 47; omgev. Bilthoven - 10, p. 40.
- Geaster: zie *Geastrum*.

- Geaster hygrometricus*: zie *Astraeus hygrometricus*.
- Geastrum badium* Pers.: Wassenaar, Meiendel - 10, p. 55.
- Geastrum coronatum* Pers.: verschil t.o. *Geastrum schaefferi* - 12, p. 11-12; oecologie - 6, p. 86; Amsterdam, Tuindorp - Watergraafsmeer - 12, p. 78.
- Geastrum minimum* Schw. (non Chev.): oecologie - 6, p. 86; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Terschelling, omgev. Hoorn- 20, p. 18.
- Geastrum nanum* Pers.: afwijking met 2 peristomen - 14, p. 49; afwijking met triplex-kraag - 7, p. 57*; Huizen, haven - 10, p. 40; omgev. Oisterwijk - 11, p. 62, Vogelenzang - 5, p. 67; Vogelenzang, A.W. duinen - 7, p. 57; Wassenaar, Meiendel - 10, p. 55; Wassenaar, Meiendel, Kijfhoek -14, p. 49.
- Geastrum pectinatum* Pers.: oecologie - 6, p. 86.
- Geastrum quadrifidum* Pers.: oecologie - 6, p. 86.
- Geastrum rufescens* Pers.: oecologie - 6, p. 86; afwijking met pseudo-peristomen - 7, p. 57*-58; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; Voorne, duinen Rockanje - 19, p. 24; Wijk aan Zee, "Rooswijk" - 7, p. 57.
- Geastrum saccatum* Fr.: oecologie - 6, p. 86; Aerdenhout - 4, p. 47; Vogelenzang - 4, p. 47; 5, p. 67.
- Geastrum schaefferi* Vitt.: verschil t.o. *Geastrum coronatum* en *G. triplex* - 12, p. 11-12; Bergen - 12, p. 11.
- Geastrum striatum* D.C.: oecologie - 6, p. 86; Amsterdam Kruislaan, Tuindorp-Watergraafsmeer, Zuidelijke Wandelweg - 12, p. 78; omgev. Haarlem, duinen - 6, p. 86; Nieuwer Amstel - 12, p. 78; Voorne, duinen Rockanje - 19, p. 24.
- Geastrum triplex* Jungh.: maten en bijzonderheden - 6, p. 12; verschil t. o. *Geastrum schaefferi* - 12, p. 11; oecologie - 6, p. 86; afwijking met dubbel peristoom - 7, p. 7-8*; afwijking met langwerpige peristoom - 11, p. 26; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 11, p. 26; Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats, Tuindorp-Watergraafsmeer, Zuidelijke Wandelweg -12, p. 78; Amsterdamse Waterleidingduinen - 6, p. 12; 7, p. 7; Bilthoven, Panbos - 19, p.23; Haarlem, duinen - 7, p. 8; Nieuwer Amstel - 12, p. 78; Olterterp - 6, p. 38, 56; 7, p. 35; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 41;

- Overveen, "Elswout" - 4, p.47; Vogelenzang - 5, p. 67; 10, p. 24;
 Voorne, duinen Rockanje - 19, p. 24.
- Geoglossum affine (Dur.) Lloyd (Gloeoglossum affine): beschrijving & afb.
 - 20, p. 68-69; Hatert, "Diervoort" - 19, p. 18 (als Geoglossum spec.):
 20, p. 68.
- Geoglossum cookeianum Nannf: abusievelijk gebruikt G.ophioglossoides,
 is synoniem van G. glabrum, niet van G. cookeianum - 20, p. 67.
- Geoglossum glabrum Pers. ex Fr. (Geoglossum ophioglossoides); verschil
 t. o. Cordyceps ophioglossoides - 6, p. 84*-85; Eindhoven - 7, p. 46;
 omgev. Eindhoven - 15, p. 32; Gasselte - 6, p. 84; Gorssel, "t
 Amelte" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hatert - 19,
 p. 18; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Naardermeer -12, p. 39.
- Geoglossum glutinosum Pers. ex Fr.: Haren, Hortus "De Wolf" - 20,
 p. 67; Hatert - 19, p. 18; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.
- Geoglossum hirsutum: zie Trichoglossum hirsutum.
- Geoglossum ophioglossoides: zie Geoglossum glabrum.
- Geoglossum viride: zie Microglossum viride.
- Geoglossum spec.: blijkt te zijn Geoglossum affine - 19, p. 18; 20, p. 68-69.
- Geopyxis ammophila (Dur. et Lév.) Sacc.: beschrijving & afb, - 5, p. 64-65;
 Egmond aan Zee - 5, p. 64; Noord-Oostpolder - 18, p. 34; Texel, De
 Koog - 5, p. 64; Voorne, duinen Rockanje -19, p. 24; Wassenaar,
 Meiendel -5, p. 64; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9.
- Geopyxis carbonaria (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc.: Boxtel-Best,
 "Veldersbosch" - 17, p. 8; Epse, Epser bos - 7, p. 10, 22.
- Geopyxis cupularis (L. ex Fr.) Sacc.: omgev. Rijswijk (onzeker) - 11,
 p. 25.
- Gloeoglossum affine: zie Geoglossum affine.
- Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) Karst. (Lenzites sepiaria): Nieuw-
 Beerta - 6, p. 32; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
- Gloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murr. (Daedalea poetschii): Kootwijk
 - 9, p. 39.
- Gomphidius glutinosus (Schaeff. ex Fr.) Fr.: Dwingelo (nadere informatie)
 - 16, p. 46; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11;
 Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; omgev. Rijssen - 12, p. 14;
 Wassenaar, "Raaphorst" - 11, p. 65; Wouwsche Plantage - 1, p. 53.
- Gomphidius roseus (Fr.) Karst.: groeiwijze - 3, p. 79; associatie met
 Boletus bovinus - 3, p. 79; 5, p. 60; omgev. Amersfoort - 3, p. 79;

- Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Baarn, "Buitenzorg" - 6, p. 24; Bergen-Schoorl - 5, p. 60; 9, p. 29; Borger - 6, p. 88*-89; omgev. Bussum - 5, p. 40; omgev. Chaam - 6, p. 35; Lheebroek, Lheebroekerzand (nadere informatie) - 16 p. 46; Lunteren-Ede - 12, p. 31; Maarn - 6, p. 37; omgev. Rijssen - 12, p. 14; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
- Gomphidius rutilus* (Schaeff. ex Fr.) Lundell et Nannf. (*Gomphidius viscidus*): Gorssel, "'t Amelte" - 12, p. 20; omgev. Rijssen - 12, p. 14.
- Gomphidius viscidus*: zie *Gomphidius rutilus*.
- Graphium ulmi* Schwartz: ongeslachtelijke vorm van *Ceratostomella ulmi* - 3, p. 77-78.
- Gyrodon lividus* (Bull. ex Fr.) Sacc.: diagnose - 18, p. 18; Best - 19, p. 63.
- Gyromitra esculenta* (Pers. ex Fr.) Fr. (*Helvella esculenta*): verschil t.o. *Gyromitra gigas* - 5, p. 91; omgev. Deventer - 12, p. 75; Diepenveen - 12, p. 75; Nunhem (nadere informatie) - 17, p. 44; Nunhem, Leubeek - 15, p. 31.
- Gyromitra gigas* (Krombh.) Cooke: verschil t.o. *Gyromitra esculenta* - 5, p. 91; Vogelenzang, duinen - 5, p. 91, 93.
- Gyromitra infula* (Schaeff. ex Fr.) Quél. (*Helvella infula*): habitustekening & microscop.gegevens - 14, p. 64-65; Amersfoort - 14, p. 66; Bilthoven - 14, p. 66; Eindhoven, puinstort - 19, p.64; Zwolle - 14, p. 66.
- Gyrophana lacrymans* (Wulf. ex Fr.) Pat. (*Merulius domesticus*, *Merulius lacrymans*): mycelium op anthraciet - 11 p. 11*; Amsterdam, turngebouw - 5, p. 94*; Rijswijk (mycelium) - 16, p. 23*.
- Gyroporus castaneus* (Bull. ex Fr.) Quél.: (*Boletus*, *Suillus castaneus*): diagnose - 18, p. 18; Bathmen, "Bannink" - 7, p. 77; Bergen-Schoorl - 9, p. 29; Chaam - 6, p. 35; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; vorige vondst herroepen - 5, p. 59; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 6, p. 38; Vogelenzang - 5, p. 66.
- Gyroporus cyanescens* (Bull. ex Fr.) Quél. (*Boletus*, *Suillus cyanescens*): diagnose - 18, p. 18; omgev. De Bilt - 6, p. 40; Bloemendaal - 4, p.25; Doorn-Maarn - 19, p. 11; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46, omgev. Haarlem (Bloemendaal?) - 6, p. 12; omgev. Rijswijk - 11, p. 25; De Vuursche - 13, p. 10.
- Hapalopilus nidulans* (Fr.) Karst. (*Phaeolus*, *Polyporus rutilans*): Best -19, p. 63; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13.

- Hapalopilus schweinitzii* (Fr.) Donk (*Polyporus schweinitzii*): omgev.
 Baarn - 14, p. 77; Beekhuizen - 5, p. 40; Bilthoven, De Pan - 18, p. 7;
 omgev. Chaam - 6, p. 34; Roermond, "Ahrwinkel" en/of
 "Munnicksbosch" -10, p. 29.
- Hebeloma anthracophilum* Maire (*Hebeloma punctatum* sensu Ricken,
 non Fr.): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Epse, Epser
 bos of Gorssel, "t Hassink" - 12, p. 20.
- Hebeloma crustuliniforme* (Bull. ex Fr.) Quél.: *teratologicum* - 4, p. 52*;
 omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg -
 8, p. 67.
- Hebeloma fusipes* Bres.: Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
- Hebeloma longicaudum* (Pers. ex Fr.) Quél.: Wageningen (onzeker) - 10, p.
 61.
- Hebeloma punctatum* sensu Ricken (non Fr.): zie *Hebeloma*
anthracophilum, *Hebeloma radicosum* (Bull. ex Fr.) Ricken
 (*Pholiota radicosum*): Epse, Epser bos - 10, p. 41; omgev. Denekamp
 (vermoedelijk nadere informatie) - 6, p. 34; Gorssel, "t Joppe" - 12,
 p. 20; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67; Ruurlo, "Medler", p.
 27; De Steeg, Middachten - 8, p. 18; omgev. Winterswijk - 11, p. 18*-
 19.
- Hebeloma sacchariolum* Quél.: omgev. Acht (nadere informatie) - 19, p. 64;
 Eindhoven, "Eckart", Oirschotse dijk, "Wielewaal" (nadere
 informatie) - 19, p. 64; Nieuwersluis, "Over Holland" - 14, p. 77;
 19, p. 67; Wageningen, omgev. Rijn - 10, p. 61; Zwolle, Engelsche
 Werk - 10, p. 62.
- Hebeloma sinapizans* (Fr.) Gill.: Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
- Hebeloma sinuosum* (Fr.) Quél.: Egmond aan de Hoef - De Franschman -
 5, p. 60; Enschede, Oldenzaalse weg (nadere informatie) - 14, p. 9.
- Hebeloma subcollariatum* (Berk. et Br.) Gill.: Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
- Hebeloma truncatum* (Fr.?) sensu Lange: beschrijving - 14, p. 56; verschil
 t.o. *Rhodopaxillus truncatus* - 14, p. 56.
- Helotium ciliatosporum* (Fuck.) Boud. (*Belonioscypha ciliatospora*):
 sporen-maten & afb. - 20, p. 11-12; Amsterdam, Bosplan - 20, p. 12;
 Bennekom, Diedenweg, Kraats - 20, p. 12; Doorwerth, Onderlangs -
 20, p. 12; Grebbe, Kolkje - 20, p. 12; Nieuwersluis - 20, p. 12;
 Wageningen, Domeinweg, Dorskamp, Kleine Veer - 20, p. 12.

- Helotium fagineum* (Pers. ex Fr.) Fr. Oosterhout, "Oosterhout" - 15, p. 11.
- Helotium fructigenum* (Bull. ex Fr.) Karst. (*Peziza fructigena*):
 Amsterdam, Zuidelijke wandelweg - 8, p. 67; Delden, "Twickel"
 (nadere informatie) -12, p. 42.
- Helotium herbarum* (Pers. ex Fr.) Fr.: beschrijving & afb. - 18, p. 27-28;
 omgev. Rijswijk - 11, p. 25*.
- Helotium longisporum* Schweers: Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 40;
 10, p. 37; 12, p. 43; 20, p. 47; De Steeg, "Middachten" - 12, p. 43; 13,
 p. 34.
- Helotium scutula* (Pers. ex Fr.) Karst.: Bennekom, Kraats - 20, p. 12;
 Doorwerth, "Zalmen" - 20, p. 12; Mook, Plasmolen - 20, p. 12;
 Renkum, "Oranje Nassau Oord" - 20, p. 12; Rhenen, station - 20, p.
 12; Wageningen - 18, p. 29; Wageningen, Dorskamp - 20, p.12.
- Helvella atra* König ex Fr.: Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7.
- Helvella crispa* (Scop. ex) Fr.: Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 39; Breda,
 Mastbosch - 1, p. 53; omgev. Eindhoven - 15, p. 31; omgev.
 Haarlem - 5, p. 18; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Tilburg - 11, p.
 62; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.
- Helvella elastica* Bull. ex Fr.: Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 39;
 Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; omgev. Rijssen - 12, p. 14.
- Helvella ephippium* Lév.: zie *Leptopodia ephippium*.
- Helvella esculenta*: zie *Gyromitra esculenta*.
- Helvella infula*: zie *Gyromitra infula*.
- Helvella lacunosa* Afzel. ex Fr.: omgev. Eindhoven - 15, p. 31; 's-Graven-
 hage, "Meer en Bosch" - 13, p. 56; omgev. Haarlem - 5, p. 18;
 Overveen, "Elswout" - 6, p. 14.
- Helvella macropus*: zie *Macropodia macropus*.
- Helvella queletii* Bres.: beschrijving - 13, p. 24; Baarn-Bilthoven - 18,
 p. 47; Winterswijk-Bredevoort, Miste - 13, p. 24, 34.
- Helvella sulcata* Afzel. ex Fr. (N.B. vermoedelijk identiek met en synoniem
 van *Helvella lacunosa*): Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42.
- Hemitrichia vesparium* (Batsch) Macbr. (*Myxomycetes*): De Steeg,
 "Middachten" - 8, p.18.
- Heridium coralloides* (Fr.) Pers. (*Hydnum coralloides*): omgev. Chaam - 6,
 p. 35.
- Heridium erinaceum* (Bull. ex Fr.) Pers. (*Dryodon erinaceus*,

- Hydnum erinaceum): Baarn, Baarnse bos ("Groeneveld") - 6, p. 24; Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 40; 19, p. 67; De Steeg, "Middachten" - 9, p. 16.
- Heteroporus biennis (Bull. ex Fr.) Laz. (Daedalea biennis, Polyporus rufescens): Heelsum, omgev. Heelsumsche beek - 13, p. 19; Maarn - 6, p. 37.
- Hirneola auricula judae: zie Auricularia auricula-judae.
- Hirschioporus abietinus (Dicks. ex Fr.) Donk (Polyporus abietinus): omgev. Aalst - 14, p. 60.
- Humaria applanata (Hedw. ex Fr.) Rehm: Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 13, p. 34; 20, p. 49.
- Humaria araneosa (Bull. ex Fr.) Quél.: Amsterdam - 12, p. 24.
- Humaria ithacaensis Rehm: zie Neottiella ithacaensis.
- Humaria leucoloma (Hedw. ex Fr.) Boud.: Epse, Epser bos - 8, p. 38; Mook, Plasmolen, Groene Water - 12, p. 24; 20, p. 48; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
- Humaria leucolomoides Rehm: Bergen - 12, p. 24; Hatert - 12, p. 24; Hatert, Hatertse vennen - 9, p. 40; omgev. Nijmegen - 8, p. 38.
- Humaria leucomeloides: verschrijving voor Humaria leucolomoides.
- Humaria macrospora (Wallr.) Fuck.: Wilp (nadere informatie) - 18, p. 34.
- Humaria melalomoides zie Lachnea intermixta.
- Humaria pilifera (Cooke) Sacc.: Mook, Plasmolen - 12, p. 24; 20, p. 48.
- Humaria roumegueri Karst.: Schoorl, Overval - 12, p. 24.
- Humaria rutilans: zie Peziza rutilans.
- Humaria subhirsuta (Schum. ex Fr.) Karst.: Hengelo - 12, p. 24.
- Humaria theleboides (Alb. et Schw. ex Fr.) Rehm (Peziza theleboides): Oosterhout, "Oosterhout" (onzeker, nadere informatie) - 8, p. 38; Walcheren, Dishoek (nadere informatie) - 12, p. 25.
- Humaria tetraspora (Fuck.) Boud. (Humarina tetraspora): Kootwijk - 10, p. 37; Noord-Oostpolder - 14, p. 66.
- Humarina tetraspora: zie Humaria tetraspora.
- Hydnellum acre (Quél.) Donk (Hydnum acre): omgev. Bilthoven - 10, p. 39; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20.
- Hydnellum ferrugineum (Fr.) Karst. (Hydnum ferrugineum): Amersfoort - 2, p. 12; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; omgev. Stroe - 14, p. 63; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 39; Hydnellum serobiculatum

- (Fr.) Karst. (*Hydnurn scrobiculatum*): Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46.
- Hydnellum velutinum* (Fr.) Banker (*Hydnum velutinum*): Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7.
- Hydnellum zonatum* (Batsch ex Fr.) Karst. (*Hydnum zonatum*): omgev. Bilthoven - 10, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46.
- Hydnotria tulasnei* (Berk.) Berk. et Br.: doorsnede vruchtlichaam & microscop. details - 16, p. 19; Baarn, "Groeneveld" - 13, p. 10; Eindhoven, Oirschotse dijk - 17, p. 64; 19, p. 64; omgev. Enschede - 16, p. 19.
- Hydnum acre*: zie *Hydnellum acre*.
- Hydnum amicum*: zie *Phellodon amicus*.
- Hydnum auriscalpium*: zie *Auriscalpium vulgare*.
- Hydnum compactum* (N.B. foute determinatie voor *Hydnellum caeruleum*?): Amersfoort - 2, p. 12.
- Hydnum coralloides*: zie *Hericium coralloides*.
- Hydnum erinaceum*: zie *Hericium erinaceum*.
- Hydnum ferrugineo-album* Britz.: omgev. Stroe - 14, p. 63.
- Hydnum ferrugineum*: zie *Hydnellum ferrugineum*.
- Hydnum imbricatum*: zie *Sarcodon imbricatus*.
- Hydnum inopinatum*: zie *Sarcodon inopinatus*.
- Hydnum melaleucum*: zie *Phellodon melaleucus*.
- Hydnum molle*: zie *Sarcodon mollis*.
- Hydnum nigrum*: zie *Phellodon niger*.
- Hydnum repandum* L. ex Fr. : omgev. Bilthoven - 10, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46; 17, p. 7; omgev. Chaam - 6, p. 35; Ede, Hoekelom - 5, p. 42; Gieten - 12, p. 17.
- Hydnum scabrosum*: waarschijnlijk foute determinatie van *Sarcodon fennicus*.
- Hydnum scrobiculatum*: zie *Hydnellum scrobiculatum*.
- Hydnum tomentosum*: zie *Phellodon tomentosus*.
- Hydnum velutinum*: zie *Hydnellum velutinum*.
- Hydnum zonatum*: zie *Hydnellum zonatum*.
- Hygrocybe ceracea* (Wulf. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus ceraceus*): omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18. *Hygrocybe chlorophana* (Fr.)

- Karst. (*Hygrophorus chlorophanus*): Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29.
- Hygrocybe coccinea* (Schaeff. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus coccineus*): Beekhuizen - 5, p. 40; Bunnik, fort Vechten - 19, p. 23.
- Hygrocybe conica* (Scop. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus conicus*): Amersfoort - 2, p. 12; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Beekhuizen - 5, p. 40; omgev. Bussum - 14, p. 77; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Markelo-Rijssen - 12, p. 14; Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29; Texel (waar?) - 6, p. 55.
- Hygrocybe laeta* (Pers. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus laetus*): Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Deventer-Lochem, omgev. "'t Joppe" - 7, p. 23; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.
- Hygrocybe miniata* (Scop. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus "flammans"*, *Hygrophorus miniatus*): Amersfoort - 2, p. 12; Denekamp, "Breklenkamp" - 17, p. 43; Gorssel "'t Joppe" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.
- Hygrocybe nitrata* (Pers. ex Fr.) Karst.: Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 66.
- Hygrocybe obrussea* (Fr.) Karst. (*Hygrophorus obrusseus*): omgev. Bussum - 14, p. 77.
- Hygrocybe psittacina* (Schaeff. ex Fr.) Karst. (*Hygrophorus psittacinus*): Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Noordbroek - 6, p. 32.
- Hygrocybe turunda* (Fr.) Karst. (*Hygrophorus turundus*): Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.
- Hygrocybe unguinosa* (Fr.) Karst. (*Hygrophorus unguinosus*): Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
- Hygrophorus aureus*: zie *Hygrophorus hypothejus* var. *aureus*.
- Hygrophorus ceraceus*: zie *Hygrocybe ceracea*.
- Hygrophorus chlorophanus*: zie *Hygrocybe chlorophana*.
- Hygrophorus coccineus*: zie *Hygrocybe coccinea*.
- Hygrophorus conicus*: zie *Hygrocybe conica*.
- Hygrophorus eburneus* (Bull. ex Fr.) Fr.: Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.

Hygrophorus flammans: foutief voor *Hygrophorus flammeus*, synoniem van *Hygrocybe miniata*.
Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. (*Limacium hypothejum*): Amersfoort - 2, p. 12; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. var *aureus* (Arrh.) Imler (*Hygrophorus aureus*): Heelsum, omgev. Heelsumsche beek - 13, p. 19.
Hygrophorus irrigatus: zie *Camarophyllus irrigatus*.
Hygrophorus laetus: zie *Hygrocybe laeta*.
Hygrophorus leucophaeus (Scop. ex Fr.) Gill.: Mook, Plasmolen, St. Martensberg - 9, p. 39; 20, p. 47.
Hygrophorus limacinus Scop. ex Fr. (*Limacium limacinum*): Wassenaar, Meiendel - 12, p. 47.
Hygrophorus miniatus: zie *Hygrocybe miniata*.
Hygrophorus nemoreus (Lasch) Fr.: omgev. Winterswijk ('t Woold?) - 11, p. 17.
Hygrophorus niveus: zie *Camarophyllus niveus*.
Hygrophorus obrusseus: zie *Hygrocybe obrussea*.
Hygrophorus pratensis: zie *Camarophyllus pratensis*.
Hygrophorus psittacinus: zie *Hygrocybe psittacina*.
Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. (*Limacium pudorinum*): De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 31.
Hygrophorus pustulatus (Pers. ex Fr.) Fr. (*Limacium pustulatum*): Oosterhout, "Oosterhout" - 9, p. 39, 13 p. 42.
Hygrophorus russocoriaceus: zie *Camarophyllus russocoriaceus*.
Hygrophorus russula (Schaeff. ex Fr.) Quél. (*Tricholoma russula*): Bathmen, "Bannink" - 7, p. 24; Epse, Epser bos 10, p. 41; Gorssel, "t Hassink?" - 7, p. 23; Winterswijk - 7, p. 23.
Hygrophorus subradiatus: zie *Camarophyllus subradiatus*.
Hygrophorus turundus: zie *Hygrocybe turunda*.
Hygrophorus unguinosus: zie *Hygrocybe unguinosa*.
Hygrophorus virgineus: zie *Camarophyllus virgineus*.
Hymenogaster tener Berk.: beschrijving - 11, p. 20; Barneveld, Barneveldsche beek - 11, p. 20; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.
Hymenostilbe muscaria Petch.: habitustekening - 18, p. 45; Eindhoven, Philipsbossen - 18, p. 45.
Hypholoma candolleianum: zie *Psathyrella candolleana*.

- Hypholoma capnoides* (Fr.) Quél. : Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46; omgev. Gorssel - 7, p. 46; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
- Hypholoma caput-medusae*: zie *Psathyrella caput-medusae*.
- Hypholoma cascum*: zie *Psathyrella casca*.
- Hypholoma dispersum* (Fr.) Quél.: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46.
- Hypholoma epixanthum* (Fr.) Quél.: omgev. Lunteren - 12, p. 47; Wassenaar, Meiendel - 12, p. 47.
- Hypholoma ericaeum* (Pers. ex Fr. sensu Kühner) Kühner (*Psilocybe ericaea*) standplaats - 12, p. 10; Castricum, Geversduin - 6, p. 57; omgev. Wijster - 12, p. 10.
- Hypholoma fasciculare* (Huds. ex Fr.) Quél.: Amsterdam, Sted. Museum - 7, p. 59; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; 7, p. 60. Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Bloemendaal, Kraantjelek - 17, p. 25, omgev. Haarlem - 5, p. 93; Heiloo - 15, p. 32; Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 92; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; Tilburg - 11, p. 62; De Vuursche, Lage Vuursche - 8; p. 30; omgev. Wageningen - 5, p. 93.
- Hypholoma hydrophilum*: zie *Psathyrella hydrophila*.
- Hypholoma lacrymabundum*: zie *Lacrymaria velutina*.
- Hypholoma melantinum*: zie *Psathyrella scobinacea*.
- Hypholoma pilulaeforme*: zie *Hypholoma piluliforme*.
- Hypholoma piluliforme* (Bull. ex Fr.) Gill.: Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
- Hypholoma polytrichi* (Fr.) Ricken (*Nematoloma polytrichi*): omgev. Maarn -14, p. 77.
- Hypholoma subericaeum* (Fr. sensu Rea) Kühner: Best 19, p. 63.
- Hypholoma sublateritium* (Fr.) Quél.: Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Bloemendaal - 5, p. 93; Ede (nadere informatie) - 13, p. 35; omgev. Haarlem - 5, p. 93; Rijswijk - 9, p. 46; Tilburg - 11, p. 62; Wageningen, Haagsteeg (abnormaal exemplaar) - 8, p. 34*.
- Hypomyces chrysospermus* (Bull. ex Fr.) Tul.: perithecieënvorm van *Sepedonium chrysospermum* - 12, p. 41.
- Hypoxyton ferrugineum* Otth.: Nieuwersluis, "Over-Holland" - 6, p. 39; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29-30.
- Inocybe abjecta*: zie *Inocybe flocculosa* var. *abjecta*.
- Inocybe acuta*: zie *Inocybe umboninota*.
- Inocybe ammophila*: zie *Inocybe serotina*.

- Inocybe armoricana* Heim: Bilthoven - 7, p. 6; Winterswijk - 7, p. 6.
Inocybe asterospora Quél.: Egrnond aan de Hoef - De Franschman - 5, p. 60; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25-26; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42.
- Inocybe bongardii* sensu Cooke (non Heim nec Konr. et Maubl.) (N.B. dubieuze soort): De Bilt, "Noord Houdringe" - 7, p. 6.
- Inocybe bongardii* (Weinm.) Quél. sensu Heim: Doetinchem, "Slangenburger" - 7, p. 55; Loenen - 7, p. 6; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 18, p. 46.
- Inocybe bongardii* var. *cervicolor*: zie *Inocybe cervicolor*.
- Inocybe brunneo-atra*: zie *Inocybe descissa* var. *brunneo-atra*.
- Inocybe caesariata* (Fr.) Karst. (*Inocybe delecta* Lange): Groesbeek - 14, p. 66; De Vuursche, "Pijnenburg" - 13, p. 10.
- Inocybe calospora* Quél.: Bergeyk (nadere informatie) - 17, p. 45; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.
- Inocybe carpta* (Scop. ex Fr.) Sacc. sensu Masee, Quél. (non Bres., nec Ricken): Hatert - 13, p. 34.
- Inocybe casimiri* Vel. (*Inocybe lanuginosa* var. *casimiri*): Bilthoven (nadere informatie) - 7, p. 6; Walcheren, Oostkapelle (nadere informatie) - 7, p. 6; Wouw (nadere informatie) - 7, p. 6.
- Inocybe cervicolor* (Pers. ex Quel.) Karst. (*Inocybe bongardii* var. *cervicolor*): Hengelo - 7, p. 6.
- Inocybe cicatricata* Ell. et Everh. (N.B. waarschijnlijk synoniem met *Inocybe rennyi* (Berk. et Br.) Sacc.): Hengelo - 7, p. 6; Venraay, Oostrum - 14, p. 66.
- Inocybe confusa* Karst. sensu Heim: Bergen - 7, p. 6.
- Inocybe cookei* Bres. (langstelige vorm): Alkmaar - 7, p. 6; Lonneker, Smalenbroek - 7, p. 6.
- Inocybe corydalina* Quél.: omgev. Alkmaar (nadere informatie) - 7, p. 6.
- Inocybe corydalina* Quél. f. *albidula* (Britz.) Heim: Nieuwersluis, "Over-Holland" - 18, p. 46; omgev. Zeist (nadere informatie) - 7, p. 6.
- Inocybe decipiens* Bres.: Bergen, duinen - 2, p. 64; Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66; IJmuiden, Heerenduin - 11, p. 20.
- Inocybe deglubens* (Fr.) Gill. var. *trivialis* Karst. (N.B. waarschijnlijk identiek met *Inocybe deglubens*): De Bilt, "Noord Houdringe" - 7, p. 6.
- Inocybe delecta* Lange: zie *Inocybe caesariata*.

- Inocybe descissa* (Fr.) Quél.: Bergeyk (nadere informatie) - 17, p. 45.
- Inocybe descissa* (Fr.) Quél. var. *auricoma* (Batsch ex Fr.) Heim:
Doetinchem, "Slangenburgh" (onzeker) - 7, p. 55.
- Inocybe descissa* (Fr.) Quél. var. *brunneo-atra* Heim: omgev. Doetinchem
(nadere informatie) - 7, p. 6; omgev. Enschede (nadere informatie)
- 7, p. 6.
- Inocybe dstricta*: vorm van *Inocybe jurana*.
- Inocybe dulcamara* (Alb. et Schw. ex Fr.) Quél. (*Inocybe malenconi*):
Ulvenhout - 7, p. 6.
- Inocybe echinata*: zie *Lepiota echinata*.
- Inocybe eutheles* (Berk. et Br.) Sacc.: IJmuiden, Heerenduin - 11, p. 20.
- Inocybe eutheles* (Berk. et Br.) Sacc. var. *pallidipes* (Ell. et Everh.) Heim
(*Inocybe pallidipes*): kenmerken & afb, - 13, p. 44, 46; Enschede
(nadere informatie) - 13, p. 44; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42.
- Inocybe fastigiata* (Schaeff. ex Fr.) Quél.: Bilthoven, Panbos - 19, p. 23;
Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28; Utrecht, "Rhijnauwen" - 7, p. 7.
- Inocybe fastigiata* (Schaeff. ex Fr.) Quél. f. *arenicola* Heim: Bergen, duinen
- 7, p. 6.
- Inocybe fastigiata* (Schaeff. ex Fr.) Quél. var. *curreyi* (Berk.) Heim: Utrecht,
Maliebaan - 7; p. 6.
- Inocybe fastigiata* var. *squamata*: zie *Inocybe squamata*.
- Inocybe fastigiata* (Schaeff. ex Fr.) Quél. var. *umbrinella* (Bres.) Heim:
Walcheren (geen nadere vindpl. bekend, nadere informatie) - 7, p.
6.
- Inocybe flocculosa* (Berk.) Sacc. var. *abjecta* (Karst.) Heim (*Inocybe*
abjecta): Denekamp, Borchbosch - 14, p. 66.
- Inocybe frumentacea*: zie *Inocybe jurana*.
- Inocybe fulvida* Bres. (N.B. waarschijnlijk identiek met *Inocybe queletii*):
beschrijving & afb. - 15, p. 2-3; Oosterhout, "Oosterhout" - 14, p. 66;
15, p. 2.
- Inocybe gaillardii* Gill.: Delden, "Twickel" - 9, p. 18; Doetinchem,
"Slangenburgh" - 11, p. 43.
- Inocybe geophylla* (Sow. ex Fr.) Quél.: Nieuwersluis, "Over Holland" - 13,
p. 12.
- Inocybe globocystis* Vel.: Bilthoven (nadere informatie) - 7, p. 6;

- Doetinchem (nadere informatie) - 7, p. 6; omgev. Enschede - 14, p. 51; Walcheren, Oostkapelle (nadere informatie) - 7, p. 6; Wouw - 7, p. 6.
- Inocybe halophila* Heim: Bergen - 7, p. 6; Lonneker, Smalenbroek - 7, p. 6.
- Inocybe hirsuta* (Lach) Quél.: Delden, "Zwickel" - 9, p. 18.
- Inocybe inconcinna* Karst.: De Bilt, "Noord Haudringe" - 7, p. 6.
- Inocybe jurana* (Pat.) Sacc. (met als vormen *Inocybe destricta*, *frumentacea*, *rhodiola*): habitustekening & microscop. details (*rhodiola*) - 13, p. 12; Delden, "Twickel" (*destricta*) - 5, p. 59; Nieuwersluis, "Over-Holland" (*rhodiola*) - 13, p. 12; Oostkapelle "Zeeduin" (*frumentacea*, nadere informatie) - 8, p. 28; Walcheren (*jurana*; waar?) - 5, p. 31; Walcheren (*frumentacea*; waar?) - 8, p. 29.
- Inocybe lacera* (Fr.) Quél.: omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25-26.
- Inocybe langei* Heim: De Bilt, "Noord Houdringe" - 7, p. 6; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7.
- Inocybe lanuginosa* sensu Heim: verzamelsoort, misschien bedoeld *Inocybe ovatocystis*.
- Inocybe lanuginosa* var. *casimiri*: zie *Inocybe casimiri*.
- Inocybe lucifuga* (Fr. ex Fr.) Quél.: kenmerken & afb. 13, p. 45-46; Amersfoort (nadere informatie) 13, p. 45; omgev. Bussum - 14, p. 77.
- Inocybe maculata* Boud. Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
- Inocybe malençonii*: zie *Inocybe dulcamara*.
- Inocybe margaritisporea* (Berk.) Sacc. Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Utrecht, "Rhijnauwen" - 7, p. 7.
- Inocybe maritima* (Fr.) Karst.: IJmuiden, Heerenduin - 11, p. 20.
- Inocybe mixtilis*: zie *Inocybe praetervisa* var. *mixtilis*.
- Inocybe mucronata* Heim: Delden - 7, p. 7.
- Inocybe napipes* Lange: verschil t.o. *Inocybe acuta*, *umbrina* - 8, p. 54-55*; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25-26.
- Inocybe obscura* (Pers. ex Fr.) Gill. Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28.
- Inocybe ovatocystis* Bours. et Kühner (*Inocybe lanuginosa* sensu Heim): Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66; Wassenaar, "Raaphorst" - 15, p. 5.
- Inocybe pallidipes*: zie *Inocybe eutheles* var. *pallidipes*.

Inocybe pannosa (Fr.) Quél.: de Bilt, "Noord Houdringe" - 7, p. 7.
Inocybe patouillardii Bres.: 's-Gravenhage, Haagsche Bosch - 12, p. 79.
Inocybe perlata (Cooke) Sacc.: omgev. Amersfoort (niet zeker) - 13, p. 8.
Inocybe petiginosa (Fr.) Gill: Bunnik, fort Vechten (onzeker) - 19, p.23;
 Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.
Inocybe posterula (Britz.) Sacc. sensu Lange: De Bilt (nadere informatie)
 - 7, p. 7; Heeze (nadere informatie) - 7, p. 7.
Inocybe poujolii Heim: Domburg - 7, p. 7; Mook, Plasmolen - 16, p. 31;
 20, p. 49.
Inocybe praetervisa Quél : verschil t.o. *Inocybe mixtilis*, *xanthomelas* - 8,
 p. 53*-54; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25-26.
Inocybe praetervisa Quél. var. *mixtilis* (Britz.) Konr. et Maubl. (*Inocybe*
mixtilis) verschil t.o. *Inocybe praetervisa*, *xanthomelas* - 8, p 53*-
 54.
Inocybe queletii Maire et Konr. (misschien synoniem van *Inocybe fulvida*
 Bres.): Utrecht, Maliebaan - 7, p. 7.
Inocybe relicina (Fr.) Quél. sensu Heim (N.B. vorm van *Inocybe hirsuta*?):
 Domburg - 7, p. 1.
Inocybe rhodiola: vorm van *Inocybe jurana*.
Inocybe sambucina (Fr.) Quél.: Apeldoorn "Berg en Bosch" - 12, p. 4;
 Vijlen, Vijlener bos - 10, p. 30; Zeist, Zeister bos - 6, p. 57.
Inocybe scabella (Fr.) Quél. sensu Cooke: omgev. Bussum - 14, p. 77.
Inocybe serotina Peck (*Inocybe ammophila*): Amsterdamse Waterleiding
 duinen - 5, p. 41; Vogelenzang - 5, p. 69.
Inocybe squamata Lange (*Inocybe fastigiata* var. *squamata*): IJmuiden,
 Heerenduin - 11, p. 20.
Inocybe squarrosa Rea: Goor - 7, p. 7.
Inocybe striata Bres.: Driebergen - 7, p. 7.
Inocybe umboninota Peck sensu lange (*Inocybe acuta*): Denekamp,
 Borchbosch - 14, p. 66.
Inocybe umbratica Quél.: Doetinchem, "Slangenburg" - 11, p. 43.
Inocybe umbrina Bres.: verschil t.o. *Inocybe acuta*, *napipes* - 8, p. 54-55*;
 Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11,
 p. 47.
Inocybe vaticosa (Fr.) Karst.: Lonneker, Smalenbroek - 7, p. 7.
Inocybe viscidula Heim: Lonneker, Smalenbroek - 7, p. 7.
Inocybe xanthomelas Bours. et Kühner: verschil t.o. *Inocybe mixtilis*,

- praetervisa - 8, p. 53*-54.
- Inocybe spec.: Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 55.
- Inoloma: subgenus van Cortinarius.
- Inonotus cuticularis (Bull. ex Fr.) Karst. (Polyporus cuticularis): omgev. Tilburg - 11, p. 62.
- Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr.: Ruurlo, cycloonbos - 7, p. 55.
- Inonotus hispidus (Bull. ex Fr.) Karst. (Polyporus hispidus): omgev. Bussum - 5, p. 40; omgev. Chaam - 6, p. 35; omgev. Tilburg - 11, p. 62; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
- Inonotus obliquus (Pers. ex Fr.) Pilát (Fomes obliquus): Haarlem, stadstuin - 3, p. 12.
- Inonotus vulpinus (Fr.) Karst (Polyporus vulpinus): Bergen, staatsbossen - 13, p. 55; Ruurlo - 5, p. 87; Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87.
- Isaria ditmarii Quél.: Eindhoven, Philipsbossen - 18, p. 45.
- Isaria dubia Delacr.: conidieënvorm van Cordyceps gracilis - 18, p. 45; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 18, p. 45.
- Isaria farinosa Dicks. ex Fr.: niet conidieënvorm van Cordyceps militaris - 18, p. 44; omgev. Alkmaar - 2, p. 65; Eindhoven, Philipsbossen - 18, p. 45; De Lutte - 9, p. 10*; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; omgev. Rijswijk - 11, p. 25; Rijswijk, Rijswijkse bos - 9, p. 10.
- Isaria sphaerocephala Petch: Tongerlo - 18, p. 46.
- Ischnoderma resinosum (Fr.) Karst. (Polyporus fuliginosus): omgev. Wageningen - 7, p. 4; Zeist, Zeister bos - 6, p. 57.
- Ithyphallus impudicus: zie Phallus impudicus.
- Laboulbenia flagellata Peyr.: ontwikkelingsgeschiedenis & afb. - 9, p. 62-65; Leiden, Hortus Bot. - 9, p. 62.
- Laboulbenia subterranea Thaxter: Hengelo 16, p. 6, 7*, 8.
- Laccaria amethystina (Bolt. ex Fr.) Berk. et Br. (Laccaria laccata var. amethystina): Breda, Mastbosch - 1, p. 53; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 47; Noordlaren (teratolog.) - 19, p. 17.
- Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Berk. et Br. (Clitocybe, Collybia laccata): omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Noordlaren (teratolog.) - 19, p. 14*, 16*; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; Ulvenhout - 3, p. 74.
- Laccaria laccata var. amethystina: zie Laccaria amethystina.
- Lachnea albo-badia (Saut.) Rehm: Doetinchem, "Slangenburg" - 12, p. 43;

- omgev. Eindhoven - 18, p. 34.
- Lachnea brunnea* (Alb. et Schw. ex Fuck.) Rehm: Epse, Epser bos - 12, p. 42.
- Lachnea crucipila* (Cooke et Phill.) Phill.: Varsseveld - 18, p. 34; Walcheren, Dishoek (nadere informatie) - 12, p. 25.
- Lachnea dalmeniensis* (Cooke) Phill.: Groningen - 12, p. 25.
- Lachnea gilva* (Boud.) Sacc.: Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
- Lachnea gregaria* (Rehm) Phill.: Mook, Plasmolen - 12, p. 43; Mook, St. Jansberg - 20, p. 48; Oosterhout (nadere informatie) - 12, p. 43.
- Lachnea hemisphaerica*. (Wigg. ex Fr.) Gill. (*Peziza hemisphaerica*): Amersfoort - 2, p. 12; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; omgev. Chaam - 6, p. 35; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 42; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Oisterwijk, vennengebied - 7, p. 47.
- Lachnea hirta* (Schum. ex Fr.) Gill.: Terborg - 9, p. 40; 12, p. 24.
- Lachnea hirtella* (Rehm) Sacc. (misschien identiek met *Lachnea hirta*): Texel, Geul - 12, p. 24.
- Lachnea intermixta* (Karst.) Rehm (*Humaria melalomoides*; wellicht synoniem van *Lachnea melaloma*): Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 48.
- Lachnea melaloma* (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc. (*Peziza melaloma*): Epse, Epser bos - 10, p. 4.
- Lachnea miniata* (Fuck.) Gill.: Nieuw Beerta - 6, p. 32; Texel, Geul - 3, p. 75; 12, p. 24.
- Lachnea rosella* Schweers: Doetinchem; "Slangenburger" - 11, p. 43; 12, p. 25.
- Lachnea roseo-lilacina*: zie *Peziza roseo-lilacina*.
- Lachnea scutellata* (L. ex Fr.) Gill. (*Peziza scutellata*): habitustekening - 10, p. 22; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 25.
- Lachnea setosa* (Nees ex Pr.) Gill. (*Plicaria setosa*): Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 13, p. 34; 20, p. 49.
- Lachnea umbrata* (Fr.) Gill.: Mook, Papenberg - 14, p. 66; 20, p. 49.
- Lachnea umbrorum* (Fr.) Gill.: Mook, Plasmolen - 12, p. 25; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 20, p. 48; Roermond - 12, p. 25.
- Lachnea woolhopeia* (Cooke et Phill.) Sacc. (*Trichophaea woolhopeia*): Eindhoven, Oirschotsedijk - 19, p. 64.

- Lachnum crystallinum* (Fuck.) Rehm: Hatert, Hatertse broek - 12, p. 43.
- Lacrymaria velutina* (Pers. ex Fr.) Pat. (*Hypholoma lacrymabundum*):
 Beverwijk-Bloemendaal - 6, p. 39; Eindhoven - 7, p. 46; Tilburg - 11, p. 62; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17, 50*-51.
- Lactarius aspideus* (Fr. ex Fr.) Fr.: beschrijving - 15, p. 56; Denekamp - 15, p. 5; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77; 15, p. 5.
- Lactarius aurantiacus*: zie *Lactarius mitissimus*.
- Lactarius azonites* (Bull. ex Gmel.) Fr.: Hengelo, "Weusthag" - 4, p. 76.
- Lactarius blennius* (Fr.) Fr.: gastheer van *Nyctalis parasiticus* - 5, p. 85; omgev. Amersfoort - 2, p. 11.
- Lactarius camphoratus* (Bull. ex Fr.) Fr.: Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.
- Lactarius controversus* (Pers. ex Fr.) Fr.: Eindhoven-Best - 7, p. 46; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 13, p. 12.
- Lactarius cremor* Fr.: Nieuwersluis, "Over-Holland" (onzeker) - 18, p. 46.
- Lactarius cyathula* (Fr.) Fr. sensu Ricken (*Lactarius obnubilus* sensu Lange): Bergen-Schoorl - 5, p. 60; Best - 19, p. 64; Egmond aan de Hoef - De Franschman - 5, p. 60; Epse, Epser bos - 10, p. 41; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30; De Vuursche - 13, p. 10.
- Lactarius deliciosus* (L. ex Fr.) S.F.Gray: Eindhoven - 7, p. 46; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Lactarius flexuosus* (Fr. ex Fr.) Fr.: Nieuwersluis, "Over Holland" - 13, p. 12.
- Lactarius fuliginosus* (Fr. ex Fr.) Fr. subsp. *Picinus* (Fr.) Konr. Et Maubl.: Doetinchem, "Slangenburger" - 7, p. 56.
- Lactarius glyciosmus* (Fr. ex Fr.) Fr.: Doorn-Maarn - 19, p. 11; Hooge Vuursche - 19, p. 67; Lunteren - 12, p. 47.
- Lactarius helvus* (Fr.) Fr.: Hilversum-Baarn - 13, p. 19; De Lutte - 9, p. 10; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.
- Lactarius hepaticus* Plowr.: Baarn - 15, p. 6; Bussum - 15, p. 6; Maarn - 14, p. 77; 15, p. 6.
- Lactarius hyginus* (Fr. ex Fr.) Fr.: Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17.
- Lactarius ichoratus* (Batsch ex Secr.) Fr.: Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67.
- Lactarius lilacinus* (Lasch) Fr.: Baarn, "Pijnenburg" - 18, p. 46; Bergen-Verbrande Pan - 3, p. 75; Egmond aan de Hoef - De Franschman - 5,

- p. 60; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61.
- Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr. (*Lactarius aurantiacus*): Texel, staatsbossen - 7, p. 49; Wassenaar, Meiendel - 12, p. 47.
- Lactarius musteus* Fr.: Nieuwersluis "Over Holland" (onzeker) - 18, p. 46.
- Lactarius necator* (Pers. ex Fr.) Karst. (*Lactarius turpis*): omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Lunteren - 12, p. 47.
- Lactarius obnubilus* sensu Lange: zie *Lactarius cyathula*.
- Lactarius pallidus* (Pers. ex Fr.) Fr.: Denekamp - 5, p. 30; Driebergen - 5, p. 30; Hemmen - 5, p. 30; omgev. Ruurlo - 4, p. 27; 5, p. 30; Zoelen - 6, p. 9.
- Lactarius piperatus* (L. ex Fr.) S.F.Gray: reactie melksap, medicinale eigenschap - 5, p. 17; verschil t.o. *Lactarius vellereus* - 4, p. 76; 5, p. 17; gastheer van *Nyctalis asterophora* - 5, p. 85; omgev. Haarlem - 6, p. 39.
- Lactarius pubescens*: zie *Lactarius torminosus* subsp. *pubescens*.
- Lactarius pyrogalus* (Bull. ex Secr.) Fr. omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28.
- Lactarius rufus* (Scop. ex Fr.) Fr.: omgev. Amersfoort - 2, p. 11; 3, p. 79; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Lactarius serifluus* (D.C. ex Fr.) Fr.: Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; Nieuwersluis, "Over Holland" - 13, p. 12; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.
- Lactarius subdulcis* (Bull. ex Fr.) S.F. Gray: Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Lactarius tabidus* Fr.: Paterswolde (onzeker, teratolog.) - 19, p. 14.
- Lactarius theiogalus* (Bull. ex Fr.) Fr.: omgev. Maarn - 14, p. 77; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
- Lactarius torminosus* (Schaeff. ex Fr.) S.F. Gray: Eindhoven - 7, p. 46; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18; Hilversum-Baarn - 13, p. 19.
- Lactarius torminosus* (Schaeff. ex Fr.) S.F.Gray subsp. *pubescens* (Fr.) Konr. et Favre (*Lactarius pubescens*): Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; Hengelo, "Weusthag" - 19, p. 18.

- Lactarius turpis: zie Lactarius necator.
- Lactarius uvidus (Fr. ex Fr.) Fr.: Gorssel - 7, p. 24; omgev. Ruurlo - 4, p. 27; Ulvenhout - 2, p. 45.
- Lactarius vellereus (Fr.) Fr.: verschil t.o. Lactarius piperatus - 4, p. 76; 5, p. 17; gastheer van Collybia tuberosa, Nyctalis asterophora, N. parasitica - 5, p. 85; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amersfoort - Woudenberg, De Treek - 19, p. 49*; Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; omgev. Haarlem - 6, p. 12; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13.
- Lactarius vietus (Fr.) Fr.: Bilthoven, De Pan - 18, p. 7.
- Lactarius volemus (Fr.) Fr.: omgev. Hengelo - 3, p. 48; Mook, Plasmolen, St. Martensberg - 9, p. 39.
- Lactarius zonarius (Bull. ex Secr.) Fr.: omgev. Haarlem - 6, p. 39; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13; Zoelen - 6, p. 8.
- Lamprospora areolata Seaver: Bergen, Verbrande Pan - 12, p. 24.
- Lamprospora carbonicola Boud.: Geisteren, Rosmolen - 14, p. 66.
- Lamprospora Crec'hqueraultii (Crouan) Boud.: Mook, Plasmolen, Groene Water - 12, p. 24; 20, p. 48.
- Lamprospora dictydiola Boud.: Weerdinge - 12, p. 24; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
- Lasiobolus spec.: Epse, Epser bos - 7, p. 56.
- Lentinellus cochleatus (Pers. ex Fr.) Karst. (Lentinus cochleatus): Baarn, "Groeneveld" - 19, p. 67; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18.
- Lentinus adhaerens (Alb. et Schw. ex Fr.) Fr.: beschrijving & afb. - 14, p. 46-47; De Bilt - 14, p. 46.
- Lentinus cochleatus: zie Lentinellus cochleatus.
- Lentinus gallicus Quél.: Venraay - 10, p. 37.
- Lentinus lepideus (Fr. ex Fr.) Fr. (Lentinus squamosus): biologie - 6, p. 42; milieu- en habitusfoto - 6, p. 41, 43; Hoorn-Medemblik - 6, p. 43; omgev. Lochern (nadere informatie) - 18, p. 52; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; Nijmegen, schuilkelder (teratolog.) - 13, p. 29*, 30; Oldenzaal, kelder - 6, p. 43; 13, p. 30; Oldenzaal, Koppelberg - 6, p. 42; Vogelenzang, A.W. duinen - 5, p. 93.
- Lentinus squamosus: zie Lentinus lepideus.
- Lentinus suavissimus Fr.: Amersfoort (?) - 4, p. 31.
- Lentinus tigrinus (Bull. ex Fr.) Fr.: Best - 19, p. 64; omgev. Ede (nadere

- informatie) - 18, p. 35; Lexkesveer - 9, p.39; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40,41*; Rijswijk - 14, p 61; Valkenburg-Ravensbosch - 10, p. 30.
- Lentinus tigrinus* (Bull. ex Fr.) Fr. var. *dunalii* (D.C. ex Fr.) Rea (N.B. vermoedelijk identiek met *Lentinus tigrinus*): Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 56; Nijmegen, Ooipolder - 9, p. 39.
- Lenzites betulina* (L. ex Fr.) Fr.: Tilburg - 11, p. 62; Wassenaar, "Voor Linden" - 18, p. 75.
- Lenzites saepiaria*: zie *Gloeophyllum sepiarium*.
- Leotia lubrica* (Scop. ex Fr.): Amersfoort - 2, p. 12; Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 19, p. 23; omgev. Chaam - 6, p. 35; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; omgev. Eindhoven - 15, p. 31; Oosterwijk, vennengebied - 7, p. 47; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 31; Wassenaar, "Raaphorst" - 11, p. 65; 14, p. 5.
- Lepidella vittadinii*: zie *Aspidella vittadinii*.
- Lepiota*: aantekeningen over de systematiek - 9, p. 50-52, 65-68.
- Lepiota acutesquamosa* (Weinm.) Gill. (*Lepiota friesii*; hierbij zeker ook ten dele var. *furcata* Kühner): Amersfoort - 4, p. 30; Amsterdam, Sted. Mus. en Kolon. Mus. - 7, p. 59-60; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg -8, p. 67; omgev. Baarn - 14, p. 77; Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; omgev. Haarlem, - 6, p. 39; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 41; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.
- Lepiota adnatifolia*: zie *Cystoderma granulorum* var. *adnatifolium*.
- Lepiota alba* (Bres.) Sacc.: Walcheren, Dishoek (nadere informatie) - 9, p. 67.
- Lepiota amianthina*: zie *Cystoderma amianthinum*.
- Lepiota amianthina* var. *longispora*: zie *Cystoderma amianthinum* var. *longisporum*.
- Lepiota badhamii* (Berk. et Br.) Quél.: Baarn, Cantonspark - 18, p. 47.
- Lepiota badhamii* sensu Patouillard, Rea, Cooke: zie *Lepiota meleagroides*.
- Lepiota brebissonii* Godey: beschrijving - 12, p. 72-73; habitusfoto - 20, p. 45; habitustekening & microscop. details - 12, p. 68, 69, 71, 73; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 41; Oostkapelle "Berkenbosch" (nadere informatie) - 12, p. 72; Wageningen, kas - 20, p. 46; Walcheren (waar?) - 12, p. 72; Warmond - 12, p. 71; Wassenaar, Raaphorst - 12, p. 72.

- Lepiota carcharias*: zie *Cystoderma carcharias*.
- Lepiota carinii* Bres. (*Lepiota echinacea*): Eindhoven, Oirschotse dijk -19, p. 63; Houthem, Ravensbosch - 15, p. 11.
- Lepiota castanea* Quél. (N.B. hierbij wellicht ten dele ook *Lepiota ignicolor* Bres.): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; omgev. 's-Gravenhage - 6, p. 38; Hooge Vuursche - 19, p. 67; Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
- Lepiota cepaestipes* (Sow. ex Fr.) Quél. (*Leucocoprinus cepaestipes*): habitustekening & microscop. details - 14, p. 7; Amsterdam, Hortus, kas - 11, p. 4; Hengelo, bloemenkas - 14, p. 8; Tilburg - 11, p. 62.
- Lepiota cepaestipes* (Sow. ex Fr.) Quél. var. *lilacinogranulosa* (P.Henn.) Konr. et Maubl. (*Lepiota lilacinogranulosa*): beschrijving - 11, p. 4; Amsterdam, Hortus, kas - 11, p. 4.
- Lepiota cinnabarina*: zie *Cystoderma cinnabarinum*.
- Lepiota clypeolaria* (Bull. ex Fr.) Quél.: Nieuw Beerta - 6, p. 32.
- Lepiota clypeolaria* (Bull. ex Fr.) Quél. f. *minor* Lange (N.B. identiek met *Lepiota pallida* Locq.): omgev. Bussum - 14, p. 77.
- Lepiota cristata* (Alb. et Schw. ex Fr.) Quél.: Amsterdam(?) kas - 11, p. 24; Amsterdam, Kolon. Mus. - 7, p. 60; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 69; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Haarlem, stadstuin -3, p. 12; omgev. Rijssen - 12, p. 15; Rijswijk, Hoornbrug - 5, p. 94.
- Lepiota cygnea* Lange: Oostkapelle, "Berkenbosch" (nadere informatie) - 9, p. 67; Oostkapelle, "Westbroek" - 8, p. 37.
- Lepiota delicata*: zie *Limacella delicata*.
- Lepiota echinacea* Lange: zie *Lepiota carinii*.
- Lepiota echinata* (Roth ex Fr.) Quél. (*Lepiota haematosperma*, *Inocybe Psalliota echinata*): beschrijving sporeverkleuring - 4, p. 29; Ter Apel - 4, p. 30; Ginneken - 6, p. 35; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 6, p. 22; 20, p. 47; Overveen, duinen - 4, p. 29; Ruurlo, kasteel "Ruurlo" - 4, p. 27; Tilburg - 11, p.61; Veendam - 4, p. 30; Wageningen, plantenkas - 12, p. 21; Zuidlaren - 4, p. 30.
- Lepiota excoriata* (Schaeff. ex Fr.) Quél. var. *konradi* Huijsman (*Lepiota mastoidea* sensu Konr. et Maubl.): Oostkapelle, Oranjezon (nadere informatie) - 9, p. 66; Vrouwenpolder (nadere informatie) - 9, p. 66.
- Lepiota felina* (Pers. ex Fr.) Quél.: Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 69;

- Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
- Lepiota forquignoni* Quél.: Slochteren, Slochterbosch - 6, p. 38; Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
- Lepiota friesii*: vorm van *Lepiota acutesquamosa*.
- Lepiota georginae* W.G. Smith: Baarn, Baarnse bos ("Groeneveld") - 18, p. 47; Bergen, Berger bos - 2, p. 64; Oosterhout, "Oosterhout" - 15, p. 11; Oostkapelle, "Berkenbosch", "'t Vroon" , "Westhoven" (nadere informatie) - 10, p. 36.
- Lepiota haematosperma*: zie *Lepiota echinata*.
- Lepiota helveola* Bres.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41.
- Lepiota holosericea* (Fr.) Gill.: Huis ter Heide (nadere informatie) - 4, p. 30.
- Lepiota irrorata*: zie *Drosella irrorata*.
- Lepiota laevigata* Lange: Velsen, Velsers bos - 14, p. 61.
- Lepiota lenticularis*: zie *Limacella guttata*.
- Lepiota lilacea* Bres. (N.B. hierbij misschien ook *Lepiota pseudo-lilacea*?, zie aldaar): beschrijving - 12, p. 20; Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
- Lepiota lilacina*: Naam bestaat niet, verschrijving voor *L. lilacea*? - 1, p. 55, 57.
- Lepiota lilacinogranulosa* P. Henn.: zie *Lepiota cepaestipes* var. *lilacinogranulosa*.
- Lepiota lutea* (With. ex) Godfrin: Breda, tuinbouwschool - 9, p. 39; Eindhoven, kas - 19, p. 63; Hengelo, bloemenkas - 14, p. 7*.
- Lepiota mastoidea* (Fr.) Quél. (non sensu Konr. et Maubl.): omgev. Middelburg (nadere informatie) - 9, p. 66.
- Lepiota meleagroides* Huijsman (*Lepiota badhami* sensu Pat.): Haarlem, A.W. duinen - 10, p. 35.
- Lepiota metulispora* (Berk. et Br.) Sacc.: Oostkapelle, "Westhoven" (nadere informatie - 9, p. 67.
- Lepiota minuta* Lange: Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
- Lepiota naucina* (Fr.) Quél. (*Lepiota pudica*): beschrijving & verschil t.o. *Lepiota excoriata*, *lenticularis* - 6, p. 53; Heemstede - 6, p. 53; Tilburg - 11, p. 62; Walcheren (waar?) - 5, p. 32.
- Lepiota odorata*: zie *Tricholoma odoratum*.
- Lepiota procera* (Scop. ex Fr.) Quél.; verschil t.o. *Lepiota rhacodes* - 7, p. 60; Amsterdam, Kolon. Museum - 7, p. 60; omgev. Chaam - 6, p. 35; Gorssel - 7, p. 77; Nieuw Beerta - 6, p. 32; Oosterhout, "Oosterhout"

- 13, p. ??; Wageningen - 8, p. 15; Wolfheze, omgev.
 "Buunderkamp" (overgangsvorm naar *L. rhacodes*) - 6, p. 73.
- Lepiota pseuco-lilacea* Huijsman: omgev. 's-Gravenhage (foutief als *L. lilacea*, nadere informatie) - 9, p. 67.
- Lepiota pudica*: Zie *Lepiota naucina*.
- Lepiota rhadoces* (Vitt.) Quél.: Verschil t.o. *Lepiota procera* - 7, p. 60; Amsterdam, Reinier Vinkeleskade - 7, p. 60; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; Eindhoven - 19, p.63.
- Lepiota rubella* Bres.: Baarn, Cantonspark, kas - 18, p. 47; Rotterdam, Blijdorp, kas (voorlopige determ.) - 16, p. 18.
- Lepiota rubens*: foute determinatie, nadere informatie - 9, p. 67.
- Lepiota seminuda*: zie *Lepiota sistrata*.
- Lepiota setulosa* Lange: Oostkapelle, "Berkenbosch" (nadere informatie) - 9, p. 67.
- Lepiota sistrata* (Fr.) Quél. (*Lepiota seminuda*): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; omgev. Hilversum - 9, p. 45; Oosterhout, "Oosterhout" -13, p. 42; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Texel, omgev. Fonteinsnol -7, p. 35, 49; omgev. Winterswijk -11, p. 19.
- Lepiota subincarnata* Lange: omgev. Bloemendaal (nadere informatie) - 9, p. 67.
- Lepiota vittadinii*: Zie *Aspidella vittadinii*.
- Lepiota spec.* beschrijving - 5, p. 4-5; Amsterdam, "Artis" - 15, p. 4.
- Lepiota spec.*: Hengelo, bloemenkas - 14, p. 6*.
- Lepista gilva* (Pers. ex Fr.) Konr. (*Clitocybe splendens*) - omgev. 's-Gravenhage - 6, p. 38.
- Lepista inversa* (Scop. ex Fr.) Pat. (*Clitocybe flaccida* Fr. non Bres., *Clitocybe inversa*): Hilversum-Baarn - 13, p. 19; 14, p. 77; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; Vogelenzang - 5, p. 66.
- Leptonia anatina* (Lasch) Quél.; Ruurlo, kasteel "Ruurlo" - 4, p. 27.
- Leptonia chalybaea* (Pers. ex Fr.) Quél.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" -17, p. 8.
- Leptonia euchroa* (Pers. ex Fr.) Gill.: Baarn, Baarnse bos ("Groeneveld"?) - 6, p. 24; Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 40; Bergen-Schoorl - 5, p. 80; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; omgev. Chaam - 6, p. 35;

- Epse, Epser bos - 10, p. 41; Gorssel, "'t Amelte" - 12, p. 20; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 6, p. 38; omgev. Oisterwijk - 11, p. 62; Oldeberkoop (nadere informatie) - 7, p. 34; Ulvenhout - 2, p. 45; Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
- Leptonia kervernii* Guern.: omgev. Ruurlo - 4, p. 27.
- Leptonia lampropoda* (Fr.) Quél.: Hooge Vuursche, Blauwe Koepel - 6, p. 25; omgev. Ruurlo - 4, p. 27; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p. 4*.
- Leptonia lampropus*: zie *Leptonia lampropoda*.
- Leptonia parasitica*: zie *Claudopus parasiticus*.
- Leptonia sarcita* (Fr.) Quél.: Hoogezand - 4, p. 30; Zeist - 4, p. 30.
- Leptonia sericella* (Bull. ex Fr.) Barbier (*Rhodophyllus sericellus*): Eindhoven - 7, p. 46; Eindhoven, Kanaaldijk - 19, p. 64; Gorssel, "'t Amelte" - 12, p. 20.
- Leptonia serrulata* (Pers. ex Fr.) Quél. (*Rhodophyllus serrulatus*): omgev. Bussum - 14, p. 77; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; omgev. Ruurlo - 4, p. 27.
- Leptopodia ephippium* (Lév.) Boud. (*Helvella ephippium*): beschrijving & afb. - 14, p. 74; Amsterdam, IJbos - 14, p. 74; Valkenburg - 14, p. 74; Wassenaar, "Raaphorst" (niet: Leiden) - 15, p. 5.
- Leptoporus fodinarum* (Vel.) Pilát: omgev. Valkenburg - 10, p. 29.
- Leptosphaeria acuta* (Moug. et Nestl.) Karst.: beschrijving - 18, p. 29; Doorn - 18, p. 29; Wageningen - 18, p. 29.
- Leptosphaeria doliolum* (Pers. ex Fr.) Ces. et De Not.: beschrijving & afb. - 18, p. 27, 29; omgev. Wageningen - 18, p. 29.
- Leucocoprinus cepaestipes*: zie *Lepiota cepaestipes*.
- Leucopaxillus albissimus* (Peck) Sing. (*Leucopaxillus paradoxus*): Bergen, Verbrande Pan - 3, p. 75; Schoorl (?) - 5, p. 39; Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87; 8, p. 16*.
- Leucopaxillus paradoxus*: zie *Leucopaxillus albissimus*.
- Leucoscypha leucotricha* (Alb. et Schw. ex Fr.) Boud.: Baarn, Soestdijk - 13, p. 28; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 40; 13, p. 28.
- Limacella delicata* (Fr.) Earle (*Lepiota delicata*): Hengelo, bloemenkas - 14, p. 5*.
- Limacella guttata* (Pers. ex Fr.) Konr. et Maubl. (*Lepiota lenticularis*): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Appelsga - 6, p. 56; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; 5, p. 39.
- Limacium*: zie *Hygrophorus*.

- Lycogala epidendrum* (L.) Fr. (Myxomycetes): omgev. Haarlem - 5, p. 18;
Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
- Lycoperdon bovista*: zie *Calvatia bovista*.
- Lycoperdon caelatum*: zie *Calvatia bovista*.
- Lycoperdon ericetorum* Pers. (*Lycoperdon furfuraceum*): Gorssel - 7, p. 77;
Valkenswaard - Heeze (nadere informatie) - 14, p. 60.
- Lycoperdon excipuliforme*: zie *Calvatia excipuliformis*.
- Lycoperdon furfuraceum*: zie *Lycoperdon ericetorum*.
- Lycoperdon gemmatum*: zie *Lycoperdon perlatum*.
- Lycoperdon giganteum*: zie *Calvatia gigantea*.
- Lycoperdon perlatum* Pers. (*Lycoperdon gemmatum*): De Bilt,
"Beerschoten" - 18, p. 7.
- Lycoperdon pyriforme* Willd. ex Pers.: Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 6,
p. 22; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18.
- Lycoperdon saccatum*: zie *Calvatia excipuliformis*.
- Lyophyllum aggregatum* (Schaeff. ex Secr.) Kühner (*Tricholoma*
cryptarum, *Tricholoma hortense*): beschrijving keldervorm - 8, p.
55; 's-Gravenhage(?) - 8, p. 55; Haarlem, stadstuin - 3, p. 11.
- Lyophyllum cinerascens* (Bull. ex Quél.) Konr. et Maubl. (non Fr.)
(*Tricholoma cinerascens*, *Tricholoma conglobatum*) (N.B. ongeldige
combinatie, moet feitelijk herdoopt worden): Beekhuizen - 5, p. 40;
Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; omgev. Bussum - 5, p. 40; Delden,
"Twickel" - 12, p. 16; Olterterp - 7, p. 35; Paterswolde, "De Braak"
(vermoedelijk, nadere informatie) - 7, p. 34; Tilburg, Bredase weg -
11, p. 63; De Vuursche, Lage Vuursche - 6, p. 30.
- Lyophyllum immundum* (Berk.) Kühner (*Tricholoma immundum*):
verschil t.o. *Tricholoma semitale*, *infumatum*, *trigonosporum* - 13,
p. 27.
- Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner (*Tricholoma infumatum*): verschil
t.o. *Tricholoma immundum*, *semitale*, *trigonosporum* - 13, p. 27;
Doetinchem, "Slangenburger" - 7, p. 56; Hulshorst - 13, p. 27.
- Lyophyllum leucophaeatum* (Karst.) Karst. (*Clitocybe gangraenosa*):
Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67.
- Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kühner (*Tricholoma cartilagineum*):
Doetinchem - 10, p. 37.
- Lyophyllum semitale* (Fr.) Kühner (*Tricholoma semitale*): verschil t.o.
Tricholoma immundum, *infumatum*, *trigonosporum* - 13, p. 27.

- Lyophyllum trigonosporum* (Bres.) Kühner (*Tricholoma trigonosporum*)
(identiek met *Lyophyllum transforme* (Britz.) Sing.): verschil t.o.
Tricholoma immundum, infumatum, semitale - 13, p. 27.
- Lyophyllum ulmarium* (Bull. ex Fr.) Kühner (*Pleurotus ulmarius*):
Amsterdam, binnenstad - 7, p. 61; Heemstede, "Groenendaal" - 5, p.
33.
- Lysurus australiensis* Cooke et Mass. (*Anthurus australiensis*): verzoek om
conservering & afb. - 3, p. 13; Beuningen - 2, p. 85; 3, p. 2;
11, p. 30; Hengelo - 11, p. 30; Hoogezand - 4, p.16; 11, p. 30;
Oosterwijk - 11, p. 30.
- Macrocyttidia cucumis* (Pers. ex Fr.) Heim (*Naucoria cucumis, Nolanea
pisciodora*): beschrijving & afb. - 6, p. 28-29; *Nolanea*-kenmerken -
6, p 27-29; Breda - 6, p. 29; Bussum - 6, p. 29; Hulshorst - 3, p. 76;
Olterterp - 6, p. 27, 38; De Steeg, "Middachten" - 5, p. 60; 6, p. 29, 38;
8, p. 18; Zwolle - 6, p. 29.
- Macropodia corium* (Weberb.) Sacc. ; Eindhoven-Acht - 17, p. 6; omgev.
Valkenswaard - 14, p. 60.
- Macropodia macropus* (Pers. ex Fr.) Fuck. (*Helvella macropus*): Baarn,
"Groeneveld" - 10, p. 39; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere
informatie) - 6, p. 33; omgev. Eindhoven -15, p. 31; Eindhoven,
"Eckart" - 17, p. 7; omgev. De Lutte - 10, p. 36; Wassenaar, "Duinrel"
- 14, p. 78.
- Marasmius amadelphus* (Bull. ex Fr.) Fr. Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere
informatie) - 8, p. 29.
- Marasmius androsaceus* (L. ex Fr.) Fr.: Bergen-Schoorl - 5, p. 60.
- Marasmius bulliardii* Quél.: Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28.
- Marasmius candidus* (Bolt. ex) Fr.: foute determinatie - 20. p. 71.
- Marasmius caulicinalis*: zeer waarschijnlijk verschrijving voor *M.
cauticinalis*, zie *Xeromphalina cauticinalis* (N.B. *Marasmius
caulicinalis* - *Crinipellis stipitarius*).
- Marasmius cohaerens* (Alb. et Schw. ex Fr.) Quél.: Amerongen - 7, p. 35;
omgev. Haarlem - 6, p. 39; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25;
Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67; Oldeberkoop (nadere
informatie) - 7, p. 34; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; 5, p. 38.
- Marasmius confluens* (Pers. ex Fr.) Quél.: Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p.
30; Oosterhout, "Oosterhout" - 12, p. 30; 13, p 41, 42.
- Marasmius erythropus* (N.B. dubieuze naam, misschien bedoeld *Collybia*

- acervata): 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" (onzeker) - 6, p. 38;
Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
- Marasmius fusco-purpureus (Pers. ex Fr.) Fr. - Wolfheze, "Buunderkamp"
- 8, p. 17.
- Marasmius globularis: zie Marasmius wynnei.
- Marasmius graminum (Lib.) Fr.: habitustekening - 10, p. 22; Eindhoven,
"Eckart" - 17, p. 7; Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p.
29.
- Marasmius hudsonii Pers. ex Fr.) Fr.: Warmond, "Huis te Warmond" - 2,
p. 66.
- Marasmius impudicus Fr.: Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17.
- Marasmius lupuletorum (Weinm.) Bres. (N.B. of wellicht bedoeld
Marasmius torquescens Quél.): Kennemerland (Bloemendaal?) - 4,
p. 61.
- Marasmius menieri Boud.: omgev. Breda- 18, p. 3.
- Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr.: omgev. Amersfoort - 2, p. 11;
Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8,
p. 67; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; Bloemendaal(?) - 5, p. 93;
omgev. Haarlem - 5, p. 18, 93; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26;
Wekerom (nadere informatie) - 18, p. 35.
- Marasmius perforans (Hoffm. ex Fr.) Fr.: De Lutte, omgev. Paasberg en
Hakenberg - 19, p. 11.
- Marasmius peronatus (Bolt. ex Fr.) Fr. (Marasmius urens): omgev.
Maarsbergen - 17, p. 25.
- Marasmius quisquiliaris Schweers: Nijmegen - 10, p 37, 52 (als M. spec.):
11, p. 43.
- Marasmius ramealis (Bull. ex Fr.) Fr.: Oostkapelle, "Berkenbosch en
"Westhoven" (nadere informatie)- 8, p. 29.
- Marasmius recubans Quél. (non sensu Lange): Walcheren (waar?) - 5,
p.31.
- Marasmius rotula (Scop. ex Fr.) Fr.: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg -
8, p. 67; Gieten - 9, p. 12; Haarlem, stadstuin - 3, p. 11; Utrecht,
"Rhijnauwen" - 19, p. 23.
- Marasmius scorodonius (Fr.) Fr.: Texel, omgev. Fonteinsnol - 7- p. 49.
- Marasmius stipitarius: zie Crinipellis stipitarius.
- Marasmius tenacellus (Pers. ex Fr.) Favre (Collybia tenacella):
(N.B. polymorphe soort, die in drie subspecies is onderverdeeld,

- welke hier niet nader onderscheiden kunnen worden): Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66:
 Vogelenzang (onzeker) - 14, p. 30.
- Marasmius tricolor* (Alb. et Schw. ex Fr.) Kühner (*Omphalia tricolor*):
 Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64; Gennep - 9, p. 39; 20, p. 47.
- Marasmius urens*: zie *Marasmius peronatus*.
- Marasmius varicosus* Fr.: Delden, "Twickel" - 3, p. 76; Markelo - 3, p. 73.
- Marasmius wynnei* Berk. et Br. (*Marasmius globularis*): Deventer-Lochem, omgev. "t Joppe" - 7, p. 24; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25, 61; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Slochteren, Slochterbosch - 6, p. 38.
- Marasmius spec.*: zie *Marasmius quisquiliaris*.
- Masseola crispa* (Wulf. ex Fr.) O. Kuntze (*Sparassis crispa*): Baarn-Hooge Vuursche - 6, p. 24; Beekhuizen - 5, p. 40; Bilthoven, De Pan - 18, p. 8; omgev. Chaam - 6, p. 35; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 78.
- Melachroia xanthomela* (Pers. ex Fr.) Boud.: Breda, Mastbosch - 15, p. 11; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7.
- Melampsora helioscopiae* (Pers.) Cast.: aecid., uredin., telium:
 Wageningen, Dorskamp, Eng - 19, p. 41.
- Melampsora larici-populina* Kleb.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 41.
- Melampsora lini* (Pers.) Desmaz.: uredin., telium; Wageningen, Binnenveld - 19, p. 41.
- Melampsorella symphyti* (D. C.) Búbak: uredin.; Doorwerth, "Zalmen" - 19, p. 41.
- Melampsorium betulinum* (Pers.) Kleb.; uredin., telium: Bennekom, Oostereng - 19, p. 41; Wageningen - 19, p. 41.
- Melanogaster ambiguus* (Vitt.) Tul.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 17, p. 64.
- Melanoleuca brevipes* (Bull. ex Fr.) Pat. (*Tricholoma brevipes*): Bilthoven, Panbos - 19, p. 23; Hengelo - 18, p. 53; Vogelenzang - 5, p. 93; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.
- Melanoleuca cnista* (Fr.) Pat. (*Tricholoma cnista*): 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 7, p. 35; Ruurlo, kasteel "Ruurlo" - 4, p. 27; Vogelenzang - 5, p. 66; Wassenaar, Meiendel - 7, p. 35.
- Melanoleuca excissa* (Fr.) Sing. (*Tricholoma excissum*): Bergen-Schoorl - 9, p. 29; omgev. Bussum - 14, p. 77.
- Melanoleuca grammopodia* (Bull. ex Fr.) Pat. (*Tricholoma*

- grammopodium): Walcheren (waar?) - 5, p. 31; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.
- Melanoleuca melaleuca* (Pers. ex Fr.) Murr. (*Tricholoma melaleucum*): Vogelenzang - 5, p. 66; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49; Zeist - 6, p. 71.
- Melanoleuca oreina* (Pers. ex Fr.) Kühner et Maire (*Tricholoma humile sensu Ricken, Tricholoma oreinum*): Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49; 6, p. 69 (onzeker).
- Merulius aurantiacus*: niet meer na te gaan wat bedoeld - 4, p. 61.
- Merulius domesticus*: zie *Gyrophana lacrymans*.
- Merulius lacrymans*: zie *Gyrophana lacrymans*.
- Merulius tremellosus* Schrad. ex Fr. : Loosduinen, "Ockenburg" - 11, p. 64; Maarn - 6, p. 37.
- Microglossum arenarium* Rostr.: Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66.
- Microglossum viride* (Pers. ex Fr.) Gill. (*Geoglossum viride*): Eindhoven, Rijkskrankzinnigengesticht - 19, p. 64.
- Mitrula abietis* Fr. (*Mitrula cucullata, Mitrula pusilla*): Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 13, p. 33*; Eindhoven - 15, p. 31.
- Mitrula cucullata*: zie *Mitrula abietis*.
- Mitrula fuispora* Preuss: omgev. Eindhoven - 16, p. 31; vondst herroepen, determinatie onjuist - 17, p. 6;
- Mitrula paludosa* Fr. ex Fr.: Bergeyk - 15, p. 31; Eindhoven - 15, p. 31; Maarn, Spoorloot - 13, p. 15; Oisterwijk - 15, p. 31; Oisterwijk, Kolkven - 14 p. 60; Renkum, Renkumsche beek - 9, p. 38; omgev. Valkenswaard - 3, p. 48; 14, p. 60; 15, p. 31; Waalre, Keersop - 17, p. 46; Wolfheze, Heelsumsche beek - 9, p. 38.
- Mitrula pusilla*: zie *Mitrula abietis*.
- Monilinia oxycocci* (Wor.) Honey (*Sclerotinia oxycocci*): beschrijving & afb. - 7, p. 75; Kootwijk - 7, p. 75.
- Monoicomyces homalotae* Thaxter. : habitustekening - 14, p. 58.
- Morchella conica* (Pers. ex Fr.) Quél.: Bloemendaal (?) - 5, p. 93; Hoogezand - 10, p. 63, 64*.
- Morchella deliciosa* Fr.: habitustekening - 11, p. 6.
- Morchella distans* Fr.: habitustekening - 11, p. 8.
- Morchella elata* Fr.: Haren - 12, p. 79.
- Morchella esculenta* L. ex Fr.: Aerdenhout - 5, p. 18; Alkmaar, Alkmaarder hout - 2, p. 64; 15, p. 32; Amsterdam, "Artis" - 17, p. 24; Bloemendaal

- 5, p. 93; Chaam, "Valkenberg" - 6, p. 35; omgev. Eindhoven - 15, p.31; Heilo, Heiloër bosch - 2, p. 64; 's-Gravenhage, omgev. Haagsche Bosch - 12, p. 80; omgev. Haarlem - 5, p. 18; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 41; Rockanje, duinen (abusievelijk als *M. rotunda* overgenomen uit *Natura*, 1946, p. 111) - 17, p. 45; Veendam - 6, p. 18; omgev. Wageningen - 5, p. 93.
- Morchella gigas* Batsch ex Fr.: Schiedam, Sterrebos - 16, p. 18*.
- Morchella intermedia* Boud.: habitustekening - 11, p. 7.
- Morchella rimosipes* D.C. ex Fr.: Alkmaar - 4 p. 14: Amsterdam, "Artis" - 17, p. 24; Bloemendaal (?) - 5, p. 93; omgev. Haarlem 5, p. 18, 93; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Rijswijk - 5, p. 90*-91.
- Morchella rotunda*, foutief citaat uit *Natura* 1946, p.111: zie *Morchella esculenta*.
- Morchella vulgaris* (NB of synoniem van, of een vorm van *Morchella esculenta*): Oosterhout 10, p. 37; Veendam - 9, p. 49*.
- Mucilago spongiosa* (Leyss.) Morgan (*Spumaria alba*) (*Myxomycetes*): Amersfoort- Woudenberg, De Treek - 19, p. 23.
- Mucor macrocarpus* Corda: Rijswijk, Rijswijkse bos (vermoedelijk) - 6, p.70*.
- Mucor rouxii* (Calmette) Wehmer: habitustekening - 15, p. 27.
- Mutinus caninus* (Huds. ex Pers.) Fr. (*Phallus caninus*): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; omgev. Chaam - 6, p. 35; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Hengelo - 14, p. 17; De Lutte - 9, p. 10; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; omgev. Maarsbergen - 17, p. 26; omgev. Rijssen - 12, p. 14; Ulvenhout - 3, p. 32.
- Mycena acicula* (Schaeff. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" (nadere informatie): - 18, p. 53; omgev. Haarlem - 5, p. 18; omgev. De Lutte - 10, p. 36; Olterterp - 6, p. 38; Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.
- Mycena adonis* (Bull. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; 18, p. 52 (nadere informatie); Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 7; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; Gennep - 9, p. 39; 20, p. 47; Gieten - 9, p. 12; 12, p. 17.
- Mycena aetites* (Fr.) Quél. sensu Ricken (*Mycena ammoniaca*): Delden, "Twickel" - 12, p. 16.
- Mycena alcalina* var. *chlorinella*: zie *Mycena metata*.
- Mycena amicta* (Fr.) Quél. (*Mycena iris*): Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19;

- Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 20, p. 47; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39; 20, p. 47.
- Mycena ammoniaca*: zie *Mycena aetites*.
- Mycena arcangeliana* sensu Oort: zie *Mycena arcangeliana* var. *oortiana*, *Mycena arcangeliana* Bres. var. *oortiana* Kühner (*Mycena arcangeliana* sensu Oort): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Delft - 4, p. 46; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77; Paterswolde, "De Braak" - 5, tegenover p. 6*; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17; Zeist, Zeister bos - 6, p. 57.
- Mycena atro-alba* (Bolt. ex Fr.) Gill. sensu Ricken: habitustekening & microscop. details - 10, p. 22.
- Mycena aurantiomarginata* (Fr.) Quél. sensu Schroet. : Gorssel - 7, p. 24.
- Mycena avenacea* (Fr. sensu Schroet.) Quél.: Beverwijk-Bloemendaal - 6, p. 39; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Wekerom (nadere informatie) - 18, p. 34.
- Mycena calopus*: zie *Mycena inclinata*.
- Mycena candida* (Bres.) Kühner (*Omphalia candida*): beschrijving - 11, p. 44; voorkomen op *Symphytum officinale* - 11, p. 44; Aerdenhout, "Naaldenveld" - 11, p. 44; 's-Gravenzande, Staalduinen - 13, p. 14; Katwijk aan de Rijn, St. Willibrord College - 11, p. 44; Wassenaar, "Raaphorst" - 18, p. 9.
- Mycena chlorantha* (Fr. ex Fr.) Gill. sensu Oort: Vogelenzang, duinen - 5, p. 68; Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.
- Mycena cinerella* Karst. sensu Lange: beschrijving & afb: - 14, p. 63-64; Renkum "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; omgev. Stroe - 14, p. 63.
- Mycena collariata* Fr. (N.B. onvoldoend bekende soort): Geijsteren - 10, p. 37; Haarlem stadstuin - 3, p. 11.
- Mycena corticola* (Pers. ex Fr.) Quél.: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39.
- Mycena dissiliens*: dubieuze soort, te schrappen - 6, p. 55.
- Mycena epipterygia* (Scop. ex Fr.) Quél.: habitusfoto - 20, p. 57; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Vogelenzang - 5, p. 68.
- Mycena epipterygioides* Pearson: Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; Wassenaar, "Duinrel" - 12, p. 48.

- Mycena erubescens* v. Höhn. (*Mycena fellea* Lange): De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
- Mycena fagetorum* (Fr.) Gill.: Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Delden, "Twickel", - 12, p. 16; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" 11, p. 47.
- Mycena fellea* Lange: zie *Mycena erubescens*.
- Mycena fibula* (Bull. ex Fr.) Kühner var. *swartzii* (Fr.) Kühner (*Omphalia swartzii*): Oostkapelle, "Berkenbosch" (nadere informatie) - 8, p. 29.
- Mycena flavipes* Quél.: Beesd - 10, p. 37.
- Mycena flavo-alba* (Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32.
- Mycena flavomarginata*: naam bestaat niet, misschien bedoeld *Mycena citrinomarginata*? (nadere informatie) - 17, p. 7.
- Mycena galericulata* (Scop. ex Fr.) Quél.: omgev. Aalst - 14, p. 60; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Nieuw Beerta - 6, p. 32; Rijswijk - 9, p. 46; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 32.
- Mycena galopoda* (Pers. ex Fr.) Quél. (*Mycena galopus*): Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Tilburg - 11, p. 62.
- Mycena galopoda* var. *alba*: zie *Mycena galopoda* var. *candida*.
- Mycena galopoda* (Pers. ex Fr.) Quél. var. *candida* Lange (*Mycena galopoda* var. *alba*): Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Mycena galopus*: onjuiste schrijfwijze voor *Mycena galopoda*.
- Mycena gracilis* (Quél.) Kühner (*Omphalia gracilis*): Mook; Plasmolen, Hellekuil (nadere informatie) - 18, p. 3.
- Mycena gypsea* (Fr. sensu Ricken) Gill. (N.B. indien bedoeld *Mycena gypsea* sensu Lange, dan *Mycena olida* Bres.): Wassenaar, "Voor Linden" - 18, p. 75.
- Mycena gypsea* var.: zie *Mycena olida*.
- Mycena haematopoda* (Pers. ex Fr.) Quél. : Baarn, "Groeneveld" - 9, p. 28; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Vogelenzang - 5, p. 68.
- Mycena inclinata* (Fr.) Quél. (*Mycena calopus*): Ede, Hoekelom - 5, p. 42; Egmond aan de Hoef - De Franschman - 5, p. 60.
- Mycena iris*: zie *Mycena amicta*.
- Mycena lactea* (Pers. ex Fr.) Quél. (misschien *Mycena pithya*): Bergen, De

- Franschman - 7, p. 56.
- Mycena leptcephala* (Pers. ex Fr.) Gill. sensu Lange, A.H.Smith (N.B. bijgeval indentiek met *Mycena metata*?): Walcheren (waar?) - 5, p. 31.
- Mycena lineata*: zie *Mycena vitilis* var. *olivascens*.
- Mycena luteo-alba*: zie (vermoedelijk) *Mycena xantholeuca*.
- Mycena megaspora* Kauffm.: zie *Mycena permixta*.
- Mycena metata* (Fr.) Quél. sensu Schroet. (*Mycena alcalina* var. *chlorinella*): Valkenburg, Vogelsbosch - 10, p. 29.
- Mycena metata* sensu Lange, Oort, Ricken: zie *Mycena vitrea* var. *tenella*.
- Mycena olida* Bres.: Heilo, natuurmonument - 3, p. 76 (als *Mycena gypsea* var.).
- Mycena osmundicola* Lange: beschrijving - 11, p. 5; Amsterdam, Hortus, kas - 11, p. 17, p. 25; Eindhoven, kas - 19, p. 64; Utrecht, Hortus, kas - 13, p. 49*; Wijster, biol. station, kas - 11, p. 5.
- Mycena parabolica* sensu Lange: dubieuze naam; misschien identiek met *Mycena vitilis* f. *caespitosa*.
- Mycena pelianthina* (Fr.) Quél.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; 6, p. 38; Oldeberkoop (nadere informatie) - 7, p. 34; Olterterp - 6, p. 56; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Slochteren - 6, p. 56; Walcheren (waar?) - 5, p. 31.
- Mycena pelliculosa*: niet meer na te gaan welke soort bedoeld; *M. pelliculosa* sensu Lange = *Mycena epipterygioides* - 13, p. 19.
- Mycena permixta* (Britz.) Sacc. (*Mycena megaspora*): beschrijving - 12, p. 10-11; omgev. Wijster - 12, p. 10.
- Mycena pithya*: dubieuze naam, misschien bedoeld *Mycena lactea*.
- Mycena polygramma* (Bull. ex Fr.) Quél.: omgev. Amersfoort - 2, p. 11; omgev. Wageningen - 8, p. 35-36*.
- Mycena pterigena* (Fr.) Quél.: beschrijving & afb. - 16, p. 43-44; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39, 48; 20, p. 47.
- Mycena pura* (Pers. ex Fr.) Quél.: Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Overveen, "Elswout" (blauwe vorm) - 5, p. 38; Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.
- Mycena quisquiliaris* (Joss.) Kühner (*Omphalia quisquiliaris*): Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39; 18, p. 3 (nadere informatie); 20, p. 47.
- Mycena rorida* (Scop. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16.

- Mycena sanguinolenta* (Alb. et Schw. ex Fr.) Quél.: Amersfoort - 2, p. 12; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Mycena seynii* Quél.: habitusfoto - 7, p. 50; Aerdenhout - 1, p. 35; 3, p. 83; 4, p. 15 (vondst herroepen): Bloemendaal - 1, p. 35; 3, p. 83; Katwijk aan Zee - 1, p. 35; 3, p. 83; Loosduinen, "Ockenburgh" - 7, p. 35; 12, p. 66*; Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 20, p. 47; Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66, 83.
- Mycena speirea* (Fr.) Gill. sensu Ricken, Kühner (*Omphalia camptophylla*): Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 55; Gorssel, "Dorth" - 7, p. 56; Hatert - 14, p. 66; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
- Mycena viscosa* (Secr.) Maire: verschil t.o. *Mycena epipterygia* - 13, p. 32*; Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 13, p. 32.
- Mycena vitilis* (Fr.) Quél. f. *caespitosa* Kühner (misschien *Mycena parabolica* sensu Lange): Walcheren (waar?) - 5, p. 31.
- Mycena vitilis* (Fr.) Quél. var. *olivascens* (Quél.) Kühner (*Mycena lineata*): De Steeg "Middachten" - 6, p. 38.
- Mycena vitrea* (Fr.) Quél. sensu Ricken var. *tenella* (Fr.) Kühner (*Mycena metata* sensu Lange etc.): omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 33; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
- Mycena xantholeuca* Kühner (vermoedelijk *Mycena luteo-alba*): Delden, "Twickel" - 12, p. 16.
- Mycenula receptilibis*: twijfelachtige soort, misschien zelfs een *Collybia* uit de groep *tesquorum* - 7, p. 55; 13, p. 34; 20, p. 48.
- Mycogone perniciosus* Magn.: parasiet in champignoncultuur - 8, p. 46; parasiet op *Stropharia* - 12, p. 41.
- Mycorrhiza* op *Larix* - 9, p. 74*.
- Myriococcum praecox* Fr.: begeleider bij champignoncultuur - 8, p. 46.
- Myriostoma coliforme* (Dicks. ex Pers.) Corda: gelijkenis jeugd stadium met *Scleroderma vulgare* - 2, p. 44-45; oecologie - 6, p. 86; Aerdenhout, "Naaldenveld" (afwijking) - 11, p. 63; omgev. Bergen - 6, p. 86; omgev. Haarlem - 6, p. 86; Rockanje, duinen - 19, p. 24.
- Myxadium*: subgenus van *Cortinarius*.
- Naematelia encephala* (Pers. ex Fr.) Fr.: omgev. Oosterwolde - 5, p. 41.
- Naucoria amarescens*: zie *Alnicola amarescens*.

Naucoria arvalis: zie *Agrocybe arvalis*.
Naucoria bohémica: zie *Alnicola bohémica*.
Naucoria carpophila (Fr.) Quél.: beschrijving - 5, p. 57; Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Rijswijk, de "Voorden" - 5, p. 57.
Naucoria centunculus (Fr.) Quél.: Oosterhout, "Oosterhout" - 9, p. 39.
Naucoria conspersa sensu Lange: zie *Alnicola luteolofibrillosa*.
Naucoria crobula: zie *Deconica crobula*.
Naucoria cucumis: zie *Macrocystidia cucumis*.
Naucoria erinacea (Fr.) Gill.: diagnose & afb. - 18, p. 43-44; Delden -16, p. 44; Denekamp, "Breklenkamp" - 17, p. 43; Veenendaal, "Prattenburg" - 8, p. 17; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 31.
Naucoria escharoides: zie *Alnicola escharoides*.
Naucoria festiva: zie *Phaeocollybia festiva*.
Naucoria fulgens: zie *Flammula fulgens*.
Naucoria hilaris: zie *Phaeocollybia hilaris*.
Naucoria innocua (Lasch) Sacc.: Doetinchem - 10, p. 37.
Naucoria macrospora Lange: zie *Alnicola submelinoides*.
Naucoria myosotis (Fr.) Quél.: beschrijving & afb. - 6, p. 64-65: verschil t.o. *Naucoria arvalis*, *festiva*, *tenax* - 6, p. 64; Diever, "Berkenheuvel" - 12, p. 59; Oisterwijk, Campinaheide, Huisvennen 19, p. 64; Paterswolde "De Braak" - 6, p. 64.
Naucoria pediades: zie *Agrocybe pediades*.
Naucoria pellucida sensu Ricken: zie *Tubaria furfuracea*.
Naucoria pityrodes sensu Lange: vermoedelijk synoniem van *Flammula muricella* - 18, p. 3.
Naucoria scolecina: zie *Alnicola scolecina*.
Naucoria scolecina f. gracillima: zie *Alnicola scolecina f. gracillima*.
Naucoria scorpioides sensu Lange: zie *Alnicola bohémica*.
Naucoria semiorbicularis: zie *Agrocybe semiorbicularis*.
Naucoria siparia (Fr.) Gill.: omgev. Heeze - 8, p. 37; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39, 48; 20, p. 47; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23.
Naucoria tenax (Fr.) Gill.: verschil t.o. *Naucoria myosotis* - 6, p. 64.
Naucoria typhicola: zie *Conocybe typhicola*.
Nematoloma polytrichi: onjuiste schrijfwijze voor *Naematoloma*; zie *Hypholoma polytrichi*.
Neottiella ithacaensis (Rehm) Schweers (*Humaria ithacaensis*): nieuwe

- combinatie - 20, p. 49.
- Nidularia confluens* Fr. et Nordh.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Eindhoven - 7, p. 46.
- Nolanea araneosa* Quél.: Kootwijk - 7, p. 56.
- Nolanea cetrata* (Fr.) Quél.: omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.
- Nolanea clandestina* (Fr.) Gill. (*Rhodophyllus clandestinus*): Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23; omgev. Wijster, biol.station - 12, p. 58.
- Nolanea cocles* (Fr.) Gill. (*Rhodophyllus cocles*): Venraay, Oostrum - 14, p. 66.
- Nolanea hirtipes* (Schum. ex Fr.) Quél. (*Nolanea mammosa* sensu Ricken, *Rhodophyllus hirtipes*): 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 58.
- Nolanea icterina* (Fr.) Quél.: Eindhoven - 7, p. 46; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28.
- Nolanea infula* (Fr.) Gill. (*Rhodophyllus infulus*): omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 58.
- Nolanea inutilis* (Britz.) Sacc. et Trav. (*Rhodophyllus inutilis*): Gennep - 13, p. 34; 20, p. 48; Hatert, Hatertse broek - 18, p. 51.
- Nolanea limosa* (Fr.) sensu Ricken (N.B. waarschijnlijk identiek met *Nolanea versatilis*): beschrijving - 12, p. 58-59; omgev. Wijster, biol. station (onzeker) - 12, p. 58.
- Nolanea mammosa*: bedoeld sensu Ricken?, zie *Nolanea hirtipes*.
- Nolanea minuta* Karst. (*Rhodophyllus minutus*): Gennep - 18, p. 51; Gennep-Goch - 15, p. 11; 20, p. 49.
- Nolanea papillata* Bres. (*Rhodophyllus papillatus*): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 58.
- Nolanea pascua*: dubieuze naam, waarmee *Nolanea cetrata*, *hirtipes* en *staurospora* bedoeld kan zijn - 8, p. 31; 9, p. 71; 12, p. 16.
- Nolanea pisciodora*: zie *Macrocystidia cucumis*.
- Nolanea proletaria*: dubieuze naam, waarmee *Nolanea mammosa* en *staurospora* bedoeld kan zijn - 8, p. 39.
- Nolanea rickenii* (Romagn.) Konr. et Maubl. (*Rhodophyllus xylophilus* sensu Reijnders?): kenmerken & afb. sporen - 13, p. 31; omgev. Lunteren - 14, p. 27; omgev. Putten (vermoedelijk) - 13, p. 31.
- Nolanea staurospora* Bres. (*Rhodophyllus staurosporus*): Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 67; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 58.
- Nolanea strigosissima* Rea (*Rhodophyllus strigosissimus*): beschrijving

- 18, p. 51; Hatert, Hatertse broek - 15, p. 11; 18, p. 51.
- Nolanea versatilis* (Fr.) Gill.: beschrijving - 14, p. 63-64; Bilthoven, De Pan - 18, p. 7; omgev. Stroe - 14, p. 63.
- Nyctalis asterophora*: zie *Asterophora lycoperdoides*.
- Nyctalis parasitica*: zie *Asterophora parasitica*.
- Ochroporus conchatus* (Pers. ex Fr.) Schroet. (*Placodes salicinus*, *Polyporus conchatus*): Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; omgev. Tilburg(?) - 11, p. 61.
- Ochroporus pini* (Thore ex Fr.) Schroet. (*Trametes pini*): Delden, "Twickel" - 3, p. 75; 5, p. 41; 9, p. 18.
- Ochroporus robustus* (Karst.) Schroet.: Delden, "Twickel" - 7, p. 35.
- Ochroporus robustus* (Karst.) Schroet. f. *hippophaes* Donk (*Fomes robustus*, duindoornvorm): Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.
- Ochropsora sorbi* (Oud.) Dietel: aecid., uredin., telium: Oosterbeek, Duno - 19, p. 41.
- Octaviana asterosperma* Vitt.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.
- Octojuga spec.*: Venraay, Oostrum - 14, p. 66.
- Ombrophila bataillei* Boud.: Mook, Plasmolen, Hellekuil, St. Jansberg - 11, p. 43; 12, p. 43; 20, p. 46.
- Ombrophila clavus* (Alb. et Schw. ex Fr.) Cooke (N.B. waarschijnlijk identiek met *Cudoniella aquatica*): Mander, brongebied Mosbeek - 17, p. 38; Mook, Plasmolen - 17, p. 37; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 9, 39; 11, p. 43; 12, p. 43; 20, p. 46; Waalre - 15, p. 32; Waalre, Keersop - 17, p. 46.
- Ombrophila faginea* (Pers. ex Fr.) Boud.: beschrijving van grote vorm - 8, p. 67; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 8, p. 67; 9, p. 39.
- Omphalia asterospora* Lange: Schoorl, Zwanenvlak - 7, p. 55.
- Omphalia belliae* (Johnst.) Karst.: Baarn, "Pijnenburg" - 18, p. 47; omgev. Breda - 18, p. 3, 34; Naardermeer - 13, p. 26*; 18, p. 3; Vinkeveen, Botshol - 13, p. 25; 18, p. 3.
- Omphalia campanella*: zie *Xeromphalina campanella*.
- Omphalia camptophylla*: zie *Mycena speirea*.
- Omphalia candida*: zie *Mycena candida*.
- Omphalia cornui*: zie *Xeromphalina cornui*.
- Omphalia cyathella* Favre et Schweers: Geldermalsen - 18, p. 2.
- Omphalia demissa* (Fr.) Karst. (N.B. zie ook onder *Omphalia hepatica*): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.

- Omphalia dumosa*: zie *Omphalia ventosa*.
- Omphalia gibba*: zie *Delicatula gibba*.
- Omphalia gracilis*: zie *Mycena gracilis*.
- Omphalia griseo-pallida* (Desmaz.) Quél. : Wieringermeerpolder (waar?)
- 5, p. 72.
- Omphalia hepatica* sensu Batsch (N.B. dubieuze naam, misschien identiek met *Omphalia pyxidata*): Bergen, staatsbossen - 11, p. 42.
- Omphalia hepatica* (dubieuze naam: indien bedoeld sensu Ricken, dan *Omphalia demissa*): omgev. Epse of Gorssel - 12, p. 20.
- Omphalia hydrogramma*: zie *Clitocybe hydrogramma*.
- Omphalia integrella*: zie *Delicatula integrella*.
- Omphalia maura* (Fr.) Gill.: veldkenmerk lamelsplijting - 13, p. 37; Epse, Epser bos - 7, p. 9, 22; 10, p. 41; Epse; Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; Maarn-Driebergen - 14, p. 77; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.
- Omphalia mutilus*: zie *Pleurotus mutilus*.
- Omphalia offuciata* (Fr.) Gill.: Roermond 13, p. 34.
- Omphalia philonotis* (Lasch) Quél. (zie ook onder *Omphalia sphagnicola*): beschrijving - 11, p. 21; verschil t.o. *Omphalia sphagnicola* - 11, p. 21-22; 16, p. 9; Gennepe, Genneper veen - 11, p. 22*, 43; 20, p. 48; Haren, Hortus - 11, p. 21.
- Omphalia postii* (Fr.) Karst.; Mook, Plasmolen, omgev. St. Jansberg, De Diepen - 12, p. 6; 13, p. 34; 20, p. 48.
- Omphalia pyxidata* (Bull. ex Fr.) Quél.: Bergen, staatsbossen - 11, p. 42; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
- Omphalia quisquiliaris*: zie *Mycena quisquiliaris*.
- Omphalia rustica* (Fr.) Quél.; Bergen, staatsbossen - 11, p. 42; Olterterp - 6, p. 38.
- Omphalia scyphoides* (Fr.) Quél.: verschil t.o. *Pleurotus mutilus* - 8, p. 64; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; De Lutte - 9, p. 10.
- Omphalia sphagnicola* (Berk.) Karst. (N.B. wellicht slechts variëteit van, wellicht ook identiek met *Omphalia philonotis*): sporenmaten - 16, p. 9; verschil t.o. *Omphalia philonotis* - 11, p. 21-22; 16, p. 9; Eindhoven, Kanunnekesven - 19, p. 64; Hatert, Hatertse vennen - 9, p. 39; Hatert, Uivernest - 16, p. 9, 31; omgev. Krommenie (nadere informatie) - 17, p. 43.
- Omphalia striaepilea* (Fr.) Gill. sensu Karst.; Bergen, De Franschman - 7, p.

56.

- Omphalia swartzii*: zie *Mycena fibula* var. *swartzii*.
Omphalia tricolor: zie *Marasmius tricolor*.
Omphalia typhae Schweers: beschrijving - 6, p. 79-80; Schoorl, duinmoeras - 6, p. 80; 18, p. 3.
Omphalia umbellifera (L. ex Fr.) Quél. (*Omphalia viridis*): omgev. Enschede (nadere informatie) 17, p. 42; Haren, Hortus "De Wolf" - 20, p. 72; omgev. Helenaveen - 17, p. 23; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.
Omphalia ventosa (Bull. ex Fr.) Gill. (*Omphalia dumosa*): Bergen, staatsbossen - 11, p. 42-43.
Omphalia viridis sensu Lange: zie *Omphalia umbellifera*.
Onygena corvina Alb. et Schw. ex Fr.: diagnose - 17, p. 38; Aerdenhout "Naaldenveld" - 17, p. 38; Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; 17, p. 38; Eindhoven-Heeze - 17, p. 46; Westzaan - 17, p. 38.
Oospora (*Monilia*) *fimicola* (Cost. et Matr.) Cuboni et Megliola: begeleider champignoncultuur - 8, p. 46.
Otidea alutacea (Pers. ex Fr.) Boud.: omgev. Eindhoven - 15, p. 11, 32.
Otidea grandis (Pers. ex Cooke) Masee: Doetinchem, "Slangenburg" 7, p. 55.
Otidea leporina (Batsch ex Fr.) Fuck.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Texel, staatsbossen - 7, p. 35, 56.
Otidea onotica (Pers. ex Fr.) Fuck.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 6, p. 38; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Wassenaar, "Raaphorst" - 15, p. 5.
Oudemansiella mucida (Schrad. ex Fr.) v.Höhn. (*Armillaria mucida*): voorkomen op eik - 14, p.32; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; 5, p. 38; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p.32; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p.47; 18, p.9.
Oudemansiella radicata (Reih. ex Fr.) Sing. (*Collybia radicata*): Denekamp - 10, p. 40; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 31.
Oxyporus populinus (Fr.) Donk: Bergen-Schoorl - 5, p. 60.
Pachydisca nobilis Vel.: Oosterhout, "Oosterhout" (onzeker) - 17, p. 6.
Pachydisca umbilicata Le Gal: Nijmegen, Berg en Dal - 17, p. 6; Oosterhout, "Oosterhout" - 17, p. 6.
Pachyphloeus melanoxanthus Tul.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 17, p.64; 18, p. 34.
Panaeolina foenicisecii (Pers. ex Fr.) Maire (*Psilocybe foenicisecii*):

- beschrijving & ruwsporigheid - 4, p. 15-16; Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28; Veendam - 4, p. 15.
- Panaeolus campanulatus* (L. ex Fr.) Quél.: zie *Panaeolus sphinctrinus*.
- Panaeolus fimicola* (Fr.) Gill.: begeleider champignoncultuur - 8, p. 47; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45.
- Panaeolus papilionaceus* (Bull. ex Fr.) Quél.: begeleider champignoncultuur - 8, p. 47; Gorssel - 7, p. 77; Loosduinen, kassen - 3, p.77; Nieuw Beerta - 6, p.15, 32; Oostkapelle, "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 29.
- Panaeolus retirugis* (Fr.) Quél.: facultatief mestbewoner - 8, p. 40; Groesbeek - 13, p. 34.
- Panaeolus separatus*: zie *Anellaria semiovata*.
- Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quél. (*Panaeolus campanulatus*): facultatief mestbewoner - 8, p. 40; Bergen-Schoorl - 9, p. 68; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30; Haarlem, omgev. Haarlemmer Hout - 5, p. 57; Hengelo - 17, p. 43; omgev. Maarsbergen - 17, p. 24-25.
- Panaeolus subbalteatus* (Berk. et Br.) Sacc.: omgev. Stroe - 14, p. 63; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
- Panellus mitis* (Pers. ex Fr.) Sing. (*Pleurotus mitis*): verschil t.o. *Claudopus variabilis* en *Panus stipticus* - 5, p. 73-74*.
- Panellus stipticus* (Bull. ex Fr.) Karst. (*Panus stipticus*): verschil t.o. *Pleurotus mitis* - 5, p. 73-74; omgev. Amersfoort - 17, p. 10; omgev. Amsterdam - 17, p. 10; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; 's-Gravenzande, Staalduinen - 11, p. 65.
- Panellus stipticus* (Bull. ex Fr.) Karst. var. *albidotomentosus* (Cooke et Masee) Konr. et Maubl. (*Panus stipticus* var. *albidotomentosus*): 's Gravenzande, Staalduinen - 11, p. 65.
- Panus stipticus*: zie *Panellus stipticus*.
- Panus stipticus* var *albidotomentosus*: zie *Panellus stipticus* var. *albidotomentosus*.
- Papulospora byssina* Hotson: begeleider champignoncultuur - 8, p. 47; Naaldwijk - 8, p. 47.
- Patella albo-spadicea* (Grev.) Seaver: Kootwijk, staatsbossen - 12, p. 43.
- Paxillus atrotomentosus* (Batsch ex Fr.) Fr.: Breda, Mastbosch - 1, p. 53; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11.
- Paxillus extenuatus*: dubieuze naam; P. ext. Fr. = *Rhodopaxillus*

- mundulus; *P. ext. sensu* Ricken = *Clitocybe alexandri* - 11, p. 64-65.
- Paxillus involutus* (Batsch ex Fr.) Fr.: voorkomen op hout - 13, p. 35-36*, 56-57; voorkomen op boom - 14, p. 33; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Epe - 13, p. 35; omgev. Maarsbergen 17, p. 26; Rijswijk, "Te Werve" - 14, p. 33; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Ulvenhout - 1, p. 53; 3, p. 75; Wassenaar, "Raaphorst" - 13, p. 56.
- Paxillus panuoides* (Fr. ex Fr.) Fr.: voorkomen op dwarsliggers van coniferenhout - 6, p. 44; Amersfoort - 2, p. 12; Ter Apel - 2, p. 52; Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4; Beekhuizen - 5, p. 40; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Epse, Epser bos - 10, p. 41; 's-Gravenhage, binnenshuis - 16, p. 48; omgev. Haarlem - 6, p. 39; De Lutte - 9, p. 10; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; omgev. Valkenburg ("Bergwerk-form") - 10, p. 29; Winterswijk, Woold - 11, p. 17.
- Paxillus rhodoxanthus*: zie *Phylloporus rhodoxanthus*.
- Paxina compressa* Snijder: beschrijving - 8, p. 66; Doetinchem, "Slangenburg" - 8 p. 66; 13, p. 25.
- Paxina corium* (Weberb.) Seaver (*Cyathipodia corium*): Eindhoven - 15, p. 11.
- Paxina leucomelas* (Pers. ex) O. Kuntze (*Peziza leucomelas*): omgev. Chaam -6, p. 35.
- Paxina sulcata* (Pers. ex Fr.) O. Kuntze (*Acetabula sulcata*): Enschede, "Hooge Boekel" (nadere informatie) - 10, p. 58.
- Penicillium notatum* Westl.: habitustekening - 15, p. 29.
- Peniophora gigantea* (Fr.) Masee (*Corticium giganteum*): aantastingsbeeld bij Douglas-sparren - 8, p. 65; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; Putten, "Schovenhorst" - 8, p. 64.
- Peridermium oblongisporium* Fuckl.: waarschijnlijk aacid. stad. Van *Coleosporium senecionis* - 19, p. 40.
- Peridermium pini* (Willd.) Kleb.: aacid.: Bennekom - 19, p. 42; Wageningen - 19, p. 42.
- Peristomialis lepidula*: zie *Cyathicula lepidula*.
- Peristomialis marchantiae*: zie *Cyathicula marchantiae*.
- Peronospora violacea* Berk.: beschrijving & afb. - 14, p. 73; aantastingsbeeld bij *Knautia arvensis* - 14, p. 72; Bakkum - 14, p. 72.

- Peziza aurantia* Pers. ex Fr. (*Aleuria aurantiaca*): Ter Apel - 2, p. 52; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; omgev. Chaam - 6, p. 34-35; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Egmond aan Zee - 6, p. 72; Eindhoven - 7, p. 46.
- Peziza badia*: zie *Galactinia badia*.
- Peziza clypeata* Schw.: omgev. Breda - 18, p. 34.
- Peziza echinospora* Karst, (*Plicaria echinospora*) (N.B. misschien identiek met *Galactinia emileia* (Cooke) Boud.): Gorssel, "t Amelte" - 7, p. 56; Haren, Hortus - 10, p. 39.
- Peziza fructigena*: zie *Helotium fructigenum*.
- Peziza gerardi* Cooke: wellicht identiek met *Galactinia ionella*?
- Peziza hemisphaerica*: zie *Lachnea hemisphaerica*.
- Peziza leucomelas*: zie *Paxina leucomelas*.
- Peziza melaloma*: zie *Lachnea melaloma*.
- Peziza roseo-lilacina* Clements (*Lachnea roseo-lilacina*) (determinatie en plaats van de soort in het systeem onzeker): Epse, Epser bos -12, p. 6; Markelo - 11, p. 43; 12, p. 6; Mook, Plasmolen - 12, p. 6; 13, p. 34; 20, p. 48.
- Peziza rutilans* Fr. sensu Boud. (*Humaria rutilans*): Amsterdam - 8, p. 55; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 12, p. 24; Egmond aan de Hoef - De Franschman - 5, p. 60; omgev. Rijswijk - 11, p. 25.
- Peziza scutellata*: zie *Lachnea scutellata*.
- Peziza theleboloides*: zie *Humaria theleboloides*.
- Peziza tuberosa*: zie *Sclerotinia tuberosa*.
- Peziza vesiculosa*: zie *Aleuria vesiculosa*.
- Pezizella aspidiicola* (Berk. et Br.) Rehm.: Mook, Plasmolen, Hellekuil -9, p. 40, 48; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 20, p. 47.
- Phaeobulgaria inquinans* (Pers. ex Fr.) Nannf. (*Bulgaria inquinans*): omgev. De Lutte - 10, p. 36; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p. 47; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
- Phaeocollybia festiva* (Fr.) Heim (*Naucoria festiva*): verschil t.o. *Naucoria myosotis* - 6, p. 64.
- Phaeocollybia hilaris* (Fr. sensu Ricken) Romagn. (*Naucoria hilaris*): Egmond aan Zee, duinen - 7, p. 56.
- Phaeolepiota aurea* (Mattuschka ex Fr.) Maire (*Pholiota aurea*): Delden, "Twickel" - 5, p. 41.

Phaeolus rutilans: zie *Hapalopilus nidulans*.

Phallus caninus: zie *Mutinus caninus*.

Phallus hadriani (Vent.) Pers. (*Phallus iosmos*): verschil t.o. *Phallus impudicus* - 6, p. 6; 7, p. 38-39, 53-54*; omgev. Amersfoort - 14, p. 65; 's-Gravenhage - 6, p. 6; omgev. 's-Gravenhage ("Duinrel"?) - 6, p. 38; Huizen, haven - 10, p. 40; Voorne, Rockanje, duinen - 19, p. 24; Wassenaar, Meiendel - 19, p. 11; Wassenaar, "Voor-Linden" - 13, p. 76.

Phallus impudicus L. ex Pers. (*Ithyphallus impudicus*): verschil t.o. *Phallus hadriani* - 7, p. 38-39; 53-54; lengtedoorsnede ei - 11, p.51*-52*; vliegenbezoek op hoed - 3, p. 33; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Breda, Mastbosch (teratologicum) - 11, p. 12*; 's-Graveland, "Bantam" - 16, p. 46; Hulshorst - 12, p. 49; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; Mook, Plasmolen, St. Martensberg - 12, p. 30; Rozenburg, De Beer (zou *Ph. hadriani* kunnen zijn) - 2, p. 65; Ulvenhout - 3, p. 33, 75; Vaals, Drielandenpunt - 8, p. 27; Wassenaar, "Raaphorst" - 14, p. 78.

Phallus iosmos: zie *Phallus hadriani*.

Phellodon amicus (Quél.) Banker (*Hydnum amicum*): omgev. Bilthoven (onzeker) - 10, p. 40.

Phellodon melaleucus (Fr.) Karst. (*Hydnum melaleucum*): Amersfoort - 2, p. 12; omgev. Bilthoven - 10, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46.

Phellodon niger (Fr.) Karst. (*Hydnum nigrum*): omgev. Bilthoven - 10, p. 39; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 39.

Phellodon tomentosus (Fr.) Banker (*Hydnum tomentosum*): Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 46; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" -10, p. 29.

Phlebia aurantiaca: zie *Phlebia radiata*.

Phlebia radiata Fr, em. Donk (*Phlebia aurantiaca*): Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41; Wassenaar, "Raaphorst" - 12, p. 47; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.

Phlegmacium: subgenus van *Cortinarius*.

Pholiota aurea: zie *Pheaolepiota aurea*.

Pholiota aurivella (Batsch ex Fr.) Quél.: Amerongen - 7, p. 35; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; omgev. Haarlem - 14, p. 61; De Steeg,

- "Middachten", Middachter Allee - 8, p. 18; Vogelenzang - 5, p. 66;
Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9, 75.
- Pholiota caperata*: zie *Rozites caperata*.
- Pholiota cylindracea*: zie *Agrocybe aegerita*.
- Pholiota destruens* (Brond.) Quél.: habitusfoto- 19, p. 25; Aalst,
kistenfabriek - 14, p. 60; Berlicum, "Wamberg" - 5, p. 41;
Nieuwersluis, "Over-Holland" - 14, p. 77.
- Pholiota dura*: zie *Agrocybe dura*.
- Pholiota erebia*: zie *Agrocybe erebia*.
- Pholiota flammans* (Fr.) Quél.: Apeldoorn, "Berg en Bosch" - 12, p. 4;
Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7; Enschede, "Smalenbroek" - 9, p.
18; Gorssel, "'t Amelte" - 7, p. 24; De Lutte, omgev. Paasberg en
Hakenberg - 19, p. 11; omgev. Oosterwolde - 5, p. 41; Overveen,
"Elswout" - 6, p. 13.
- Pholiota marginata*: zie *Galerina marginata*.
- Pholiota mutabilis* (Schaeff. ex Fr.) Quél.: beschrijving & afb. - 9, p.
57-58; vegetatiefoto - 6, p. 1; omgev. Aalst - 14, p. 60; Amsterdam,
Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; omgev. Maarsbergen - 17, p. 24 25;
Nijmegen, "Duckenburg" (teratologicum) - 11, p. 43; omgev.
Wageningen - 9, p. 57.
- Pholiota mycenoides*: zie *Galerina mycenoides*.
- Pholiota ombrophila*: zie *Agrocybe ombrophila*.
- Pholiota praecox*: zie *Agrocybe praecox*.
- Pholiota praecox* subsp. *sphaleromorpha*: zie *Agrocybe sphaleromorpha*.
- Pholiota radicata*: zie *Hebeloma radicosum*.
- Pholiota spectabilis* (Fr.) Quél.: Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicks-
bosch" - 10, p. 29; Walcheren (waar?) - 5, p. 31; Wassenaar, "Voor-
Linden" - 18, p. 75.
- Pholiota squarrosa* (Pers. ex Fr.) Quél. Amersfoort - 2, p. 12; De Steeg,
Middachter Allee - 8, p. 18; Tilburg, Bredase weg - 11, p. 62;
Vogelenzang - 5, p. 66; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9, 75.
- Pholiota togularis*: zie *Conocybe togularis*.
- Pholiota tuberculosa* (Schaeff. ex Fr.) Gill.: Castricum, Geversduin - 6, p. 57;
Delden, "Twickel" - 7, p. 35.
- Pholiota unicolor*: zie *Galerina unicolor*.
- Phragmidium subcorticium* (Schrank ex) Wint.: aacid., uredin., telium:
Wageningen - 19, p. 40.

- Phragmidium violaceum* (Schultz) Wint.: Bilthoven, Panbos - 19, p. 23; aecid., uredin., telium: Bennekom - 19, p. 40; Wageningen, Dorskamp, Eng - 19, p. 40.
- Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.) Bres. (*Paxillus rhodoxanthus*): beschrijving - 12, p. 13; gelijkenis met *Tricholoma rutilans* - 12, p. 13; Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5, 12; Mook, Plasmolen, Kloosterberg - 16, p. 31; 20, p. 49.
- Piggotia astroidea* Berk. et Br.: beschrijving & afb. - 19, p. 8; conidiënstadium van *Dothidella ulmi* (Duv.) Wint. - 19, p. 8-9.
- Pilosace algeriensis* (Fr.) Quél. (*Stropharia epimyces*): (N.B. misschien een *Agaricus*): parasiet op *Coprinus atramentarius*, *comatus* - 5, p. 85; 's- Gravenzande, Stalduinen - 13, p. 43 (noot): Wageningen, bij de Rijn - 14, p. 30.
- Piptoporus betulinus* (Bull. ex Fr.) Karst. (*Polyporus betulinus*): voorkomen op beschadigde berken - 2, p. 79; Bilthoven, De Pan - 18, p. 8; Huis ter Heide, "Coburg" - 2, p. 79; Wassenaar, Meiendel - 6, p. 31*. *Pistillaria quisquiliaris*: zie *Typhula quisquiliaris*.
- Pistillaria setipes* Grev. (*Typhula grevillei*): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.
- Placodes salicinus*: zie *Ochroporus conchatus*.
- Pleurodon auriscalpium*: zie *Auriscalpium vulgare*.
- Pleurotellus acerosus* (Fr.) Konr. et Maubl. (*Pleurotus acerosus*): Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18; Winterswijk, Steengroeve - 11, p. 19.
- Pleurotellus septicus* (Fr.) Konr. et Maubl. (*Pleurotus septicus*): Oosterhout, "Oosterhout" - 11, p. 43; 12, p. 30; 13, p. 44.
- Pleurotus acerosus*: zie *Pleurotellus acerosus*.
- Pleurotus algidus*: zie *Acanthocystis algidus*.
- Pleurotus applicatus*: zie *Acanthocystis applicatus*.
- Pleurotus atro-caeruleus*: *Acanthocystis atro-caeruleus*.
- Pleurotus auriscalpium*: zie *Acanthocystis auriscalpium*.
- Pleurotus cornucopiae* (Paulet ex Pers.) Rolland (*Pleurotus cornucopioides*): beschrijving - 7, p. 74; Middelburg - 7, p. 74; Middelburg, "Veldzicht" - 8, p. 28; Oostkapelle, "Westhoven" - 7, p. 74.
- Pleurotus cornucopioides*: zie *Pleurotus cornucopiae*.
- Pleurotus corticatus*: zie *Pleurotus dryinus*.

- Pleurotus corticatus* var. *tephrotrichus*: zie *Pleurotus dryinus* var. *tephrotrichus*.
- Pleurotus dryinus* (Pers. ex Fr.) Quél. (*Pleurotus corticatus*): Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Ede, Hoekelom - 5, p. 42; omgev. Haarlem - 6, p. 39; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30; Wassenaar, "Rust en Vreugd" - 7, p. 35; Wassenaar, "Voor Linden" - 18, p. 9.
- Pleurotus dryinus* (Pers. ex Fr.) Quél. var. *tephrotrichus* (Fr.) Sacc. (*Pleurotus corticatus* var. *tephrotrichus*): Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 18, p. 34.
- Pleurotus lignatilis* (Pers. ex Fr.) Gill.: Boekel - 14, p. 66.
- Pleurotus mitis*: zie *Panellus mitis*.
- Pleurotus mutilus* (Fr.) Gill. sensu Joss.: verschil t.o. *Clitopilus cretatus* - 8, p. 47-48; verschil t.o. *Omphalia scyphoides* - 8, p. 64; begeleider champignoncultuur - 8, p. 47-48*; Bergen - 8, p. 63; Hatert, Hatertse vennen - 8, p. 63; 11, p. 42 (onzeker); omgev. Heeze - 8, p. 64; Naaldwijk - 8, p. 47.
- Pleurotus olearius*: zie *Clitocybe olearia*.
- Pleurotus ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Quél.: variabiliteit sporenkleur - 7, p. 42-44; aquarel (Verkade album) - 1, tegenover p. 42; habitusfoto -19, p.53: omgev. Aalst - 14, p. 60; Amersfoort - 2, p. 12; omgev. Amsterdam - 7, p. 42; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Ter Apel - 2, p. 51; Haren, Hortus (afwijking) - 7, p. 37*; Renkum, "Oranje Nassau Oord" - 7, p. 42; Rijswijk - 9, p. 46; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30; omgev. Wageningen - 20, p. 33.
- Pleurotus ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Quél. f. *pulmonarius* (Fr.) Pilát (*Pleurotus pulmonarius*): omgev. Wageningen - 7, p. 43.
- Pleurotus ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Quél. f. *salignus* (Pers. ex Fr.) Pilát: omgev. Wageningen - 7, p. 44*.
- Pleurotus palmatus*: zie *Rhodotus palmatus*.
- Pleurotus passeckerianus* Pilát: zie *Clitopilus pinsitus*.
- Pleurotus petaloides*: zie *Acanthocystis petaloides*.
- Pleurotus porrigens* (Pers. ex Fr.) Gill.: vegetatiefoto - 7, p. 48.
- Pleurotus pulmonarius*: zie *Pleurotus ostreatus* f. *pulmonarius*.
- Pleurotus septicus*: zie *Pleurotellus septicus*.
- Pleurotus serotinus*: zie *Acanthocystis serotinus*.

- Pleurotus spodoleucus* (Fr.) Quél.: Wageningen (onzeker) - 8, p. 33.
- Pleurotus ulmarius*: zie *Lyophyllum ulmarium*.
- Plicaria echinospora*: zie *Peziza echinospora*.
- Plicaria muralis*: dubieuze naam, die niet goed is te identificeren met een van de *Aleuria* en/of *Galactinia*-soorten der Franse school - 2, p. 6-9; 10, p. 11; 13, p. 29; 14, p. 60; 15, p. 32.
- Plicaria setosa*: zie *Lachnea setosa*.
- Plicaria vesiculosa*: zie *Aleuria vesiculosa*.
- Plicaria violacea* (Pers. ex Fr.) Fuck.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Eindhoven, Philipsbossen - 18, p. 34; Epse, Epser bos - 7, p. 23; 10, p. 41; Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35.
- Pluteolus aleuriatus*: zie *Bolbitius reticulatus*.
- Pluteus atromarginatus* (Sing.) Kühner: Gorssel, "'t Amelte" - 7, p. 24.
- Pluteus cervinus* (Schaeff. ex Secr.) Quél.: verschil t.o. *Pluteus pellitus* - 2, p. 36-37; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Sted. Mus. - 7, p. 59; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Ter Apel - 2, p. 36; omgev. Arnhem (nadere informatie) - 18, p. 35; Diepenveen - 7, p. 77; Gorssel - 7, p. 77; omgev. Haarlem - 5, p. 93; 15, p. 32; Loosduinen,, "Ockenburg" - 5, p. 93; omgev. Maarsbergen 17, p. 26; Mook - 11, p. 40; Wekerom (nadere informatie) - 18, p. 35.
- Pluteus chrysophaeus* (Schaeff. ex Lasch) Quél.: Ter Apel - 2, p. 51; Bloemendaal, Kraantjelek - 2, p. 51; Breda, Mastbosch - 2, p. 45; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; Heemstede, "Groenendaal" - 2, p. 51; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; 6, p. 13.
- Pluteus cinereo-fuscus* Lange: Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" (onzeker) - 12, p. 20.
- Pluteus granulatus* Bres.: Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Walcheren (waar?) - 5, p. 31.
- Pluteus hispidulus* (Fr.) Quél.: vindplaats onbekend (nadere informatie) - 18, p. 3.
- Pluteus leoninus* (Schaeff. ex Fr.) Quél.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; Delden, "Twickel" - 9, p. 18, Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18; omgev. De Lutte - 10, p. 36; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
- Pluteus lutescens* (Fr.) Bres. (*Pluteus nanus* var. *lutescens*): Best - 19, p. 63; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; Walcheren (waar?) - 5, p. 31.

- Pluteus nanus* (Pers. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 9, p. 18;
's-Gravenhage, "Meer-en Bosch" - 13, p. 56; Olterterp - 7, p. 35;
Wassenaar, "Raaphorst" - 3, p. 49.
- Pluteus nanus* var. *lutescens*: zie *Pluteus lutescens*.
- Pluteus patricias* (Schulzer) Sacc. : Mook, Mookerheide - 12, p. 48*.
- Pluteus pellitus* (Pers. ex Fr.) Quél.: beschrijving - 2, p. 36; verschil t.o.
Pluteus cervinus - 2, p. 36-37; Ter Apel - 2, p. 35; Bilthoven - 2, p. 35;
Denekamp - 2, p. 35; Hengelo - 2, p. 35; Ruurlo, "Medler" - 5, p. 55*;
Stadskanaal - 5, p. 55; Winterswijk - 2, p. 35; Zuidlaren -
5, p. 55; Zwolle - 2, p. 35.
- Pluteus petasatus* (Fr.) Karst.: Winterswijk, houtzagerij - 14, p. 32.
- Pluteus phlebophorus* (Ditmar ex Fr.) Gill.: Ter Apel - 2, p. 51; Oostkapelle,
omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28; Walcheren (waar?)
- 5, p. 31.
- Pluteus salicinus* (Pers. ex Secr.) Quél.: Heilo, natuurmonument - 3, p. 76;
Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; Overveen, "Elswout" - 5, p.
38; 6, p. 13.
- Pluteus semibulbosus* (Lasch) Gill.: Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p.
40; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42.
- Pluteus umbrinellus* (Sommerf.) Gill.: Doetinchem, "Slangenburger" - 13, p.
34; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40.
- Pluteus umbrosus* (Pers. ex Fr.) Quél. sensu Ricken (non Quél., nec Bres.)
Beesd, "Marieënweerd" - 19, p. 63; Drempt - 19, p. 62.
- Podoporia sanguinolenta* (Alb. et Schw. ex Fr.) v. Höhn.: gastheer van
Badhamia utricularis - 7, p. 77; Ruurlo, cycloonbos - 7, p. 77.
- Podoporia vitrea* (Fr.) Donk (*Polyporus adiposus*); Veenendaal,
"Prattenburg" - 8, p. 17.
- Podospora coprophila* (Fr.) Rehm: kenmerken & afb. - 17, p. 32-33.
- Polypilus frondosus* (Dicks. ex Fr.) Karst. (*Polyporus frondosus*): verschil
t.o. *Polyporus giganteus* - 5, p. 70*-71; voorkomen op beuk - 11, p.
27; Ruurlo, cycloonbos - 11, p. 27; Slochteren, Slochter bos - 6, p. 38.
- Polypilus giganteus* (Pers. ex Fr.) Donk (*Polyporus giganteus*): verschil t.o.
Polyporus frondosus - 5, p. 71*; Amsterdam, Leidsche Boschje - 11,
p. 24; Amsterdam Vondelpark - 8, p. 38; omgev. Baarn - 14, p. 77;
Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25; Renkum, "Oranje Nassau
Oord" - 11, p. 11; Ruurlo, "Groote Meene" - 5, p. 71; De Steeg,
"Middachten" - 6, p. 38.

Polyporus abietinus: zie Hirschioporus abietinus.
 Polyporus adiposus: zie Podoporia vitrea.
 Polyporus adustus: zie Bjerkandera adusta.
 Polyporus applanatus: zie Ganoderma applanatum.
 Polyporus arcularius Batsch ex Fr.: habitustekening - 10, p. 10; 12, p. 15; Delden, "Twickel" - 12, p. 16.
 Polyporus betulinus: zie Piptoporus betulinus.
 Polyporus brumalis Pers. ex Fr.: habitustekening - 10, p. 10; Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 18, p. 19.
 Polyporus caesius: zie Tyromyces caesius.
 Polyporus calceolus: zie Polyporus varius.
 Polyporus chioneus: zie Tyromyces semipileatus.
 Polyporus conchatus: zie Ochroporus conchatus.
 Polyporus cuticularis: zie Inonotus cuticularis.
 Polyporus elegans: zie Polyporusvarius subsp elegans.
 Polyporus fomentarius: zie Fomes fomentarius.
 Polyporus forquignonii Quél.: Haarlem, "Eindhovenout" - 5, p. 39; Overveen, "Elswout" - 5, p. 39.
 Polyporus frondosus: zie Polypilus frondosus.
 Polyporus fuliginosus: zie Ischnoderma resinosum.
 Polyporus fumosus: zie Bjerkandera fumosa.
 Polyporus fumosus var. fragrans: onbetekenende vorm van Bjerkandera fumosa.
 Polyporus giganteus: zie Polypilus giganteus.
 Polyporus hispidus: zie Inonotus hispidus.
 Polyporus lucidus: zie Ganoderma lucidum.
 Polyporus melanopus Sw. ex Fr.: 's-Gravenhage - 14, p. 66; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40.
 Polyporus mollis: dubieuze naam, misschien bedoeld Tyromyces fragilis? - 3, p. 66.
 Polyporus perennis: zie Polystictus perennis.
 Polyporus picipes Fr.: Nieuw Beerta - 6, p. 32; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40; Wageningen, Lexkesveer - 13, p. 30.
 Polyporus pubescens: zie Coriolus pubescens.
 Polyporus rufescens: zie Heteroporus biennis.
 Polyporus rutilans: zie Hapalopilus nidulans.
 Polyporus schweinitzii: zie Hapalopilus schweinitzii.

- Polyporus squamosus* (Huds. ex) Fr.: grote afmetingen - 16, p. 48; sporenproductie - 10, p. 65; gastheer van *Collybia tuberosa* - 5, p. 85; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; 7, p. 59; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; 's-Gravenhage - 16, p. 48; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; omgev, Haarlem - 5, p. 93; Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 92; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Overveen-Zandvoort - 17, p. 25; Rijswijk - 6, p. 31; Wassenaar "Raaphorst" - 12, p. 80; Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 9.
- Polyporus squamosus* (Huds. ex) Fr. f. *erectus* Bres.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 6, p. 38.
- Polyporus sulphureus*: zie *Tyromyces sulphureus*.
- Polyporus tuberaster* Jacq. ex Fr.: beschrijving - 13, p. 3-4; Alkmaar, Alkmaarder Hout (pseudo sclerotia) - 13, p. 2; Alkmaar, Alkmaarder Hout (vruchtlichaam) - 17, p. 38; Oegstgeest, "Oud-Poelgeest" (vruchtlichaam) - 13, p. 2*-3*.
- Polyporus unguatus*: zie *Fomes pinicola*.
- Polyporus varius* Pers. ex Fr. (*Polyporus calceolus*): omgev. Chaam (onzeker) - 6, p. 35; omgev, Ede (nadere informatie) - 18, p. 35; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13; De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.
- Polyporus varius* Pers. ex Fr. subsp. *elegans* (Fr.) Donk (*Polyporus elegans*): Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
- Polyporus versicolor*: zie *Coriolus versicolor*.
- Polyporus vulpinus*: zie *Inonotus vulpinus*.
- Polystictus cinnamomeus* (Jacq. ex Pers.) Sacc.: verschil t.o. *Polyporus perennis* - 12, p. 27; Delden - 12, p. 27; Deventer, park Brabant - 12, p. 27; Diepenveen, Molenweg - 12, p. 27.
- Polystictus perennis* (L. ex Fr.) Karst. (*Polyporus perennis*): verschil t.o. *Polyporus cinnamomeus* - 12, p. 27; gastheer van *Claudopus subdepluens* - 5, p. 85; Baarn, "Groeneveld" - 13, p. 10; Hilversum, Baarn - 13, p. 19.
- Poromyцена decipiens* v. Ov.: habitustekening & details - 9, p. 3.
- Poronia punctata* (L. ex Fr.) Fr.: beschrijving & afb. - 9, p. 68*, 69*, 70; verschil tussen fungi op konijnenmest en paardenmest - 9, p. 69-70; omgev. Bergen - 9, p. 29, 68-69; 11, p. 42.
- Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) Gilbert: diagnose 18, p. 18.
- Psalliota*: zie *Agaricus*.
- Psalliota ommophila*: zie *Agaricus xanthodermus* var. *ammophilus*.

Psalliota campestris var. *vaporaria*: zie *Agaricus villaticus*.
Psalliota cretacea: dubieuze naam, misschien bedoeld: *Agaricus xanthodermus*.
Psalliota echinata: zie *Lepiota echinata*.
Psalliota sylvatica var. *haemorrhoidaria*: zie *Agaricus haemorrhoidarius*.
Psathyra bifrons (Berk.) Sacc. (N.B. moet een *Psathyrella* worden?):
 Amsterdam, Vondelpark -5, p. 70.
Psathyra conopilea: zie *Psathyrella conopilea*.
Psathyra consimilis: zie *Psathyrella pygmaea*.
Psathyra fagicola (Lasch) Ricken (N.B. moet tot *Psathyrella* worden gerekend) : Doetinchem, "Slangenburg" - 7, p. 56.
Psathyra fibrillosa: zie *Psathyrella spadiceogrisea* var. *fibrillosa*.
Psathyra gossypina: zie *Psathyrella gossypina*.
Psathyra lactea Lange f. *virginica* Lange (N.B. moet een *Psathyrella* zijn?):
 Oosterhout, "Oosterhout" - 15, p. 11.
Psathyra nolintangere: zie *Psathyrella noli-tangere*.
Psathyra pennata: zie *Psathyrella pennata*.
Psathyra subatrata: zie *Psathyrella subatrata*.
Psathyra typhae: zie *Psathyrella typhae*.
Psathyra urticicola (Berk. et Br.) Sacc. (N. B. moet tot *Psathyrella* gerekend worden?) - Hatert - 14, p. 66.
Psathyra spec.: Geldermalsen - 18, p. 3.
Psathyrella atomata (Fr.) Quél.: verschil t.o. *Psathyrella gracilis* - 5, p. 57*-58*; Veendam - 5, p. 57-58. |
Psathyrella candolleana (Fr.) A.H.Smith (*Hypholoma candolleianum*):
 Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; 7, p. 60 (onzeker); Bloemendaal - 5, p. 93; Rijswijk, Hoornbrug - 5, p. 94.
Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konr. et Maubl. (*Hypholoma*, *Stropharia caput-medusae*): afb. sporen en cystiden - 8, p. 50; verschil t.o. *Stropharia jerdonii* - 6, p. 68; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 51.
Psathyrella casca (Fr.) Sing. (*Hypholoma cascum*): Boekel - 15, p. 11; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17 (naderhand herzien als *H. caput medusae*, zie aldaar).
Psathyrella caudata (Fr.) Quél.: Alkmaar - 7, p. 56.
Psathyrella conopilea (Fr.) Quél. (*Psathyra conopilea*): Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42; Rijswijk - 9, p. 46.
Psathyrella disseminata: zie *Coprinus disseminatus*.

- Psathyrella gossypina* (Bull. ex Fr.) Sing. (*Psathyra gossypina*): Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 17.
- Psathyrella gracilis* (Pers. ex Fr.) Quél.: verschil t.o. *Psathyrella atomata* - 5, p. 57-58*; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 8, p. 30; Veendam - 5, p. 57-58.
- Psathyrella hydrophila* (Bull. ex Fr.) Sing. (*Bolbitius hydrophilus*, *Hypholoma hydrophilum*): Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.
- Psathyrella hypsipoda* (Fr.) Konr. et Maubl. (*Stropharia hypsipoda*): Delden - 14, p. 8.
- Psathyrella jerdonii* (Berk. et Br.) Konr. et Maubl. (*Stropharia jerdonii*): beschrijving & afb. - 6, p. 66-67; verschil t.o. *Stropharia caput medusae* - 6, p. 68; Drouwen, Drouwenerzand - 6 p. 66.
- Psathyrella noli-tangere* (Fr.) Sing. (*Psathyra nolitangere*): beschrijving - 12, p. 59; omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 59.
- Psathyrella pennata* (Fr. sensu Ricken) Sing. (N.B. sensu Lange = *Drosophila plumulosa* Romagn.): Epse, Epser bos - 7, p. 9, 22; Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink" - 12, p. 20; *Psathyrella pygmaea* (Quél.) Sing. (*Psathyra consimilis*): Nijmegen, omgev. Waalbrug - 10, p. 37; 11, p. 40.
- Psathyrella scobinacea* (Fr.) Sing. (*Hypholoma melantinum*): beschrijving & afb. - 14, p. 57; Ruurlo, cycloonbos - 5, p. 43*; 14, p. 57.
- Psathyrella spadiceo-grisea* (Schaeff. ex Fr.) A.H.Smith (?*Psilocybe cernua*): Walcheren (waar?) - 8, p. 29.
- Psathyrella spadiceo-grisea* (Schaeff. ex Fr.) A.H.Smith var. *fibrillosa* (Pers. ex Fr.) Konr. et Maubl. (*Psathyra fibrillosa*): omgev. Wijster, biol. station - 12, p. 59.
- Psathyrella stipatissima* Lange (N.B. volgens Romagnesi synoniem van *Psathyra fasciculata* Bertrand, welke tot *Psathyrella* te rekenen): Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.
- Psathyrella subatrata* (Batsch ex Fr.) Gill. (*Psathyra subatrata*): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72; Winterswijk-Bekkendellen - 11, p. 17.

- Psathyrella typhae* (Kalchbr.) Sing. (*Psathyra typhae*): omgev. Breda - 18, p. 34; Geldermalsen - 10, p. 37; Schoorl, Overval - 7, p. 55.
- Pseudoplectania nigrella* (Pers. ex Fr.) Fuck.: Hilversum, "Zonnestraal" - 15, p. 32; Mook, Plasmolen - 10, p. 37; 12, p. 42; Mook, Plasmolen, St. Jansberg - 20, p. 47; Schoorl - 6, p. 90.
- Psilocybe ammophila* (Dur. et Lev.) Gill.: Walcheren, duinen - 5, p. 31.
- Psilocybe atro-brunnea* (Lasch) Gill.: Boxmeer (nadere informatie) - 18, p. 3.
- Psilocybe bullacea*: zie *Deconica bullacea*.
- Psilocybe callosa* (Fr.) Quél.: Wieringermeerpolder (waar?) - 5, p. 72.
- Psilocybe cernua*: dubieuze soort, waarschijnlijk identiek met *Psathyrella spadiceo-grisea*.
- Psilocybe coprophila*: zie *Deconica coprophila*.
- Psilocybe ericaea*: zie *Hypholoma ericaeum*.
- Psilocybe foenisecii*: zie *Panaeolina foenisecii*.
- Psilocybe physaloides*: zie *Deconica physaloides*.
- Psilocybe sarcocephala* (Fr.) Gill. (dubieus! *P. sarcocephala* sensu Lange = *Psilocybe spadicea*): Bergen-Schoorl - 5, p. 60; 9, p. 29; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Rotterdam - 16, p. 18; Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66.
- Psilocybe semilanceata* (Fr. ex Fr.) Quél. (foutief als *Ps. semilanceolata*): Beekhuizen - 5, p. 40.
- Psilocybe semilanceolata*: verschrijving voor *Psilocybe semilanceata*.
- Psilocybe spadicea* (Schaeff. ex Fr.) Quél. : De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; omgev. Haarlem - 14, p. 61; Hilversum, "Hilverbeek" - 18 p. 47.
- Psilocybe turficola* J.Favre: Hatert, Hatertse vennen - 15, p. 11.
- Psilopezia oocardii* (Kalchbr.) Sacc. (wellicht identiek met *Psilopezia aquatica* (Lam. et D.C. ex) Rehm?): Mook, Plasmolen, Groene Water, Sprengen - 16, p. 31; 20, p. 49.
- Ptychogaster albus* zie *Tyromyces ptychogaster*.
- Puccinia absinthii* D. C.: uredin., telium: Bennekom, Oude Tol - 19, p. 38.
- Puccinia acetosae* (Schum.) Körn.: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld, Grebbedijk - 19, p. 38.
- Puccinia aegopodii* (Schum.) Mart.: telium: Bennekom, Kerkhof, Nergena - 19, p. 38; Doorwerth, Onderlangs - 19, p. 38; Wageningen, Dorskamp, Eng - 19, p. 38.
- Puccinia antirrhini* Diet. et Holw. : uredin., telium: Wageningen,

- Arboretum - 19, p. 40.
- Puccinia calthae* Link.: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 39.
- Puccinia caricis*: zie *Puccinia urticae-caricis*.
- Puccinia centaureae* D.C. : uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 38.
- Puccinia cichorii* (D.C.) Bell.: uredin., telium: Wageningen, Dijkgraaf, Eng - 19, p. 38.
- Puccinia cirsii-lanceolati* Schroet. : aecid., uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 38.
- Puccinia coronata* Corda: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 39.
- Puccinia cyani* (Schleich.) Pass.: uredin., telium; Wageningen, Eng - 19, p. 38.
- Puccinia deminuta* Vleugel: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 39.
- Puccinia dispersa* Erikss.: aecid.: Bennekom - 19, p. 39; Wageningen, Eng - 19, p. 39; uredin, telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 39.
- Puccinia fusca* (Pers.) Wint.: telium: Bennekom, Nergena - 19, p. 38; Doorwerth, Onderlangs - 19, p. 38.
- Puccinia glechomatis* D.C.: telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 39.
- Puccinia glumarum* (Schmidt) Erikss. et Henn.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 39.
- Puccinia graminis* Pers.; uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven, Nude - 19, p. 38; aecid.: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 38.
- Puccinia magnusiana* Körn.: verschil t.o. *Puccinia phragmitis* - 20, p. 50*-51; uredin., telium: Wageningen, Grift: 20, p. 50.
- Puccinia malvacearum* Mont.: telium: Wageningen, Dijk - 19, p. 39.
- Puccinia maydis* Bereng.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 39.
- Puccinia menthae* Pers.: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 38.
- Puccinia opizii* Bubák: aecid.: Wageningen - 19, p. 39.
- Puccinia phragmitis* (Schum.) Körn.: verschil t.o. *Puccinia magnusiana* -20, p. 50*-51; telium: Doorwerth, De Zalmen - 19, p. 39; Wageningen, Binnenveld - 19, p. 39; telium, uredin.; Bennekom - 20, p 49; Doorwerth - 20, p. 49; Neerijnen - 20, p. 49; Wageningen - 20, p. 49.

- Puccinia polygoni* Alb. et Schw.: zie *Puccinia polygoni-amphibii*.
- Puccinia polygoni-amphibii* Pers. (*Puccinia polygoni*): uredin., telium:
Wageningen, Binnenveld, Grift - 19, p. 39.
- Puccinia pruni-spinosae* Pers.: uredin., telium; Wageningen, Binnenhaven
- 19, p. 38.
- Puccinia ribesii-caricis* Kleb.: aacid.: Wageningen, Lage Steeg - 19, p. 39.
- Puccinia schoeleriana* Plowr. et Magn. : omgev. Haarlem - 5, p. 18;
Vogelenzang - 5, p. 18.
- Puccinia silvatica* Schroet.: aacid., uredin., telium: Doorwerth, De Zalmen
- 19, p. 39.
- Puccinia smilacearum-digraphidis* Kleb. : aacid.: Wageningen, Bergrand
- 19, p. 39.
- Puccinia suaveolens* (Pers.) Rostr.: aacid., uredin., telium; Wageningen,
Binnenhaven, Binnenveld - 19, p. 38.
- Puccinia tanacetii* D.C.: uredin., telium: Renkum, "Oranje Nassau Oord"
-19, p. 38.
- Puccinia taraxaci* (Reb.) Plowr.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven
- 19, p. 38.
- Puccinia thalictri* Chev.: telium: Wageningen, Binnenveld: 19, p. 38.
- Puccinia triticina* Erikss.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven -19,
p. 39.
- Puccinia urticae-caricis* (Schum.) Reb. (*Puccinia caricis*): aacid., uredin.,
telium: Doorwerth, Onderlangs, De Zalmen - 19, p. 39; Rhenen -18,
p. 28; Wageningen, Binnenhaven, Binnenveld, Grebbedijk - 19, p.39.
- Pulvinula constellatio* (Berk. et Br.) Boud. (*Barlaea constellatio*): Hengelo -
12, p. 24.
- Pulvinula haemastigma* (Hedw.) Boud. (*Barlaea*, *Peziza convexella*):
Eindhoven, Rijkskrankzinnigengesticht - 19, p. 64; Mook,
Plasmolen, Groene Water - 12, p. 24; 20, p. 48.
- Pustularia patavina* (Cooke et Sacc.) Boud.: Eindhoven, Oirschotse dijk -
19, p. 64.
- Pustularia stevensoniana*: dubieuze soort - 7, p. 56.
- Pustularia vesiculosa*: zie *Aleuria vesiculosa*.
- Pyronema confluens*: zie *Pyronema omphalodes*.
- Pyronema omphalodes* (Bull. ex Fr.) Fuck. (*Pyronema confluens*):
Wageningen, kas - 17, p. 34.
- Pythium spec.*: ontwikkelingsstadia - 17, p. 62; 18, p. 11.

- Rachomyces philonthinus* Thaxter: beschrijving & afb. (als *Rachomyces spec.*) - 13, p. 52-53; habitustekening - 14, p. 71.
- Rachomyces spec.*: beschrijving & afb. - 13, p. 52-53; blijkt te zijn *R. philonthinus* - 14, p. 57*.
- Ramaria aurea* (Schaeff. ex Fr.) Quél. (*Clavaria aurea*): Amersfoort - 2, p. 12.
- Ramaria botrytis* (Pers. ex Fr.) Ricken (*Clavaria botrytis*): omgev. Bilthoven - 10, p. 40.
- Ramaria cristata*: zie *Clavulina cristata*.
- Ramaria flaccida* (Fr.) Ricken (*Clavaria abietina* f. *flaccida*): Hooge Vuursche - 19, p. 67.
- Ramaria flava* (Pers. ex Fr.) Quél.: omgev. Delden - 14, p. 51.
- Ramaria formosa* (Pers. ex Fr.) Quél.: omgev. Delden - 14, p. 51.
- Ramaria mairei* Donk (*Clavaria pallida*): beschrijving - 14, p. 51; omgev. Delden - 14, p. 51.
- Ramaria ochraceo-virens* (Jungh.) Donk (*Clavaria abietina*): Amersfoort -2, p. 12; omgev. Delden - 14, p. 51; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 42.
- Ramaria stricta* (Pers. ex Fr.) Quél.: Nieuw Beerta - 6, p. 32.
- Reticularia lycoperdon* Bull. (*Myxomycetes*): Wageningen - 9, p. 57.
- R(h)acodium cellare* Pers. ex Pers. (*mycelium sterile*): Maastricht - 10, p. 65.
- Rhizina inflata*: zie *Rhizina undulata*.
- Rhizina undulata* Fr. ex Fr. (*Rhizina inflata*): parasiet op dennen - 12, p. 46*; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; omgev. Eindhoven -15, p. 31; Epse, Epser bos - 7, p. 10, 23; 10, p. 41; Hilversum, Spanderswoud - 7, p. 35; Lheebroekerzand - 16, p. 46; Loosduinen, "Ockenburg" - 12, p. 46; Markelo- Rijssen - 12, p. 14; Oisterwijk, Campinaheide - 19, p. 64; Wassenaar, Meiendel - 13, p. 15.
- Rhizophydium acuforme* (Zopf) Fischer (foutief als *Rh. pollinis*): omgev. Enschede - 17, p. 21*, 32.
- Rhizophydium pollinis*: onjuiste determinatie: zie *Rhizophydium acuforme*.
- Rhizopogon luteolus* Fr. et Nordh.: Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; Eindhoven, Oirschotse dijk - 17, p. 64; Hilversum-Saarn - 13, p. 19.
- Rhizopogon rubescens* Tul.: Oisterwijk - 17, p. 64; St. Michielsgestel -19, p.

63.

Rhodopaxillus irinus (Fr.) Kühner (*Tricholoma irinum*): Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; Egmond aan de Hoef, De Franschman - 5, p. 60; omgev. Haarlem - 6, p. 39; Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; Vogelenzang - 6, p. 39.

Rhodopaxillus mundulus: zie *Clitopilopsis mundulus*.

Rhodopaxillus nudus (Bull. ex Fr.) Maire (*Tricholoma nudum*): habitustekening - 10, p. 22; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; omgev. Haarlem - 5, p. 93; Loosduinen, "Ockenburg" - 5, p. 92; Rijswijk - 9, p. 46; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.

Rhodopaxillus panaeolus (Fr.) Maire (*Tricholoma panaeolum*): omgev. Nijmegen - 6, p. 22; Walcheren (waar?) - 5, p. 31; Wassenaar, Meiendel - 3, p. 49.

Rhodopaxillus saevus (Fr.) Maire (*Tricholoma personatum* en var. *anserinum*): Delft(?) - 4, p. 46; Delft - 7, p. 32; Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19; Noordbroek - 6, p. 32; Spaarndam, IJpolder - 3, p. 64.

Rhodopaxillus sordidus (Fr.) Maire (*Tricholoma sordidum*): Bunnik, fort Vechten - 19, p. 23; Gorssel - "De Flesch" - 12, p. 19; Loosduinen, Kas - 3, p. 77; Rijswijk - 9, p. 46; Tilburg - 11, p. 61.

Rhodopaxillus truncatus (Schaeff. ex Fr.) Maire (N.B. zie opm. bij *Tricholoma geminum*!): beschrijving - 7, p. 73; verschil t.o. *Hebeloma truncata* sensu Lange - 14, p. 56; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64; omgev. Gorssel - 7, p. 73.

Rhodophyllus: zeer zeker is het beter *Claudopus*, *Eccilia*, *Entoloma*, *Leptonia* en *Nolanea* tot een geslacht te verenigen; daarvoor mag om nomenclatorische redenen echter niet de naam *Rhodophyllus* gebruikt worden.

Rhodophyllus cancrinus: zie *Eccilia cancrina*.

Rhodophyllus clandestinus: zie *Nolanea clandestina*.

Rhodophyllus cocles: zie *Nolanea cocles*.

Rhodophyllus fernandae Romagn. (moet tot *Nolanea* gerekend worden): Genneper veen - 13, p. 34; 18, p. 51; 20, p. 48.

Rhodophyllus griseorubellus: zie *Eccilia griseo-rubella*.

Rhodophyllus hirtipes: zie *Nolanea hirtipes*.

Rhodophyllus infulus: zie *Nolanea infula*.

Rhodophyllus inutilis: zie *Nolanea inutilis*.
Rhodophyllus jubatus: zie *Entoloma jubatum*.
Rhodophyllus minutus: zie *Nolanea minuta*.
Rhodophyllus nigrellus: zie *Eccilia nigrella*.
Rhodophyllus papillatus: zie *Nolanea papillata*.
Rhodophyllus porphyrophaeus: zie *Entoloma porphyrophaeum*.
Rhodophyllus rhodocylix: zie *Eccilia rhodocylix*.
Rhodophyllus rhodopolium: zie *Entoloma rhodopolium*.
Rhodophyllus sericellus: zie *Leptonia sericella*.
Rhodophyllus serrulatus: zie *Leptonia serrulata*.
Rhodophyllus sphagneti: zie *Entoloma sphagneti*.
Rhodophyllus staurosporus: zie *Nolanea staurospora*.
Rhodophyllus strigosissimus: zie *Nolanea strigosissima*.
Rhodophyllus subnigrellus Romagn. (moet tot *Eccilia* gerekend worden):
Doetinchem - 18, p. 51; Doetinchem, Kruisberg - 15, p. 11.
Rhodophyllus undatus: zie *Eccilia undata*.
Rhodophyllus undatus (Fr.) Quél. var. *pusillus* Lange: moet tot *Eccilia*
gerekend worden): Hatert, Hatertse broek - 18, p. 51.
Rhodophyllus vilis: zie *Eccilia vilis*.
Rhodophyllus xylophilus Lange: sensu Reijnders, misschien identiek met
Nolanea rickenii?
Rhodophyllus (*Eccilia*) *spec.*: Mook, Plasmolen, Groene Water - 20, p. 48.
Rhodophyllus (*Entoloma*) *spec.*: Hatert, Hatertse vennen - 15, p. 11.
Rhodotus palmatus (Bull. ex Fr.) Maire (*Pleurotus palmatus*): beschrijving
- 5, p. 33; omgev. Amersfoort - 5, p. 33; Amsterdam - 5, p. 33; De Bilt
- 5, p. 33; omgev. Haarlem - 5, p. 33; Heemstede - 5, p. 33; omgev.
Rotterdam - 16, p. 18; Rozenburg (eiland, waar?) - 9, p. 41;
Wildervank (nadere informatie) - 7, p. 34; omgev. Wildervank - 12,
p. 49; Zuid-Beveland (waar?) - 5, p. 33.
Rhytisma acerinum Pers. ex Fr.: ontwikkelingsgeschiedenis - 9, p. 73;
Haarlem - 9, p. 73.
Ripartites tricholoma (Alb. et Schw. ex Fr.) Karst.: voorkomen in
combinatie met *Marasmius confluens* algemeen? - 12, p. 30, 49; 13,
p. 42; Apeldoorn, "Het Loo" - 12, p. 5, 30; Epse, Epser bos of Gorssel,
"t Hassink" - 12, p. 20, 30; Oosterhout, "Oosterhout" - 12, p. 30.
Rosellinia thelena (Fr.?) Rabenh.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" (nadere
informatie) - 18, p. 34.

- Rozites caperata* (Pers. ex Fr.) Karst. (*Pholiota caperata*): beschrijving & afb. - 7, p. 11-12; Bussum - 7, p. 12; Gieten (nadere informatie) -7, p. 11, 34; Gieten - 9, p. 12; 12, p. 17; Loenen - 7, p. 12; Vierhouten - 7, p. 12; Winterswijk - 7, p. 12.
- Russula*: determinatietabel - 20, p. 27-32.
- Russula adusta* (Pers. ex Fr.) Fr.: gastheer van *Nyctalis asterophora*, *parasitica*, *Collybia tuberosa* - 5, p. 84-85; omgev. Amersfoort - 2, p. 11.
- Russula aeruginea*. Lindbl. verschil t.o. *Russula heterophylla* -11, p. 36; Denekamp - De Lutte - 13, p. 48; omgev. Lunteren - 14, p. 26; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25.
- Russula albo-nigra* (Krombh.) Fr.: Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicks-bosch" - 10, p. 29.
- Russula alutacea* (Pers. ex Schw.) Fr.: Amersfoort - 2, p. 12.
- Russula amethystina* Quél. (= *Russula punctata* Krombh. sensu Sing.): kenmerken - 11, p. 38.
- Russula amoena* Quél.: kenmerken - 11, p. 39; omgev. Hilversum - 11, p. 39.
- Russula amoenata* Britz. (*Russula caerulea* sensu Cooke): kenmerken - 11, p. 39.
- Russula atro-purpurea* (Krombh.) Britz.: kenmerken - 11, p. 38-39; Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) 13, p. 10; Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
- Russula aurora* Krombh.: zie *Russula rosea*.
- Russula badia* Quél.: oecologie - 8, p. 52; onjuiste determinatie (nadere informatie) - 12; p. 56.
- Russula betulina*: zie *Russula venosa*.
- Russula brunneo-violacea* Crawsh.: kenmerken - 11, p. 39.
- Russula caerulea* sensu Cooke: zie *Russula amoenata*.
- Russula chamaeleontina* Fr: sensu Zvára, non Bres. (N.B. = *Russula punctata* Krombh. sensu Sing. ?): Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) - 13 p. 10; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13.
- Russula chloroides*: zie *Russula delicata* var. *glaucophylla*.
- Russula claroflava* Grove (*Russula flava*): geschiedenis naamgeving - 8, p. 51-52; veldkenmerk: grijs kleurende steel - 11, p. 38; oecologie -8,

- p. 52; Boxtel (nadere informatie) - 17, p. 45; Denekamp, omgev. "Natura Docet" - 13, p. 47; Lochem-Almen, "De Flesch" - 12, p. 19; Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 39; 20, p. 47; Oisterwijk (nadere informatie) - 17, p. 45; Oisterwijk, Kolkven - 11, p. 38; Oisterwijk, vennengebied - 8, p. 52; Valkenswaard (nadere informatie) - 17, p. 45; Wijster, vennengebied - 12, p. 59.
- Russula cyanoxantha* (Schaeff. ex Schw.) Fr.: veldkenmerk spekkige lamellen - 18, p. 74; vlees met FeSO₄ negatief of lichtgroen - 11, p. 36; verschil t.o. *Russula grisea* - 7, p. 72-73; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Denekamp - De Lutte - 13, p. 48; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Losser - 1, p. 6; omgev. Maarsbergen - 17, p. 25; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; Rijswijk, Rijswijkse bos (teratologicum) - 20, p. 52.
- Russula decolorans* (Fr.) Fr.: Delden, "Twickel" (nadere informatie) - 11, p. 37.
- Russula delicata* Fr.: gastheer van *Nyctalis parasitica* - 5, p. 85; Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28.
- Russula delicata* Fr. var. *glaucophylla* Quél. (*Russula chloroides*): gastheer van *Nyctalis parasitica* - 5, p. 85.
- Russula depallens*: dubieuze naam, maar vermoedelijk bedoeld sensu Ricken, zie *Russula vesca*.
- Russula drimeia*: zie *Russula sardonica*.
- Russula emetica* (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex S.F.Gray: Hollandsche Rading - Baarn - 2, p. 66.
- Russula exalbicans* (Secr.) Melz. et Zv.: Denekamp (nadere informatie) - 11, p. 38; Denekamp - Dinkel - 13, p. 47; Wassenaar, Meiendel (nadere informatie) - 11, p. 38.
- Russula farinipes* Romell: Hatert, Hatertse broek - 9, p. 39; Oostkapelle, "Westhoven" (nadere informatie) - 12, p. 57; Wijster, "Klencke" - 12, p. 60.
- Russula fellea* (Fr.) Fr.: veldkenmerk hard vlees, inktachtige geur - 12, p. 57; verschil t.o. *Russula ochroleuca* - 7, p. 74; Paterswolde (teratologicum) - 19, p. 16.
- Russula flava* (Romell) Romell: zie *Russula claroflava*.
- Russula foetens* (Pers. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. *Russula laurocerasi* - 8, p. 12*; gastheer van *Nyctalis parasitica* - 5, p. 85; omgev. De Lutte -

- 10, p. 36.
- Russula fragilis* (Pers. ex Fr.) Fr.: Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47; Ulvenhout - 3, p. 75.
- Russula grisea* (Pers. ex Secr.) Fr. sensu Gill.: verschil t.o. *Russula cyanoxantha* - 7, p. 72-73; Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 8, p. 29; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29; Rijswijk, "Overvoorde" (onzeker) - 9, p. 26; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28.
- Russula heterophylla* (Fr.) Fr. sensu J. Schaeffer: veldkenmerken - 11, p. 36; kweekproef - 3, p. 6; verschil t.o. *Russula aeruginea* - 11, p. 36; De Lutte - Denekamp - 13, p. 48.
- Russula integra* (L. ex Vitt.) Fr. sensu Maire, Melzer & Zvára, et. (N.B. wellicht beter *Russula polychroma* Sing.): Denekamp - De Lutte - 13, p. 48; Enschede-Glanerbrug - 13, p. 48.
- Russula laurocerasi* Melz.: verschil t. o. *Russula foetens* - 8, p. 12*; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Breda, Mastbosch - 8, p. 12; Swalmen, "Hillenraedt" - 10, p. 28; Ulvenhout - 8, p. 12.
- Russula lepida* Fr.: veldkenmerken - 11, p. 37; verschil t. o. *Russula aurora* - 11, p. 37; Breda, Liesbosch (nadere informatie) - 11, p. 37; Delden, "Twickel" (nadere informatie) 11, p. 37; Nijmegen, Beek (nadere informatie) - 11, p. 37.
- Russula lutea* (Huds. ex Fr.) S.F. Gray: Baarn, "Groeneveld"(onzeker?, nadere informatie) - 13, p. 10.
- Russula luteotacta* Rea: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64; Wassenaar, "Raaphorst" (waarschijnlijk) - 12, p. 56.
- Russula maculata* Quél.: Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 12, p. 57; Wassenaar, "Duinrel" (nadere informatie) - 12, p. 56.
- Russula melliolens* Quél.: kenmerken - 11, p. 38.
- Russula mustelina* Fr.: Wassenaar, Meiendel (zie Med. Ned. Myc. Ver.), blijkt foute determinatie - 11, p. 39.
- Russula nauseosa* (Pers. ex Schw.) Fr.: Doetinchem (nadere informatie) -12, p. 55; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63; omgev. 's-Gravenhage (nadere informatie) - 12, p. 55; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77.
- Russula nigricans* (Bull. ex Fr.): gastheer van *Nyctalis asterophora*, *parasitica*, *Collybia tuberosa* - 5, p. 85; kweekproef - 3, p. 6; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p. 47; omgev. Chaam - 6, p. 35; Gieten - 9,

- p. 12; Hilversum (teratologicum) - 15, p. 3-4*; Rijswijk, Rijswijkse bos (teratologicum) - 20, p. 52; Ulvenhout - 2, p. 45.
- Russula nitida* (Pers. ex Schw.) Fr.: Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" - 8, p. 29.
- Russula ochroleuca* (Pers. ex) Fr.: verschil t.o. *Russula fellea* -7, p. 74; *teratologicum* (identiteit onzeker) - 19, p. 15*.
- Russula paludosa* Britz.: veldkenmerken - 11, p. 37; oecologie - 8, p. 52; Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29.
- Russula parazurea* J. Schaeff.: omgev. Bussum - 14, p. 77.
- Russula pectinata* (Bull. ex) Fr.: Baarn, "Groeneveld" - 10, p. 39: omgev. Haarlem - 6, p. 12; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77.
- Russula pseudo-integra* Arn. et Gor. kenmerken - 11, p. 38; Nieuwersluis, "Over-Holland" - 19, p. 67.
- Russula puellaris* Fr.: verschil t.o. *Russula versicolor* 12, p. 54.
- Russula queletii* Fr.: verschil t.o. *Russula drimeia* - 12, p. 56: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 64.
- Russula raoultii* (Quél.) Sing.: Denekamp (nadere informatie) - 12, p.55; Gorssel (nadere informatie) - 12, p. 55; Winterswijk (nadere informatie) - 12, p. 55.
- Russula rosea* Quél. (*Russula aurora*): verschil t. o. *Russula lepida* - 11, p. 37; Breda, Liesbosch - 19, p. 63; omgev. De Lutte - 13, p. 48.
- Russula rubra* (Fr. sensu Krombh.) Fr. (N.B. tot veel verwarring geleid hebbende soort): omgev. Amersfoort - 2, p. 11.
- Russula sanguinea* (Bull. ex Foll.) Fr.: Renkum "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 47.
- Russula sardonica* Fr. (*Russula drimeia*): verschil t.o. *Russula queletii* -12, p. 56; omgev. Ruurlo (teratologicum) - 19, p. 15*-16; Wassenaar, "Duinrel" - 14, p. 77; Wouwsche Plantage - 12, p. 56.
- Russula solaris* Ferd. et Winge: Oostkapelle, "Berkenbosch" en "Westhoven" (nadere informatie) - 12, p. 57.
- Russula subfoetens* W. G. Smith: Oostkapelle, "Westhoven" (nadere informatie): - 18, p. 29; Ulvenhout - 2, p. 45.
- Russula turci* Bres. (= *Russula punctata* Krombh. sensu Sing.): veldkenmerk jodoformgeur - 13, p. 47; Denekamp-De Lutte - 13, p. 47.
- Russula velenovskyi* Melz. et Zv. : omgev. Denekamp - 13, p. 47;

- Oostkapelle, "Berkenbosch" (nadere informatie) - 12, p. 57;
 Wouwsche Plantage - 8, p. 52; Wijster, "Klencke" - 12, p. 60.
- Russula venosa* Vel. em. Melz. (*Russula betulina* Melz.; volgens Singer =
Russula sphagnophila Kauffm.): omgev. Denekamp - 13, p. 47;
 Oosterwijk, Belversven - 12, p. 54-55; Valkenswaard - 19, p. 63;
 Wassenaar, Meiendel 12, p. 54-55.
- Russula versicolor* J. Schaeff.: verschil t.o. *Russula puellaris* - 12, p.
 54; Oostkapelle, "Berkenbosch" (nadere informatie) - 12, p. 57;
 Roermond, "Ahrwinkel" en/of "Munnicksbosch" - 10, p. 29;
 Valkenswaard - 19, p. 63; Wolfheze, "Buunderkamp" - 8, p. 19
 (nadere informatie), 52.
- Russula vesca* Fr. sensu Maire, Bres., non Ricken (*Russula depallens* sensu
 Ricken): kenmerken - 11, p. 36; Baarn, "Groeneveld" (nadere
 informatie) - 13, p. 10; omgev. Denekamp - 13, p. 47; omgev.
 Maarsbergen - 17, p. 25; Ulvenhout - 1, p. 52; 3, p. 74.
- Russula veteriosa* Fr. sensu Bres., Quél.: De Bilt (nadere informatie) -12, p.
 56.
- Russula virescens* (Schaeff. ex Zanted.) Fr.: Denekamp-De Lutte - 13, p.
 48.
- Russula viscida* Kudrna: Valkenswaard - 19, p. 64.
- Russula xerampelina* (Schaeff. ex Secr.) Fr.: veldkenmerken - 11, p. 36-37;
 vlees intens groen met FeSO₄ - 11, p. 36; Apeldoorn, "Berg en
 Bosch" -12, p. 3; Baarn, "Groeneveld" (nadere informatie) - 13, p. 10.
- Russula spec.*: slakkenvraat - 6, p. 14*.
- Rutstroemia bolaris* (Batsch ex Fr.) Rehm: Amersfoort - 14, p. 66.
- Rutstroemia firma* (Pers. ex Fr.) Karst.: Delden, "Twickel" (nadere
 informatie) - 12, p. 42; omgev. Eindhoven - 15, p. 32.
- Rutstroemia sydowiana* (Rehm) White (*Ciboria sydowiana*): Mook,
 Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 40; 12, p. 42; 20, p. 48.
- Saccharomyces cerevisiae* Meyen: habitustekening - 15, p. 25.
- Sarcodon fennicus* (Karst.) Karst.: (waarschijnlijk foutief als *Hydnum*
scabrosum): omgev. Bilthoven - 10, p. 39.
- Sarcodon fuligineo-albus* (Schmidt ex Fr.) Quél.: omgev. Bussum - 14, p.
 77.
- Sarcodon imbricatus* (L. ex Fr.) Karst. (*Hydnum imbricatum*): Amerongen
 -7, p. 35; Beekhuizen - 5, p. 40; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 7, p.

- 46; omgev. Chaam - 6, p. 35; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7; Heilo, Heiloër bos - 17, p. 30.
- Sarcodon inopinatus* Donk (*Hydnum inopinatum*): habitustekening - 9, p. 71; Amersfoort, "De Boom" - 13, p. 10; omgev. Bilthoven - 10, p. 39; Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.
- Sarcodon mollis* (Fr.) Quél. (*Hydnum molle*): omgev. Chaam - 6, p. 35.
- Sarcoscypha radiculata* (Sow. ex Fr.) Sacc. var. *percevalii* (Phill.) Sacc. (*Discina radiculata* var. *percevali*): Walcheren, waterleidingsterrein (nadere informatie) - 6; p. 38.
- Schizophyllum commune* Fr.: beschrijving & afb. - 6, p. 7-8; omgev. Aalst - 14, p. 60; Ter Apel - 6, p. 7; Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 7.
- Scleroderma aurantium* (L. ex) Pers. (*Scleroderma vulgare*): gelijkenis met jonge *Myriostoma coliforme* - 2, p. 44-45; standplaats - 3, p. 79; gastheer van *Boletus parasiticus* - 5, p. 85; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Breda, Mastbosch - 3, p. 39; Delft, stadsplein - 17, p. 26; omgev. Stadskanaal - 6, p. 10-11*; Ulvenhout - 3, p. 74.
- Scleroderma bovista* Fr. : Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 76.
- Scleroderma verrucosum* Pers.: gastheer van *Boletus parasiticus* - 5, p. 85.
- Scleroderma vulgare*: zie *Scleroderma aurantium*.
- Sclerotinia candolleana* (Lév.) Fuck.: Mook, Plasmolen, Hellekuil - 11, p. 43; 12, p. 43.
- Sclerotinia kirschsteiniana* P.Henn.: beschrijving & afb. - 15, p. 9*-10; Naardermeer, Jan Hagenbos - 15, p. 9, 11.
- Sclerotinia oxycocci*: zie *Monilinia oxycocci*.
- Sclerotinia pseudo-tuberosa*: zie *Ciboria batschiana*.
- Sclerotinia rapulum* (Bull. ex Fr.) Rehm (*Tarsetta rapulum*): Bergen - 12, p. 42.
- Sclerotinia tuberosa* (Hedw.) Fuck. (*Peziza tuberosa*): Barneveld, Barneveldsche beek (nadere informatie) - 11, p. 20; omgev. Eindhoven - 15, p. 32; Eindhoven, "Eckart" - 17, p. 36: 's-Gravenhage, Haagsche Bosch - 13, p. 15; Vogelenzang - 17, p. 46.
- Selenaspora batava* Heim et Le Gal: beschrijving & afb. - 10, p. 5-8; Epse, Epser bos - 10, p. 4; 12, p. 42.
- Sepedonium chrysospermum* (Bull. ex) Fr.: imperfecte vorm van *Hypomyces chrysospermus*: parasiet op boleten - 12, p. 41.
- Sepultaria arenosa* (Fuck.) Rehm.: omgev. Acht (nadere informatie) - 19, p.

- 64; Doetinchem, "Slangenburg" - 9, p. 40; Eindhoven, Oirschotse dijk, Rijkskrankzinnigengesticht, "Wielewaal" (nadere informatie) - 19, p. 64.
- Sistotrema confluens* Pers. ex Fr.: De Steeg, "Middachten" - 8, p. 18.
- Slijmzwam: plasmodium stadium - 6, p. 81*.
- Sparassis crispa*: zie *Masseola crispa*.
- Spathularia clavata*: zie *Spathularia flavida*.
- Spathularia flavida* Pers. ex Fr. (*Spathularia clavata*): beschrijving & afb. - 17, p. 63-64; Eindhoven-Heeze - 17, p. 63; Utrecht, Oud Amelisweert - 17, p. 63.
- Spathularia neesii* Bres.: beschrijving - 17, p. 63.
- Sphaerobolus stellatus* Tode ex Pers.: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 8, p. 39; Best - 19, p. 64; Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19; Rotterdam, Kralinger Hout - 16, p. 18; Schoorl, staatsterreinen - 3, p. 66; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30; Wassenaar, "Duinrel" - 15, p. 6.
- Sphaerospora confusa* (Cooke) Sacc.; Epse, Epser bos - 7, p. 56; 12, p. 42; Mook, omgev. St. Jansberg - 12, p. 6.
- Sphaerospora trichispora* (Berk. et Fr.) Sacc.: Doetinchem, "Slangenburg" - 12, p. 25; 14, p. 66; Texel, De Geul - 3, p. 75.
- Spicaria tenuipes* (Peck) Petch: 's-Hertogenbosch(?) - 18, p. 45*; omgev. Turnhout - 18, p. 45.
- Spumaria alba* (Myxomycetes): zie *Mucilago spongiosa*.
- Stemonitis fusca* Roth (Myxomycetes): Haarlem, stadstuin - 3, p. 12.
- Stephanoma tetracoccum* van Zinderen Bakker: parasiet op *Geoglossum hirsutum* - 12, p. 39; Soest, Soesterveen - 12, p. 39.
- Stereum hirsutum* (Willd. ex Fr.) Fr.; voorkomen op eiken dwarsliggers - 6, p. 44; omgev. Aalst - 14, p. 60; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Haarlem, omgev. Haarlemmer Hout - 5, p. 57; Nieuw Beerta - 6, p. 32.
- Stereum purpureum* (Pers. ex Fr.) Fr.: omgev. Aalst - 14, p. 60; Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Haarlem, stadstuin - 3, p. 12; Nieuw Beerta - 6, p. 32.
- Stereum rugosum* (Pers. ex Fr.) Fr.: Haarlem, omgev. Haarlemmer Hout - 5, p. 57.
- Strobilomyces floccopus* (Vahl ex Fr.) Karst. (*Strobilomyces strobilaceus*):

- beschrijving & afb. - 8, p. 27-28; diagnose - 18, p. 18; Ubbergen - 18, p. 18; Vaals, Drielandenpunt - 8, p. 27.
- Strobilomyces strobilaceus*: zie *Strobilomyces floccopus*.
- Stropharia aeruginosa* (Curt. ex Fr.) Quél.: omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19; Rijswijk, Julianalaantje, "Overvoorde" - 8, p. 40; Wassenaar, "Raaphorst" - 8, p. 40; 18, p. 9.
- Stropharia caput medusae*: zie *Psathyrella caput-medusae*.
- Stropharia comtula*: zie *Agaricus comtulus*.
- Stropharia coronilla* (Bull. ex Fr.) Quél.: Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 41; Amsterdam, Vondelpark - 7, p. 59; omgev. Haarlem - 15, p. 32; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Nieuw Loosdrecht (nadere informatie) - 17, p. 44; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; Utrecht, "Rhijnauwen" - 19, p. 23; Zuid-Beveland, Kaloot, - 20, p. 71.
- Stropharia epimyces*: zie *Pilosace algeriensis*.
- Stropharia hypsipoda*: zie *Psathyrella hypsipoda*.
- Stropharia inuncta* (Fr.) Quél.: Deventer-Lochern, omgev. "'t Joppe" - 7, p. 23; omgev. Maarn - 14, p. 77; Pernis - 14, p. 30.
- Stropharia jerdonii*: zie *Psathyrella jerdonii*.
- Stropharia luteonitens* (Vahl ex Fr.) Quél.: Doorn-Maarn - 19, p. 11.
- Stropharia merdaria* (Fr.) Quél.: facultatief mestbewoner - 8, p. 39; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; Bilthoven, De Pan - 18, p. 8; Hilversum-Baarn - 13, p. 19; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
- Stropharia semiglobata* (Batsch ex Fr.) Quél. (*Stropharia stercoraria*): Amersfoort - 2, p. 12; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 39; omgev. Bergen - 9, p. 68; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 34; Hilversum-Baarn - 13, p. 19.
- Stropharia separata*: zie *Anellaria semiovata*.
- Stropharia squamosa* (Pers. ex Fr.) Quél.: Heelsum-Doorwerth - 13, p. 19.
- Stropharia stercoraria*: zie *Stropharia semiglobata*.
- Stylopaga hadra* Drechsler: Nematode-vangend apparaat - 17, p. 59*.
- Suillus castaneus*: zie *Gyroporus castaneus*.
- Suillus cyanescens*: zie *Gyroporus cyanescens*.
- Symplectromyces vulgaris* Thaxter: habitustekening - 14, p. 58.
- Tapesia hydrophila* (Karst.) Rehm: Geldermalsen - 11, p. 43.
- Taphrina aurea*: zie *Taphrina populina*.
- Taphrina populina* Schum. ex Fr. (*Taphrina aurea*): omgev. Haarlem - 5, p.

18.

Tarzetta rapulum: zie *Sclerotinia rapulum*.

Telamonia: subgenus van *Cortinarius*.

Tephrophana atrata: zie *Collybia atrata*.

Tephrophana palustris: zie *Collybia palustris*.

Thecopsora vacciniorum (Link) Karst.: uredin.: Renkum, Renkumsche beek - 19, p. 41.

Thelephora caryophyllea Schaeff. ex Fr.: De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 11.

Thelephora mollissima Pers. ex Fr.: Eindhoven, Oirschotse dijk - 19, p. 63.

Thelephora pallida Pers. ex Fr. (*Thelephora sowerbii* var. *pallida*): De Steeg, "Middachten" - 12, p. 26; Winterswijk - 12, p. 26.

Thelephora palmata Scop. ex Fr.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; omgev. Denekamp (vermoedelijk, nadere informatie) - 6, p. 34.

Thelephora sowerbii Berk. et Br.: beschrijving & afb. - 12, p. 26-27; Delden, "Twickel" - 5, p. 59; Heerde, Bakhuisbos - 12, p. 23, Heeze - 12, p. 49.

Thelephora sowerbii var. *pallida*: zie *Thelephora pallida*.

Trametes gibbosa (Pers. ex Fr.) Fr.: verschil t.o. *Daedalea quercina* - 8, p. 41*; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 38; 's-Gravenhage, "Clingendaal" - 11 p. 65.

Trametes mollis (Sommerf.) Fr.: Wageningen, Holleweg - 8, p. 19.

Trametes odora: zie *Trametes suaveolens*.

Trametes pini: zie *Ochroporus pini*.

Trametes serialis (Fr.) Fr.: De Steeg, "Middachten" - 6, p. 38.

Trametes suaveolens (Fr.) Fr. (*Trametes odora*): Druten, Leuven - 9, p. 39; Nijmegen, omgev. Waalbrug - 11, p. 40.

Trametes trogii Berk.: omgev. Valkenswaard - 3, p. 48.

Tremella foliacea Pers. ex Fr.: Amersfoort - 2, p. 12; Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 8; Terschelling, omgev. Hoorn - 20, p. 18; omgev. Tilburg - 11, p. 63; Wassenaar, "Duinrel" - 11, p. 65.

Tremella mesenterica Retz. ex Fr.: Denekamp. Breklenkamp - 17, p. 43; Wassenaar, Meiendel - 2, p. 66.

Tremella mycetophila Peck: teratologicum bij *Collybia dryophila* - 5, p. 72-73.

Tremella steidleri (Bres.) Bourd. et Galz.: Gennep. Ottersum - 17, p. 6; 20, p. 49.

Tremella tubercularia Berk.: Vierlingsbeek - 9, p. 39.

- Tremellodon gelatinosum* (Fr.) Pers.: Boxtel-Best, "Veldersbosch" - 17, p. 7; omgev. Chaam - 6, p. 35; Delden, "Twickel" - 5, p. 41; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7; Enschede, "Kromhof" - 9, p. 18*; De Lutte, omgev. Paasberg en Hakenberg - 19, p. 10; omgev. Oisterwijk - 11, p. 62; Olterterp - 6, p. 38; 7, p. 35.
- Tricharia fimbriata* (Quél.) Boud: Beugen - 12, p. 25.
- Tricharia gilva* Boud. : Wieringermeerpolder (waar?) - 12, p. 42.
- Trichoderma koningii* Oud: zie *Trichoderma viride*.
- Trichoderma viride* Pers. ex Fr. (*Trichoderma koningii*): begeleider champignoncultuur - 8, p. 48.
- Trichoglossum hirsutum* (Pers. ex Fr.) Boud. (*Geoglossum hirsutum*): Soest, Soesterveen - 12, p. 39.
- Tricholoma albo-brunneum* (Pers. ex Fr.) Quél.: Texel, staatsbossen - 6, p. 55; omgev. Winterswijk - 11, p. 17.
- Tricholoma album* (Schaeff. ex Fr.) Quél.: vegetatiefoto (identiteit onzeker) - 7, p. 2; Vogelenzang - 5, p. 66; Wassenaar, Meiendel, Kijfhoek - 14, p. 59; IJmuiden, "Heerenduin" - 14, p. 52.
- Tricholoma argyraceum*: zie *Tricholoma scalpturatum*.
- Tricholoma atosquamosum* (Chev.) Sacc.: Gorssel, "'t Joppe" - 12, p. 20.
- Tricholoma aurantium* (Schaeff. ex Fr.) Ricken: Wassenaar, "Duinrel" - 11, p. 65; 12, p. 48.
- Tricholoma brevipes*: zie *Melanoleuca brevipes*.
- Tricholoma carneum* (Bull. ex Fr.) Quél.: Baarn, "Groeneveld" , Torenlaan (nadere informatie) - 13, p. 10; Tilburg - 11, p. 62; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
- Tricholoma cartilagineum*: zie *Lyophyllum loricatum*.
- Tricholoma cinerascens*: zie *Lyophyllum cinerascens*.
- Tricholoma cingulatum*: zie *Tricholoma ramentaceum*.
- Tricholoma cnista*: zie *Melanoleuca cnista*.
- Tricholoma columbetta* (Fr.) Quél.: omgev. Amersfoort - 3, p. 79; Doorn-Maarn - 19, p. 11; omgev. Winterswijk - 11, p. 19.
- Tricholoma conglobatum*: zie *Lyophyllum cinerascens*.
- Tricholoma cryptarum*: onbetekenende, in het donker gegroeide, vorm van *Lyophyllum aggregatum*.
- Tricholoma elytroides* (Fr.) Karst.: omgev. De:Bilt (onzeker) - 6, p. 40.
- Tricholoma equestre* (L. ex Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Heilo,

- Heiloër bos - 17, p. 30; Wassenaar, "Duinrel" - 12, p. 48; Zeist - 6, p. 71.
- Tricholoma excissum*: zie *Melanoleuca excissa*.
- Tricholoma flavo-brunneum* (Fr. ex Fr.) Quél.: Beekhuizen: - 5, p. 40; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38.
- Tricholoma focale* (Fr.) Ricken: omgev. Hilversum - 9, p. 45.
- Tricholoma gambosum*: zie *Tricholoma georgii* f. *gambosum*.
- Tricholoma geminum* (Paul. ex Fr.) Gill. sensu Sev. Petersen: volgens Reijnders vermoedelijk juister dan *Rhodopaxillus truncatus* - 14, p. 56-57.
- Tricholoma georgii* (Clus. ex Fr.) Quél. f. *gambosum* (Fr.). Konr. et Maubl. (*Tricholoma gambosum*): Bergen, Bergerbos - 2, p. 64; Bloemendaal(?) - 5, p. 93; omgev. Haarlem - 5, p. 93; Oud Valkenburg, Sibber Grubbe - 18, p. 35; omgev. Wageningen - 5, p. 93; Wageningen, Grebbeberg - 9, p. 56.
- Tricholoma grammopodium*: zie *Melanoleuca grammopodia*.
- Tricholoma hortense*: zie *Lyophyllum aggregatum*.
- Tricholoma humile*: indien bedoeld sensu Ricken: zie *Melanoleuca oreina*.
- Tricholoma imbricatum* (Fr.) Quél.: Lunteren, "De Leperkoen" - 14, p. 25*, 27; Wassenaar, "Duinrel" - 7, p. 35; Wolfheze, "Buunderkamp" - 6, p. 39.
- Tricholoma immundum*: zie *Lyophyllum immundum*.
- Tricholoma inamoenum* (Fr.) Quél.: Wassenaar, "Raaphorst" - 14, p. 59; Wassenaar, "Voor-Linden" - 14, p. 60.
- Tricholoma infumatum*: zie *Lyophyllum infumatum*.
- Tricholoma inocybeoides* Pearson: beschrijving - 11, p. 20; IJmuiden, Heerenduin - 11, p. 20.
- Tricholoma ionides* (Bull. ex Fr.) Quél.: 's-Gravenhage, Nieuwe Scheveningsche Boschjes - 1, p. 57; omgev. Haarlem - 6, p. 39; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38, omgev. Ruurlo - 4, p. 27.
- Tricholoma irinum*: zie *Rhodopaxillus irinus*.
- Tricholoma leucocephalum* (Fr.) Quél. sensu Lange: omgev. Winterswijk (indien tenminste gedetermineerd met Lange): - 11, p. 19.
- Tricholoma leucocephalum* sensu Ricken: dubieus, volgens Konrad en Maublanc niet identificeerbaar: - 3, p. 75; 7, p. 35, 56.
- Tricholoma melaleucum*: zie *Melanoleuca melaleuca*.
- Tricholoma nudum*: zie *Rhodopaxillus nudus*.

- Tricholoma odoratum* (Cool) Konr. et Maubl. (*Lepiota odorata*): Baarn, omgev. "Groeneveld" - 9, p. 28.
- Tricholoma opaca* Schroeter et Nuesch: Oostkapelle, omgev. "Zeeduin" (nadere informatie) - 8, p. 28.
- Tricholoma oreinum*: zie *Melanoleuca oreina*.
- Tricholoma panaeolum*: zie *Rhodopaxillus panaeolus*.
- Tricholoma persicolor* (Fr.) Karst.: Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67.
- Tricholoma personatum*: zie *Rhodopaxillus saevus*.
- Tricholoma pessundatum* (Fr.) Quél. (*Tricholoma stans*): Epse, Epser bos of Gorssel, "'t Hassink": - 12, p. 20; omgev. Hilversum - 9, p. 45; omgev. Nijmegen - 6, p. 22.
- Tricholoma portentosum* (Fr.) Quél.: Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Zeist - 6, p. 71.
- Tricholoma ramentaceum* (Bull. ex Fr.) Ricken (*Armillaria ramentacea*, *Tricholoma cingulatum*): Bergen, Verbrande Pan: - 3, p. 75; Eindhoven, Philipsbossen - 17, p. 7.
- Tricholoma russula*: zie *Hygrophorus russula*.
- Tricholoma rutilans* (Schaeff. ex Fr.) Quél.: verschil t.o. *Phylloporus rhodoxanthus* - 12, p. 13; omgev. Amersfoort - 2, p. 11; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Overveen, "Elswout" - 6, p. 14; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 30.
- Tricholoma saponaceum* (Fr. ex Fr.) Quél.; Amersfoort - 2, p. 12; Hilversum- Baarn - 13, p. 19; Overveen, "Elswout": - 5, p. 38; Texel, staatsbossen - 6, p. 55.
- Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quél. (*Tricholoma argyraceum*): Breda, Mastbosch - 2, p. 45.
- Tricholoma sejunctum* (Sow. ex Fr.) Quél.: Gorssel, "'t Amelte" - 7, p. 24; Nieuwersluis, "Over-Holland": - 19, p. 67.
- Tricholoma semitale*: zie *Lyophyllum semitale*.
- Tricholoma sordidum*: zie *Rhodopaxillus sordidus*.
- Tricholoma squarrulosum* Bres.: Deventer-Lochern, omgev. "'t Joppe" - 7, p. 23; Wassenaar, Meiendel - 2, p. 66.
- Tricholoma stans*: zie *Tricholoma pessundatum*.
- Tricholoma terreum* (Schaeff. ex Fr.) Quél.: Bunnik, fort Vechten - 19,

- p. 23; Delden, "Twickel" - 12, p. 16; Markelo (teratologicum) - 19, p. 16; Overveen, "Elswout" - 5, p. 38; 6, p. 14; Wassenaar, "Duinrel" (teratologicum) - 20, p. 53.
- Tricholoma trigonosporum*: zie *Lyophyllum trigonosporum*.
- Tricholoma ustale* (Fr. ex Fr.) Quél.: Overveen, "Elswout" - 4, p. 47; 5, p. 38.
- Tricholoma vaccinum* (Pers. ex Fr.) Quél.: omgev. Rijssen - 12, p. 14.
- Tricholoma virgatum* (Fr.) Gill.: beschrijving - 9, p. 25; Delden, "Twickel" - 9, p. 18; Heerde, Wapenvelde - 9, p. 25; Hilversum, Bussumer Grintweg - 9, p. 44.
- Trichophaea woolhopeia*: zie *Lachnea woolhopeia*.
- Triphragmium ulmariae* (Schum.) Link: aecid., uredin., telium: Wageningen, Binnenveld - 19, p. 40.
- Tubaria autochthona* (Berk. et Br.) Sacc.: Oosterhout, "Oosterhout" - 11, p. 43; 13, p. 42.
- Tubaria furfuracea* (Pers. ex Fr.) Gill. (*Naucoria pellucida* sensu Ricken): Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 67; De Bilt, "Beerschoten" - 18, p. 7; Renkum, "Oranje Nassau Oord" of Wolfheze, "Buunderkamp" - 11, p. 48.
- Tubaria pellucida* (Bull. ex Fr.) Gill. sensu Romagn.: omgev. Wageningen - 20, p. 33.
- Tuber dryophilum* Tul.: Rotterdam, Kralinger Hout - 16, p. 17.
- Tulostoma brumale* Pers. ex Pers. (*Tulostoma mammosum*): Egmond aan Zee - 5, p. 65; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 61; Voorne, duinen Rockanje - 19, p. 24.
- Tulostoma granulatum* Lév.: Wassenaar, Meiendel - 14, p. 78.
- Tulostoma mammosum*: zie *Tulostoma brumale*.
- Tylopilus felleus* (Bull. ex Fr.) Karst. (*Boletus felleus*): diagnose - 18, p. 19-20; Amersfoort-Woudenberg, De Treek - 19, p. 23; Best (nadere informatie) - 17, p. 45; omgev. Eindhoven (nadere informatie) - 17, p. 45; Oirschot (nadere informatie) - 17, p. 45; Overveen, "Elswout" - 6, p. 13; Texel, staatsbossen - 6, p. 55; Wassenaar, "Duinrel" - 11, p. 65.
- Typhula erythropus* Pers. ex Fr. (*Cnazonaria erythropus*): beschrijving & afb. - 18, p. 14-15; Epse, Epser bos - 10, p. 41.
- Typhula grevillei*: zie *Pistillaria setipes*.
- Typhula juncea*: zie *Clavariadelphus junceus*.

- Typhula phacorhiza* (Reich. ex Fr.): beschrijving & afb. - 18, p. 14-15;
Baarn, "Groeneveld" - 18, p. 47; Vogelenzang - 5, p. 67-68*.
- Typhula quisquiliaris* (Fr. ex Fr.) Corner (*Pistillaria quisquiliaris*):
Aerdenhout, "Naaldenveld" - 5, p. 55; Boxtel-Best, "Veldersbosch" -
7, p. 46; Gieten - 9, p. 12*; Hooge Vuursche-Baarn - 19, p. 67; Mook,
Plasmolen - 5, p. 55: Mook, Plasmolen, Hellekuil - 9, p. 48; 20, p. 47;
De Vuursche, Lage Vuursche - 8, p. 31.
- Tyromyces caesius* (Schrad. ex Fr.) Murr. (*Polyporus caesius*): Overveen,
"Elswout" - 5, p. 39; De Punt, "De Poll" - 17, p. 65; Vijlen, Vijlener
bos - 10, p. 30.
- Tyromyces fragilis* (Fr.) Donk (?*Polyporus mollis*): Schoorl, staatsterreinen
- 3, p. 66.
- Tyromyces ptychogaster* (Ludwig) Donk (*Ceratomyces*, *Ptychogaster*
albus): Kennemerland: (Bloemendaal?) - 4, p. 61.
- Tyromyces semipileatus* (Peck) Murr. (*Polyporus chioneus*): omgev.
Oosterwolde - 5, p. 41.
- Tyromyces sulphureus* (Bull. ex Fr.) Donk (*Polyporus sulphureus*):
voorkomen op eiken dwarsliggers - 6, p. 44; omgev. Delden - 1, p.
29; Dwingelo (nadere informatie) - 16, p. 46; omgev. Haarlem - 5; p.
93; Heilo, Heiloër bos - 13, p. 30; Nijmegen, Nassaulaan - 13, p. 29;
omgev. Tilburg(?) - 11, p. 61; Voorst, "'t Schol" - 12, p. 75.
- Ulocolla saccharina*: zie *Exidia saccharina*.
- Uromyces armeriae* (Schlecht.) Lév.: uredin., telium: Arnhem - 19, p. 38.
- Uromyces betae* (Pers.) Lév.: aacid., uredin., telium: Wageningen,
Binnenhaven - 19, p. 37.
- Uromyces dactylidis* Otth.: aacid.; uredin., telium: omgev. Wageningen
-19, p. 37.
- Uromyces ervi* (Wallr.) West.: telium: Bennekom, Kraats - 19, p. 37;
Wageningen, Binnenhaven - 19, p. 37.
- Uromyces fabae* (Pers.) De By.: uredin., telium: Wageningen,
Binnenhaven, Binnenveld, Lage Steeg - 19, p. 37.
- Uromyces ficariae* (Schum.) Lév.: uredin., telium: Doorwerth, kasteel
"Doorwerth" - 19, p. 37.
- Uromyces loti* (Kirchn.) Blytt: uredin., telium: Wageningen, Binnenveld
- 19, p. 37.
- Uromyces phaseoli* (Pers.) Wint.: aacid., uredin., telium: Wageningen,
Lage Steeg, Hoge Steeg, Binnenhaven - 19, p. 37.

- Uromyces pisi* (Pers.) Schroet.: aecid.: Doorwerth, De Zalmen: uredin., telium: Wageningen, Dijk - 19, p. 37.
- Uromyces rumicis* (Schum.) Wint.: uredin., telium: Wageningen, Holleweg, Binnenveld - 19, p. 37.
- Uromyces trifolii* (Hedw.) Lév.: uredin., telium: Wageningen, Binnenhaven, Binnenveld, Eng: 19, p. 38.
- Uromyces trifolii-repentis* (Cast.) Liro: aecid., uredin., telium: Wageningen, Binnenveld, Eng - 19, p. 37.
- Uromyces valerianae* (Schum.) Fuck.: aecid., uredin., telium: Renkum, "Oranje Nassau Oord" - 19, p. 37; Wageningen, Grift - 19, p. 37.
- Uropyxis mirabilissima* Magn.: Wageningen: - 19, p. 41.
- Vararia ochroleuca* (Bourd. et Galz.) Donk: Wassenaar, Meiendel - 5, p. 87.
- Vermicularia dematium* Pers. ex Fr.: beschrijving - 18, p. 27*, 30; Doorn - 18, p. 30; Wageningen: - 18, p. 30.
- Verpa conica* Mull. ex Fr.: Nijmegen, stadstuin - 10, p. 37; Vogelenzang - 5, p. 93.
- Verpa digitaliformis* Pers. (wellicht identiek met *Verpa conica*): Amersfoort - 10, p. 51; omgev. Assen - 10, p. 51; Egmond-Bergen - 4, p. 13; Leersum - 10, p. 49; Oostvoorne - 12, p. 47; Rhenen, Grebbeberg: - 10, p. 50; Scheveningen - 12, p. 47.
- Verpa helvelloides* Krombh. (identiek met of variëteit van *Verpa conica*): Arnhem - 15, p. 11.
- Verpa krombholzii* Corda: Alkmaar (onzeker): - 4, p. 13.
- Verticicladium* cf. *acuum* Oudem.: beschrijving & afb.: - 19, p. 30-31, 33; conidiale stadium van *Desmazierella acicola* Lib.: - 19, p. 34-35.
- Volvaria bombycina* (Pers. ex Fr.) Quél.: Heere, Kasteellaan - 14, p. 34; Wassenaar, Meiendel - 14, p. 51.
- Volvaria gloiocephala*: zie *Volvaria speciosa*.
- Volvaria hypopithys* subsp. *Loweana*: zie *Volvaria loveiana*.
- Volvaria loveiana* (Berk.) Gill. (*Volvaria hypopithys* subsp. *Loweiana*): parasiet op *Clitocybe nebularis*, *clavipes* - 5, p. 85; Oosterhout, "Oosterhout" - 13, p. 34, 42-43*.
- Volvaria pusilla* (Pers. ex Fr.) Quél.: Velsen, binnenshuis - 14, p. 52; Walcheren (waar?) - 5, p. 31; 8, p. 29.
- Volvaria speciosa* (Fr.) Gill. (*Volvaria gloiocephala*): toevallige begeleider der champignoncultuur - 8, p. 48-49*; Aerdenhout, "Naaldenveld"

- 5, p. 41; omgev. Amersfoort - 14, p. 65; Amsterdam, gasfabriek, Stadion- 7, p. 60; Beverwijk-Bloemendaal: - 6, p. 38; omgev, Bussum - 5, p. 40; omgev. Delft - 10, p. 24; Eindhoven - 7, p. 60; 's-Gravenhage, "Meer en Bosch" - 6, p. 38; Heeze - 7, p. 76; Kennemerland (Bloemendaal?) - 4, p. 25; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; omgev. Rotterdam - 8; p. 48; Voorst " 't Schol" - 12, p. 75; Wassenaar, "Duinrel" - 7, p. 35; 14, p. 78.
- Volvaria taylori* (Berk.) Quél.: Alkmaar - 7, p. 55.
- Vuilleminia comedens* (Fr.) Maire: Wassenaar, "Voor-Linden" - 18, p. 75.
- Xeromphalina campanella* (Batsch ex Fr.) Kühner et Maire (*Omphalia campanella*): Haarlem, stadstuin - 3, p. 11.
- Xeromphalina caudicinalis* (With. ex Fr.) Kühner et Maire (*Marasmius caudicinalis*): omgev. Ruurlo.- 4, p. 27.
- Xeromphalina cornui* (Quél.) Favre (*Omphalia cornui*): Hatert, Uiversnest - 16, p. 9.
- Xerula pudens* (Pers. ex S.F.Gray) Sing. (*Collybia longipes*): De Steeg, "Middachten": 5, p.60; 8, p. 18; Zoelen - 6, p. 9.
- Xylaria carpophila* (Pers. ex Fr.) Fr.: Baarn, "Groeneveld" - 18, p. 47.
- Xylaria hypoxylon* (L. ex Fr.) Grev.: vegetatiefoto - 6, p. 18: Amsterdam, Vondelpark - 5, p. 70; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 38; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32; Ulvenhout - 2, p. 38; 3, p. 42; Wolfheze, omgev. "Buunderkamp" (crinata-vorm) - 6, p. 73.
- Xylaria obovata* Berk.: habitustekening & details - 9, p. 3.
- Xylaria polymorpha* (Pers. ex Fr.) Grev.: Amsterdam, Vondelpark - 11, p. 24; Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg - 8, p. 38; Nieuw Beerta - 6, p. 15, 32.